

MALADIES BACTERIENNES
 Centre nationale de référence des méningocoques

Bulletin d'information


Méningococcies

Au cours du 1^{er} trimestre de l'année 2018:

- ◇ le centre de référence a confirmé 34 cas de méningite ou de septicémie à *N. meningitidis* : 14 en janvier, 8 en février et 12 en mars;
- ◇ le sérotype B a été retrouvé dans 52,9% des cas; le sérotype Y dans 35,3 % des cas;
- ◇ aucun décès a été enregistré;
- ◇ 58,8% des cas ont été observés en Flandre, 32,4% en Wallonie et 8,8% à Bruxelles;
- ◇ 12 souches ont été isolées chez des personnes de sexe masculin et 21 chez des personnes de sexe féminin (ratio M/F = 0,6)
- ◇ les enfants de moins de 5 ans représentaient 35,3% des cas et les jeunes de 15 à 19 ans 11,8% des cas.

En conclusion: le nombre de cas recensés au cours du 1^{er} trimestre de 2018 est légèrement supérieur à celui du 1^{er} trimestre de 2017 (n=31).

Distribution des cas par sérotype %



Distribution des cas par âge

Age	N	%	B	C	Y	W	décès
0-11m.	5	14,7	3	0	1	1	0
1-4a.	7	20,6	6	0	1	0	0
5-9a.	2	5,9	1	0	0	1	0
10-14a	2	5,9	1	1	0	0	0
15-19a.	4	11,8	0	0	4	0	0
20-24a.	3	8,8	3	0	0	0	0
25-44a.	3	8,8	2	0	1	0	0
45-64a.	4	11,8	2	0	1	1	0
>65a.	4	11,8	0	0	4	0	0
Total	34	100	18	1	12	3	0

Distribution géographique des cas

Anvers	17,6%	Brabant wallon	2,9%
Brabant Flamand	8,8%	Hainaut	5,9%
Flandre occidentale	8,8%	Liège	17,6%
Flandre orientale	14,7%	Luxembourg	0%
Limbourg	8,8%	Namur	5,9%
Flandre	58,8%	Wallonie	32,4%

Méningococcies en Belgique par trimestre : 2005-2018

