


MALADIES BACTERIENNES

Centre nationale de référence des méningocoques

Bulletin d'information

Méningococcies

Distribution des cas par sérotype %

 Au cours du 1^{er} trimestre de l'année 2020:

- ◇ le centre de référence a confirmé 28 cas de méningite ou de septicémie à *N. meningitidis* : 9 en janvier, 12 en février et 7 en mars;
- ◇ le sérotype B a été retrouvé dans 42,9% des cas, le sérotype W en 28,6%. Le sérotype Y et C chaque un dans 14,3 % des cas;
- ◇ deux décès ont été enregistrés;
- ◇ 46,4% des cas ont été observés en Flandre, 35,7% en Wallonie et 17,9% à Bruxelles;
- ◇ 14 souches ont été isolées chez des personnes de sexe masculin et 14 chez des personnes de sexe féminin (ratio M/F = 1)
- ◇ les enfants de moins de 5 ans représentaient 28,6% des cas et les jeunes de 15 à 19 ans 7,1% des cas.

 En conclusion: le nombre de cas recensés au cours du 1^{er} trimestre de 2020 est inférieur à celui du 1^{er} trimestre de 2019 (n=42).

Distribution géographique des cas

Anvers	7,1%	Brabant wallon	0,0%
Brabant Flamand	3,6%	Hainaut	14,3%
Flandre occidentale	21,4%	Liège	10,7%
Flandre orientale	10,7%	Luxembourg	3,6%
Limbourg	3,6%	Namur	7,1%
Flandre	46,4%	Wallonie	35,7%

Distribution des cas par âge

Age	N	%	B	C	Y	W	décès
0-11m.	3	10,7	0	0	1	2	0
1-4a.	5	17,9	3	1	0	0	1
5-9a.	5	17,9	3	1	1	0	0
10-14a	0	0	0	0	0	0	0
15-19a.	2	7,1	0	0	1	1	0
20-24a.	1	3,6	1	0	0	0	0
25-44a.	2	7,1	1	1	0	0	0
45-64a.	4	14,3	2	1	0	1	0
>65a.	6	21,4	2	0	1	3	1
Total	28	100	12	4	4	8	2

Méningococcémies en Belgique par trimestre : 2007-2020
