

Epidemiologische update COVID-19

RAG 1/3/2023

De analyse van de epidemiologische situatie steunt op een brede evaluatie, waarbij verschillende kwantitatieve indicatoren en drempels worden gehanteerd voor het bepalen van beheersniveaus (zoals [hier](#) beschreven), ondersteund door andere meer kwalitatieve (bv. ervaren werkdruk bij huisartsen) en strategische indicatoren (bv. teststrategie).

Besluit en aanbevelingen

- Het beheersniveau wordt op nationaal niveau gehandhaafd op 2, met een aanhoudende toename van de viruscirculatie en de incidentie van ziekenhuisopnames. De PR voor symptomatische personen staat op beheersniveau 3; de incidentie van nieuwe ziekenhuisopnames en het aantal huisartsconsulten voor influenza-achtige ziekten (ILI) zitten op beheersniveau 2; de bezetting van bedden op de intensive care en het aantal huisartsconsulten voor COVID-19 blijven op beheersniveau 1.
- In West-Vlaanderen wordt het beheersniveau gewijzigd van niveau 2 naar niveau 3. In de andere provincies blijft het beheersniveau ongewijzigd.
- Virusconcentraties gedetecteerd in het afvalwater nemen nog steeds toe in Wallonië en Brussel, maar dalen in Vlaanderen.
- De indicatoren voor de surveillance in de woonzorgcentra tonen nog steeds een licht stijgende trend, maar minder uitgesproken dan in de week voordien.

Indicatoren i.v.m. viruscirculatie

Het aantal nieuwe infecties is in de week van 19 tot 25 februari 2023 opnieuw licht gestegen (gemiddeld 1.384 nieuwe infecties per dag, tegenover 1.277 in de voorgaande week, +8%). Deze stijging wordt waargenomen voor de volwassen leeftijdsgroepen in alle drie de gewesten, in het bijzonder voor 65-plussers en meer uitgesproken in Vlaanderen. Voor jongeren is de trend stabiel, behalve voor de 10-19-jarigen in Vlaanderen, waar een daling wordt waargenomen.

Het aantal uitgevoerde testen is licht gedaald. In de periode van 19 tot 25 februari 2023 waren er gemiddeld 5.919 testen per dag, tegenover ongeveer 6.300 de week ervoor. De daling betreft kinderen van 10-19 jaar en in mindere mate kinderen van 0-9 jaar. Voor de andere leeftijdsgroepen stabiliseert het aantal uitgevoerde testen zich. Ook het aantal uitgevoerde tests voor vermoeden van COVID-19 blijft stabiel.

Het aantal zelftesten dat tussen 19 en 25 februari 2023 in de apotheek is verkocht, is opnieuw licht gestegen, met 38.249 verkochte tests tegenover ongeveer 35.000 in de week daarvoor (Bron: APB & OPHACO).

De totale positiviteitsratio (PR) is opnieuw gestegen, 25,1% voor de week van 19-25 februari 2023 (vergeleken met 21,3% in de voorgaande week). Deze stijging wordt waargenomen voor alle volwassen leeftijdsgroepen, met uitzondering van de 10-19-jarigen voor wie de trend stabiel is. De PR voor symptomatische personen is in alle drie de regio's gestegen.

De monitoring van het afvalwater¹, gebaseerd op drie indicatoren, laat verschillende trends zien in de verschillende regio's, met een daling van de virusconcentratie in Vlaanderen en een stijging in Wallonië en het Brusselse Gewest. Op basis van de resultaten van 22 februari 2023 voldeden voor de 42 gemonitorde afvalwaterzuiveringsinstallaties 17 gebieden aan de indicator "stijgende trend" (vergeleken met 27 de week ervoor), 11 aan de indicator "snelle stijging" (vergeleken met 14 de week ervoor) en 16 aan de indicator "hoge circulatie" (vergeleken met 18 de week ervoor). Op regionaal niveau waren er alerten in Wallonië voor alle drie de indicatoren (met 25 opeenvolgende dagen van toenemende virusconcentratie), het Brusselse Gewest voor de indicator "stijgende trend". In Vlaanderen waren er geen alerten. Meer informatie is te vinden in het wekelijks verslag.

Indicatoren i.v.m. druk op het zorgsysteem

Het aantal raadplegingen bij huisartsen voor vermoedelijke COVID-19 is op nationaal niveau in week 8 opnieuw licht gestegen, met gemiddeld 11 contacten per 100.000 inwoners per dag, tegenover 10/100.000 in de voorgaande week. In alle drie de gewesten wordt nu een stijging waargenomen (Bron: Huisartsenbarometer).

Het aantal raadplegingen voor griepachtige symptomen (ILI) bij het peilnetwerk van huisartsen is afgenomen, tot 300 raadplegingen per 100.000 inwoners.

De door de huisartsen ervaren werklast voor aandoeningen van de luchtwegen is ook gedaald: 29% van de artsen vond deze in week 8 hoog of zeer hoog (vergeleken met 39% in week 7).

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames voor COVID-19 is opnieuw gestegen, met gemiddeld 122 opnames per dag in de week van 21-27 februari 2023, tegenover 104 in de voorgaande periode (+17%). Het reproductiegetal (Rt) voor ziekenhuisopnames daalde (1,060, tegenover 1,116 in de voorgaande week). De voorspellende modellen voor het aantal nieuwe ziekenhuisopnames laten voor de komende twee weken nog steeds een grotendeels stabiele trend zien.

De 7-daagse incidentie van ziekenhuisopnames is toegenomen in alle provincies, met uitzondering van Luik waar zij afneemt. Het beheersniveau wordt in de provincie West-Vlaanderen verhoogd van niveau 2 naar niveau 3, aangezien de incidentie van ziekenhuisopnames de afgelopen drie weken de drempelwaarde voor niveau 3 heeft overschreden.

Het aantal ziekenhuisopnames voor COVID-19 is opnieuw toegenomen, terwijl het aantal ziekenhuisopnames met COVID-19 (d.w.z. opname om een andere reden maar met een positieve COVID-19-test) zich de laatste dagen lijkt te stabiliseren.

Het aantal door COVID-19-patiënten bezette ziekenhuisbedden nam opnieuw toe (n = 1.717, +16%). Ook het aantal bezette bedden op de intensive care nam toe (n = 74, + 57%).

Meer informatie over de ziekenhuissurveillance is beschikbaar in het wekelijks verslag

Uit de SARI-surveillance bleek dat de wekelijkse incidentie van ziekenhuisopnames als gevolg van ernstige acute luchtweginfecties licht daalde tot 2,0 opnames per 100.000 inwoners per week in week 8 (vergeleken met 4,1 vorige week). Voor dezelfde week was de incidentie van ziekenhuisopnames voor influenza 0,1/100.000 (daling), voor RSV 0,1/100.000 (daling) en

¹ De surveillance volgt de evolutie van de concentratie van het SARS-CoV-2-virus in het afvalwater. De indicator "Hoge circulatie" geeft de gebieden aan waar de gemeten virusconcentraties hoog zijn (ten minste de helft van de maximumwaarde die in de vijfde golf werd geregistreerd). De indicator "Snelle toename" heeft betrekking op de zones waar de gemeten virusconcentratie in de afgelopen week snel is toegenomen (stijging met meer dan 70% over de laatste 7 dagen). De indicator "Stijgende trend" geeft de bekkens aan waar de virusconcentraties over de laatste 14 dagen meer dan 6 dagen is toegenomen

voor SARS-COV-2 0,7/100.000 (stabiel). Meer informatie is beschikbaar in het wekelijkse [bulletin over acute luchtweginfecties](#).

Andere indicatoren

De indicatoren voor de surveillance in de [woonzorgcentra \(WZC\)](#) nemen nog steeds toe, maar in mindere mate. Op nationaal niveau zijn zowel het aantal infecties bij bewoners als bij het personeel in week 8 nog licht toegenomen, respectievelijk van 8,6 naar 9,8 gevallen per 1.000 bewoners en van 4,4 naar 5,7 gevallen per 1.000 personeelsleden. Het aantal ziekenhuisopnames van bewoners bleef stabiel (0,3 ziekenhuisopnames per 1.000 bewoners). In week 8 werden er tot nu toe 66 nieuwe mogelijke clusters gerapporteerd (voorlopige gegevens, vergeleken met in totaal 68 vastgestelde clusters voor week 7). Drie procent van de deelnemende WZC heeft een grote cluster gemeld (ten minste 10 gevallen onder bewoners).

De participatiegraad blijft laag (56% in Vlaanderen, 75% in Wallonië, 14% in Brussel en 11% in de Duitstalige Gemeenschap). Zie het [dashboard](#) voor meer details.

Het aantal (gemelde) [sterfgevallen](#) steeg opnieuw in week 8, met een totaal van 56 geregistreerde sterfgevallen (niet-geconsolideerde gegevens, tegenover 53 de week ervoor), d.w.z. 5 tot 11 sterfgevallen per dag. Van de sterfgevallen waren er 14 bij bewoners van woonzorgcentra (25%). Het sterftcijfer in week 8 bedroeg 0,48/100 000 inwoners in België, 0,16/100 000 in Wallonië (daling), 0,73/100 000 in Vlaanderen (stijging) en 0,08/100 000 in Brussel (daling). Wekelijkse schommelingen zijn mogelijk vanwege de lage absolute aantallen.

Gedetailleerde gegevens over de [moleculaire surveillance](#) in België zijn deze week niet beschikbaar. Beperkte informatie is wel beschikbaar op de website van het [NRC](#).

Europese situatie

Volgens het ECDC is de epidemiologische situatie in de EU/EER in week 7 (meest recente beschikbare gegevens) stabiel gebleven. Een toename van het aantal gevallen bij mensen van 65 jaar en ouder wordt echter waargenomen in 12 van de 26 landen die gegevens hebben verstrekt (een incidentie van meer dan 200/100.000 wordt waargenomen in 5 landen: Oostenrijk, België, Duitsland, Griekenland en Luxemburg). Bovendien meldden zes van de 20 landen met gegevens over ziekenhuisopnames een toename (Oostenrijk, België, Griekenland, Malta, Nederland, Slowakije) en vier landen constateerden een toename van opnames/opnames op afdelingen intensieve zorgen (Oostenrijk, Duitsland, Litouwen, Roemenië).

De volgende personen hebben deelgenomen aan dit advies:

Géraldine De Muylder (Sciensano), Naima Hammami (Zorg en Gezondheid), Niel Hens (UHasselt), Pierrette Melin (CHU Liège), Geert Molenberghs (UHasselt-KULeuven), Jorgen Stassijns (Sciensano), Giulietta Stefani (Sciensano), Greet Van Kersschaever (Domus Medica).

Overzicht van de indicatoren per provincie

Periode 19 – 25/02/2023	Aantal Testen per 100 000	PR symptomatische gevallen	Incidentie Hospitalisaties op 7d per 100 000 ⁴	Bezetting ICU	Verdubbelings/halveringstijd	Beheersniveau
België	360	34,8%	7,4	4%	28	2
Antwerpen	403	36,1%	7,1	4%	56	2
Waals Brabant	216	31,3%	2,5	2%	5	1
Henegouwen	278	20,9%	2,2	1%	15	1
Luik	210	26,6%	3,2	5%	-12	2
Limburg	370	31,6%	10,8	0%	18	2
Luxemburg	249	30,2%	2,1	4%	7	1
Namen	222	26,2%	4,6	5%	7	1
Oost Vlaanderen	493	41,1%	11,8	3%	20	2
Vlaams Brabant	354	38,5%	7,2	3%	18	1
West Vlaanderen	627	42,1%	14,9	4%	164	2
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	216	29%	6,6	6%	12	2
Duitstalige Gemeenschap	237	NA	0,0	NA	NA	1

² Gegevens Week 8 (20 tot 26 februari 2023).