



Bulletin d'information

Méningococcies

Distribution des cas par sérotype %


Au cours du 2^{ème} trimestre de l'année 2018:

- ◇ le centre de référence a confirmé 37 cas de méningite ou de septicémie à *N. meningitidis* : 13 en avril, 9 en mai et 15 en juin;
- ◇ le sérotype B a été retrouvé dans 40,5% des cas; le sérotype Y dans 24,3% des cas et le sérotype W dans 21,6% des cas.;
- ◇ une décès a été enregistré;
- ◇ 59,5% des cas ont été observés en Flandre, 35,1% en Wallonie et 5,2% à Bruxelles;
- ◇ 17 souches ont été isolées chez des personnes de sexe masculin et 19 chez des personnes de sexe féminin (ratio M/F = 0,9)
- ◇ les enfants de moins de 5 ans représentaient 40,5% des cas et les jeunes de 15 à 19 ans 16,2% des cas.

En conclusion: le nombre de cas recensés au cours du 2^{ème} trimestre de 2018 est supérieur à celui du 2^{ème} trimestre de 2017 (n=23).

Distribution des cas par âge

Age	N	%	B	C	Y	W	décès
0-11m.	8	21,6	4	0	1	3	0
1-4a.	7	18,9	4	1	2	0	0
5-9a.	4	10,8	3	0	1	0	0
10-14a	0	0	0	0	0	0	0
15-19a.	6	16,2	1	0	1	2	0
20-24a.	1	2,7	1	0	0	0	0
25-44a.	1	2,7	0	0	0	1	0
45-64a.	4	10,8	2	0	1	0	0
>65a.	6	16,2	0	1	3	2	1
Total	37	100	15	2	9	8	1

Distribution géographique des cas

Anvers	16,2%	Brabant wallon	0%
Brabant Flamand	8,1%	Hainaut	16,2%
Flandre occidentale	5,4%	Liège	8,1%
Flandre orientale	13,5%	Luxembourg	2,7%
Limbourg	16,2%	Namur	2,7%
Flandre	59,5%	Wallonie	35,1%

Méningococcémies en Belgique par trimestre : 2005-2018
