


MALADIES BACTERIENNES

Centre nationale de référence des méningocoques

Bulletin d'information

Méningococcies

Distribution des cas par sérotype %


 Au cours du 2^{ème} trimestre de l'année 2020:

- ◇ le centre de référence a confirmé 14 cas de méningite ou de septicémie à *N. meningitidis* : 4 en avril, 4 en mai et 6 en juin;
- ◇ le sérotype B a été retrouvé dans 57,1% des cas; W dans 35,7% des cas, Y dans 7,1% des cas.; Aucun cas de sérotype C.
- ◇ aucun décès a été enregistrés;
- ◇ 50,0% des cas ont été observés en Flandre, 28,6% en Wallonie et 21,4% à Bruxelles;
- ◇ 9 souches ont été isolées chez des personnes de sexe masculin et 5 chez des personnes de sexe féminin (ratio M/F = 1,8)
- ◇ les enfants de moins de 5 ans représentaient 57,1% des cas et les jeunes de 15 à 19 ans 0% des cas.

 En conclusion: le nombre de cas recensés au cours du 2^{ème} trimestre de 2020 est inférieur à celui du 2^{ème} trimestre de 2020 (n=25).

Distribution géographique des cas

Anvers	14,3%	Brabant wallon	0,0%
Brabant Flamand	7,1%	Hainaut	28,6%
Flandre occidentale	21,4%	Liège	0,0%
Flandre orientale	0,0%	Luxembourg	0,0%
Limbourg	7,1%	Namur	0,0%
Flandre	50,0%	Wallonie	28,6%

Distribution des cas par âge

Age	N	%	B	C	Y	W	décès
0-11m.	5	35,7	2	0	0	3	0
1-4a.	3	21,4	3	0	0	0	0
5-9a.	2	14,3	1	0	0	1	0
10-14a	0	0	0	0	0	0	0
15-19a.	0	0	0	0	0	0	0
20-24a.	0	0	0	0	0	0	0
25-44a.	1	7,1	1	0	0	0	0
45-64a.	2	14,3	1	0	0	1	0
>65a.	1	7,1	0	0	1	0	0
Total	14	100	8	0	1	5	0

Méningococcies en Belgique par trimestre : 2007-2020
