


Bulletin d'information

Méningococcies

Distribution des cas par sérotype %



Au cours du 2^e trimestre de l'année 2022:

- ◇ le centre de référence a confirmé 12 cas de méningite ou de septicémie à *N. meningitidis* : 6 en avril, 4 en mai et 2 en juin;
- ◇ le sérotype B est retrouvé dans 58,3% des cas, le sérotype Y dans 33,3% des cas et le sérotype W dans 8,3% des cas.
- ◇ deux décès ont été enregistré;
- ◇ 33,3% des cas ont été observés en Flandre, 50,0% en Wallonie et 16,6% à Bruxelles;
- ◇ 4 souche a été isolé chez des personnes de sexe masculin et 8 chez des personnes de sexe féminin (ratio M/F = 0,5)
- ◇ les enfants de moins de 5 ans représentaient 25,0% des cas et les jeunes de 15 à 19 ans 8,3% des cas.

En conclusion: le nombre de cas recensés au cours du 2^{ième} trimestre de 2022 est faible mais similaire à celui du 2^{ième} trimestre de 2020 (n=14) et 2021 (n=6).

Distribution géographique des cas

Anvers	25,0%	Brabant wallon	8,3%
Brabant Flamand	0,0%	Hainaut	8,3%
Flandre occidentale	0,0%	Liège	8,3%
Flandre orientale	8,3%	Luxembourg	16,6%
Limbourg	0,0%	Namur	8,3%
Flandre	33,3%	Wallonie	50,0%

Distribution des cas par âge

Age	N	%	B	C	Y	W	décès
0-11m.	2	16,6	1	0	1	0	1 (B)
1-4a.	1	8,3	0	0	0	1	0
5-9a.	1	8,3	1	0	0	0	0
10-14a	1	8,3	1	0	0	0	0
15-19a.	1	8,3	1	0	0	0	0
20-24a.	1	8,3	1	0	0	0	0
25-44a.	0	0	0	0	0	0	0
45-64a.	1	8,3	1	0	0	0	1 (B)
>65a.	4	33,3	1	0	3	0	0
Total	12	100	7	0	4	1	2

Méningococcies en Belgique par trimestre : 2009-2022
