



MALADIES BACTERIENNES
 Centre nationale de référence des méningocoques

Bulletin d'information

Méningococcies

Distribution des cas par séro-groupe %


Au cours du 3^{ème} trimestre de l'année 2018:

- ◇ le centre de référence a confirmé 16 cas de méningite ou de septicémie à *N. meningitidis* : 10 en juillet, 1 en août et 5 en septembre;
- ◇ le séro-groupe B a été retrouvé dans 68,8% des cas; le séro-groupe Y et C dans 12,5% des cas et le séro-groupe W dans 6,3% des cas.;
- ◇ une décès a été enregistré;
- ◇ 50,0% des cas ont été observés en Flandre, 31,3% en Wallonie et 18,8% à Bruxelles;
- ◇ 11 souches ont été isolées chez des personnes de sexe masculin et 5 chez des personnes de sexe féminin (ratio M/F = 2,2)
- ◇ les enfants de moins de 5 ans représentaient 37,5% des cas et les jeunes de 15 à 19 ans 12,5% des cas.

En conclusion: le nombre de cas recensés au cours du 3^{ème} trimestre de 2018 est supérieur à celui du 3^{ème} trimestre de 2017 (n=12).

Distribution géographique des cas

Anvers	25,0%	Brabant wallon	6,3%
Brabant Flamand	6,3%	Hainaut	12,5%
Flandre occidentale	12,5%	Liège	12,5%
Flandre orientale	6,3%	Luxembourg	0,0%
Limbourg	0,0%	Namur	0,0%
Flandre	50,0%	Wallonie	31,3%

Distribution des cas par âge

Age	N	%	B	C	Y	W	décès
0-11m.	3	18,8	2	1	0	0	0
1-4a.	3	18,8	2	0	1	0	0
5-9a.	1	6,3	1	0	0	0	0
10-14a	0	0	0	0	0	0	0
15-19a.	2	12,5	2	0	0	0	0
20-24a.	1	6,3	0	1	0	0	0
25-44a.	1	6,3	1	0	0	0	0
45-64a.	3	18,8	2	0	0	1	0
>65a.	2	12,5	1	0	1	0	1
Total	16	100	11	2	2	1	1

Méningococcémies en Belgique par trimestre : 2005-2018
