

MALADIES BACTERIENNES

Centre nationale de référence des méningocoques

Bulletin d'information

Méningococcies

 Au cours du 3^{ème} trimestre de l'année 2019:


- ◇ le centre de référence a confirmé 16 cas de méningite ou de septicémie à *N. meningitidis* : 3 en juillet, 5 en août et 8 en septembre;
- ◇ le sérotype B a été retrouvé dans 62,5% des cas; le sérotype W dans 25,0% des cas et le sérotype C et Y dans 6,3% des cas.;
- ◇ deux décès ont été enregistrés (1 MenC et 1 MenW);
- ◇ 56,3% des cas ont été observés en Flandre, 37,5% en Wallonie et 6,3% à Bruxelles;
- ◇ 9 souches ont été isolées chez des personnes de sexe masculin et 7 chez des personnes de sexe féminin (ratio M/F = 1,3)
- ◇ les enfants de moins de 5 ans représentaient 43,8% des cas et les jeunes de 15 à 19 ans 12,5% des cas.

En conclusion: le nombre de cas recensés au cours du 3^{ème} trimestre de 2018 est égal à celui du 3^{ème} trimestre de 2019 (n=16). MenW représente une plus grande proportion des cas.

Distribution géographique des cas

Anvers	25,0%	Brabant wallon	0,0%
Brabant Flamand	6,3%	Hainaut	6,3%
Flandre occidentale	6,3%	Liège	12,5%
Flandre orientale	12,5%	Luxembourg	0,0%
Limbourg	6,3%	Namur	18,8%
Flandre	56,3%	Wallonie	37,5%

Distribution des cas par sérotype %



■ B ■ W ■ Y ■ C

Distribution des cas par âge

Age	N	%	B	C	Y	W	décès
0-11m.	4	25,0	3	0	0	1	0
1-4a.	3	18,8	1	0	1	1	1
5-9a.	1	6,3	1	0	0	0	0
10-14a	0	0	0	0	0	0	0
15-19a.	1	6,3	1	0	0	0	0
20-24a.	3	18,8	3	0	0	0	0
25-44a.	0	0	0	0	0	0	0
45-64a.	3	18,8	0	1	0	2	1
>65a.	1	6,3	1	0	0	0	0
Total	16	100	10	1	1	4	2

Méningococcémies en Belgique par trimestre : 2006-2019

