


**MALADIES BACTERIENNES**  
 Centre nationale de référence des méningocoques

# Bulletin d'information

## Méningococcies

Distribution des cas par sérotype %



Au cours du 3<sup>ème</sup> trimestre de l'année 2020:

- ◇ le centre de référence a confirmé 7 cas de méningite ou de septicémie à *N. meningitidis* : 3 en juillet, 3 en août et 1 en septembre;
- ◇ le sérotype B a été retrouvé dans 57,1% des cas; le sérotype C dans 28,6% des cas et le sérotype W dans 14,3% des cas;
- ◇ aucun décès a été enregistré;
- ◇ 57,1% des cas ont été observés en Flandre, 28,6% en Wallonie et 14,3% à Bruxelles;
- ◇ 4 souches ont été isolées chez des personnes de sexe masculin et 3 chez des personnes de sexe féminin (ratio M/F = 1,3)
- ◇ les enfants de moins de 5 ans représentaient 28,6% des cas et les jeunes de 15 à 19 ans également 28,6% des cas.

En conclusion: le nombre de cas recensés au cours du 3<sup>ème</sup> trimestre de 2020 est moins que celui du 3<sup>ème</sup> trimestre de 2019 (n=16).

Distribution des cas par âge

Age	N	%	B	C	Y	W	décès
0-11m.	0	0,0	0	0	0	0	0
1-4a.	2	28,6	2	0	0	0	0
5-9a.	0	0,0	0	0	0	0	0
10-14a	0	0,0	0	0	0	0	0
15-19a.	2	28,6	1	1	0	0	0
20-24a.	0	0,0	0	0	0	0	0
25-44a.	1	14,3	0	1	0	0	0
45-64a.	1	14,3	0	0	0	1	0
>65a.	1	14,3	1	0	0	0	0
Total	7	100	4	2	0	1	0

Distribution géographique des cas

Anvers	28,6%	Brabant wallon	14,3%
Brabant Flamand	0,0%	Hainaut	0,0%
Flandre occidentale	14,3%	Liège	14,3%
Flandre orientale	14,3%	Luxembourg	0,0%
Limbourg	0,0%	Namur	0,0%
Flandre	57,1%	Wallonie	28,6%

Méningococcémies en Belgique par trimestre : 2007-2020

