


MALADIES BACTERIENNES
 Centre nationale de référence des méningocoques

Bulletin d'information

Méningococcies

Distribution des cas par sérotype %


Au cours de l'année 2018:

- ◇ le centre de référence a confirmé 116 cas de méningite ou de septicémie à *N. meningitidis* (taux d'incidence annuel=1,02/100.000);
- ◇ le sérotype B a été retrouvé dans 50,9% des cas, sérotype Y dans 25,0%, sérotype W dans 16,4% et le sérotype C dans 4,3% des cas;
- ◇ 4 décès (2B et 2W) ont été enregistrés (CFR = 3,4%);
- ◇ 58,6% des cas ont été observés en Flandre, 31,0% en Wallonie et 10,3% à Bruxelles;
- ◇ 52 souches ont été isolées chez des personnes de sexe masculin et 63 chez des personnes de sexe féminin (ratio M/F = 0,83);
- ◇ les enfants de moins de 5 ans représentaient 36,2% des cas et les jeunes de 15 à 19 ans, 16,4% des cas.

En conclusion: le nombre de cas recensés en 2018 était plus que celui de 2017 (n = 94). Le nombre des cas sérotype W est doublé.

Distribution des cas par âge

Age	N	%	B	C	Y	W	décès
0-11m.	22	19.0	13	1	4	4	0
1-4a.	20	17.2	15	1	4	0	0
5-9a.	9	7.8	6	0	2	1	0
10-14a	2	1.7	1	0	0	0	0
15-19a.	19	16.4	7	0	5	5	0
20-24a.	6	5.2	3	2	2	0	1
25-44a.	6	5.2	3	0	2	1	0
45-64a.	15	12.9	9	0	3	2	1
>65a.	18	15.5	2	1	9	6	2
Totale	116	100	59	5	29	19	4

Distribution géographique des cas

Anvers	15,5%	Brabant wallon	2,6%
Brabant Flamand	9,5%	Hainaut	9,5%
Flandre occidentale	9,5%	Liège	12,1%
Flandre orientale	14,7%	Luxembourg	1,7%
Limbourg	7,8%	Namur	4,3%
Flandre	58,6%	Wallonie	31,0%

Méningococcémies en Belgique par trimestre : 2006-2018
