

Bulletin d'information

Méningococcies


Au cours de l'année 2020:

- ◇ le centre de référence a confirmé 55 cas de méningite ou de septicémie à *N. meningitidis* (taux d'incidence annuel = 0.48/100.000);
- ◇ le sérotype B a été retrouvé dans 49.1% des cas, sérotype W dans 29.1%, sérotype Y dans 10.9% et le sérotype C dans 10.9% des cas;
- ◇ 2 décès (1 W et 1 C) ont été enregistrés (CFR = 3.6%);
- ◇ 50.9% des cas ont été observés en Flandre, 30.9% en Wallonie et 18.2% à Bruxelles;
- ◇ 30 souches ont été isolées chez des personnes de sexe masculin et 25 chez des personnes de sexe féminin (ratio M/F = 1.2);
- ◇ les enfants de moins de 5 ans représentaient 38.2% des cas et les jeunes de 15 à 19 ans, 9.1% des cas.

En conclusion: le nombre de cas recensés en 2020 était significativement inférieur à 2019 (n =107). La pandémie de Covid-19 et les mesures associées ont clairement eu un effet sur la propagation des infections invasives à méningocoques.

Distribution géographique des cas

Anvers	16,4%	Brabant wallon	1,8%
Brabant Flamand	5,5%	Hainaut	16,4%
Flandre occidentale	18,2%	Liège	7,3%
Flandre orientale	7,3%	Luxembourg	1,8%
Limbourg	3,6%	Namur	3,6%
Flandre	50,9%	Wallonie	30,9%

Distribution des cas par sérotype %

Distribution des cas par âge

Age	N	%	B	C	Y	W	décès
0-11m.	10	18.2	3		1	6	
1-4a.	11	20.0	9	1		1	1(C)
5-9a.	7	12.7	4	1	1	1	
10-14a	0	0.0					
15-19a.	5	9.1	1	1	2	1	
20-24a.	1	1.8	1				
25-44a.	5	9.1	2	2		1	
45-64a.	8	14.5	4	1		3	
>65a.	8	14.5	3		2	3	1(W)
Totale	55	100	27	6	6	16	

Méningococcies en Belgique par trimestre : 2007-2020
