

ANNEX 1

GEÏNTEGREERD ADVIES – 25-29 EN 30-64 JARIGEN

Leeftijdscategorie: 25-29 jaar					
Resultaat cytologisch onderzoek	Resultaat reflex hrHPV test	(Geïntegreerd) advies	Resultaat 2 ^{de} triage (over 12 maanden)	Resultaat reflex hrHPV test	(Geïntegreerd) advies
NILM	nvt	Normaal herhalingschema (over 3 kalenderjaren)			
ASC-US	--> negatief voor hrHPV --> positief voor hrHPV	Resultaat reflex HPV-test, met advies, volgt Normaal herhalingschema (over 3 kalenderjaren) Herhaal cytologie over 12 maanden	--> NILM --> ASC-US	nvt	Normaal herhalingsschema (over 3 kalenderjaren)
			--> ≥ LSIL	--> negatief voor hrHPV --> positief voor hrHPV	Resultaat reflex HPV-test, met advies, volgt Normaal herhalingsschema (over 3 kalenderjaren) Directe verwijzing voor colposcopisch onderzoek
LSIL	nvt	Herhaal cytologie over 12 maanden	--> NILM --> ASC-US	nvt	Normaal herhalingsschema (over 3 kalenderjaren)
			--> ≥ LSIL	--> negatief voor hrHPV --> positief voor hrHPV	Resultaat reflex HPV-test, met advies, volgt Normaal herhalingsschema (over 3 kalenderjaren) Directe verwijzing voor colposcopisch onderzoek
≥ ASC-H/AGC	nvt	Directe verwijzing voor colposcopisch onderzoek		nvt	Directe verwijzing voor colposcopisch onderzoek
INSU	nvt	Nieuwe staalname ten vroegste binnen 6 weken		nvt	
Leeftijdscategorie: 30-64 jaar					
Resultaat hrHPV test	Resultaat reflex cytologie	(Geïntegreerd) advies	Resultaat 2 ^{de} triage (over 12 maanden)	(Resultaat reflex cytologie)	Advies
Negatief voor hrHPV	nvt	Normaal herhalingschema (over 5 kalenderjaren)			
Positief voor hrHPV niet-16/18	--> ≥ ASC-US --> NILM	Resultaat reflexcytologie, met advies, volgt Directe verwijzing voor colposcopisch onderzoek Herhaal hrHPV-test over 12 maanden	--> negatief voor hrHPV --> positief voor hrHPV		Normaal herhalingsschema (over 5 kalenderjaren)
				(cytologie, niet als triage)	Directe verwijzing voor colposcopisch onderzoek
Positief voor HPV 16/18	(cytologie, niet als triage)	Directe verwijzing voor colposcopisch onderzoek Resultaat reflexcytologie volgt			Resultaat reflexcytologie volgt
HPVi		Nieuwe staalname ten vroegste binnen 6 weken			

≥ ASC-H/AGC = ASC-H of een meer hooggradige afwijking (HSIL, SCC, AIS, AC) of AGC

INSU: ontoereikende cytologie, niet-representatief staal (gebrek aan epitheelcellen/onvoldoende celmateriaal, cellyse, overvloedig bloed, enz.)

HPVi: ontoereikend (inconclusief) HPV-testresultaat

NB: Met onmiddellijke doorverwijzing voor colposcopie wordt bedoeld binnen 3 maanden of sneller, afhankelijk van de ernst van het positieve screeningsresultaat.

Opgelet: Als bij cytologisch onderzoek **normale** endometriumcellen worden gevonden bij een rechthebbende > 45 jaar, wordt aanvullend advies gegeven: 'Klinische correlatie is aangewezen om endometriumpathologie uit te sluiten bij postmenopauzale vrouwen'.

Opgelet: Als bij cytologisch onderzoek **afwijkende** endometriumcellen worden gevonden bij een rechthebbende (gelijk welke leeftijd), wordt aanvullend advies gegeven: 'Exploratie om endometriumpathologie uit te sluiten'.

Vetgedrukt: het daadwerkelijke geïntegreerde advies, nadat stalen verzonden waren om reflextesten uit te voeren.