CHRONISCHE ZIEKTEN EN AANDOENINGEN

Gezondheidsenquête 2018

JOHAN VAN DER HEYDEN • RANA CHARAFEDDINE

Sciensano

Epidemiologie en volksgezondheid - Levensstijl en chronische ziekten

HIS 2018

Juli 2019 • Brussel • België
Intern referentienummer: 2019/016

Hoofdauteur: Johan Van der Heyden

•

Revisor: Rana Charafeddine

•

Redacteurs: Johan Van der Heyden, Rana Charafeddine

Contactpersoon: Johan Van der Heyden • T +32 2 642 57 26 • johan.vanderheyden@sciensano.be

Gelieve te citeren als:
J. Van der Heyden, R. Charafeddine. Gezondheidsenquête 2018: Chronische ziekten en aandoeningen. Brussel, België: Sciensano. Rapportnummer: D/2019/14.440/36. Beschikbaar op: www.gezondheidsenquete.be

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING 9
AFKORTINGEN 12
INLEIDING 13
VRAGEN 16
INDICATOREN 18
RESULTATEN 23

1. Zelfgerapporteerde chronische ziekte of aandoening 23
1.1. Prevalentie voor België 23
1.2. Evolutie 23
1.3. Demografische verschillen 24
1.4. Socio-economische verschillen 25

2. Prevalentie van specifieke zieken en aandoeningen 25
2.1. Globaal overzicht 26
2.2. Hoge bloeddruk 29
2.2.1. Prevalentie voor België 29
2.2.2. Evolutie 29
2.2.3. Demografische verschillen 31
2.2.4. Socio-economische verschillen 31
2.3. Hoog cholesterolgehalte in het bloed 32
2.3.1. Prevalentie voor België 32
2.3.2. Evolutie 32
2.3.3. Demografische verschillen 33
2.3.4. Socio-economische verschillen 34
2.4. Hartkwaal 35
2.4.1. Prevalentie voor België 35
2.4.2. Evolutie 35
2.4.3. Demografische verschillen 36
2.4.4. Socio-economische verschillen 36
2.5. Lage rugprobleem 37
2.5.1. Prevalentie voor België 37
2.5.2. Evolutie 37
2.5.3. Demografische verschillen 37
2.5.4. Socio-economische verschillen 38
2.6. Nekprobleem 39
2.6.1. Prevalentie voor België 39
2.6.2. Evolutie 39
2.6.3. Demografische verschillen 40
2.6.4. Socio-economische verschillen 40
2.7. Artrose 41
2.7.1. Prevalentie voor België 41
2.7.2. Evolutie 41
2.7.3. Demografische verschillen 41
2.7.4. Socio-economische verschillen 42
2.8. Artritis 43
2.8.1. Prevalentie voor België 43
2.8.2. Evolutie 43
2.8.3. Demografische verschillen 44
2.8.4. Socio-economische verschillen 44

2.9. Diabetes 45
2.9.1. Prevalentie voor België 45
2.9.2. Evolutie 45
2.9.3. Demografische verschillen 46
2.9.4. Socio-economische verschillen 47
2.10. Schildklierlijden 47
2.10.1. Prevalentie voor België 47
2.10.2. Evolutie 48
2.10.3. Demografische verschillen 49
2.10.4. Socio-economische verschillen 50
2.11. Prostaatklachten 50
2.11.1. Prevalentie voor België 50
2.11.2. Evolutie 51
2.11.3. Demografische verschillen 51
2.11.4. Socio-economische verschillen 52
2.12. Urinaire incontinentie 52
2.12.1. Prevalentie voor België 52
2.12.2. Evolutie 53
2.12.3. Demografische verschillen 53
2.12.4. Socio-economische verschillen 54
2.13. Allergie 55
2.13.1. Prevalentie voor België 55
2.13.2. Evolutie 55
2.13.3. Demografische verschillen 56
2.13.4. Socio-economische verschillen 57
2.14. Ernstige hoofdpijn zoals migraine 57
2.14.1. Prevalentie voor België 57
2.14.2. Evolutie 58
2.14.3. Demografische verschillen 58
2.14.4. Socio-economische verschillen 59
2.15. Langdurige vermoeidheid 59
2.15.1. Prevalentie voor België 60
2.15.2. Evolutie 60
2.15.3. Demografische verschillen 60
2.15.4. Socio-economische verschillen 61
2.16. Depressie 62
2.16.1. Prevalentie voor België 62
2.16.2. Evolutie 62
2.16.3. Demografische verschillen 63
2.16.4. Socio-economische verschillen 64
2.17. Osteoporose 64
2.17.1. Prevalentie voor België 64
2.17.2. Evolutie 65
2.17.3. Demografische verschillen 65
2.17.4. Socio-economische verschillen 66
2.18. Cataract 66
2.18.1. Prevalentie voor België 66
2.18.2. Evolutie 67
2.18.3. Demografische verschillen 67
2.18.4. Socio-economische verschillen 67
2.19. Astma 68
2.19.1. Prevalentie voor België 68
2.19.2. Evolutie 68
2.19.3. Demografische verschillen 69
2.19.4. Socio-economische verschillen 69

3. Multimorbiditeit **70**
3.1. Prevalentie voor België 70
3.2. Evolutie 71
3.3. Demografische verschillen 71
3.4. Socio-economische verschillen 72
BESPREKING EN CONCLUSIE **74**
SAMENVATTENDE TABELLEN **78**
REFERENTIES **95**
LIJST VAN TABELLEN **96**

SAMENVATTING

In deze module wordt nagegaan in welke mate chronische ziekten en aandoeningen voorkomen in de algemene bevolking. Daar het gaat om zelfgerapporteerde informatie moeten de resultaten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Toch zijn enquêtegegevens over chronische ziekten en aandoeningen van groot belang omdat ze vaak de enige informatiebron zijn om de grootteorde van belangrijke gezondheidsproblemen in de algemene bevolking in te schatten.

Bijna 1 op de 3 personen van 15 jaar en ouder (29,3%) antwoordt “ja” op de vraag of ze aan een langdurige ziekte lijden. Dit percentage stijgt sterk met de leeftijd en is hoger bij vrouwen, laagopgeleiden en in het Waals Gewest.

In de gezondheidsenquête wordt gepeild naar het voorkomen in het afgelopen jaar van 38 specifieke ziekten of aandoeningen die in regel langdurig of chronisch zijn, of chronische gevolgen hebben. In Figuur 1 wordt de top tien weergegeven volgens hun frequentie van voorkomen in de algemene bevolking van 15 jaar en ouder.

Zowel mannen als bij vrouwen staan lage rugproblemen bovenaan de lijst. Andere chronische ziekten en aandoeningen met een prevalentie van meer dan 15% zijn een hoog cholesterolgehalte in het bloed, een hoge bloeddruk, allergie en bij vrouwen artrose en nekproblemen.

Figuur 1 | Top tien van de meest gerapporteerde chronische ziekten en aandoeningen in de bevolking van 15 jaar en ouder. Percentage van de bevolking met deze ziekte of aandoening in de afgelopen 12 maanden, Gezondheidsenquête, België 2018

Figuur 2 geeft dezelfde informatie weer bij 65-plussers. De top drie van de meest gerapporteerde aandoeningen bestaat hier, zowel bij mannen als vrouwen, uit hoog cholesterolgehalte in het bloed (meest gerapporteerde aandoening bij mannen), hoge bloeddruk en artrose (meest gerapporteerde aandoening bij vrouwen).

In de top tien van de 65-plussers nemen aandoeningen zoals urinaire incontinentie, prostaatlijden en hartlijden bij mannen, en osteoporose bij vrouwen de plaats in van langdurige vermoeidheid, ernstige hoofdpijn zoals migraine die in de algemene bevolking tot de top tien behoren.

Figuur 2 | Top tien van de meest gerapporteerde chronische ziekten en aandoeningen in de bevolking van 65 jaar en ouder. Percentage van de bevolking met deze ziekte of aandoening in de afgelopen 12 maanden, Gezondheidsenquête, België 2018



De chronische ziekten en aandoeningen die het frequentst voorkomen, blijven ook toenemen. Het percentage van de bevolking met hoge bloeddruk, lage rugproblemen, nekproblemen, artrose, diabetes, schildklierlijden is sinds de eerste gezondheidsenquête nog nooit zo hoog geweest, en hoewel deze toename voor een stuk te maken heeft met de vergrijzing van de bevolking, verklaart dit niet het volledig plaatje. Ook aandoeningen die ook de jongere bevolkingsgroepen treffen, zoals allergie en astma zijn de afgelopen 5 jaar toegenomen. Verder rapporteert een toenemend aantal mensen een depressie en langdurige vermoeidheid in het afgelopen jaar. De toename van een aantal belangrijke chronische ziekten weerspiegelt zich ook in de evolutie van het aantal personen met multimorbiditeit, dat over een periode van 20 jaar bijna is verdubbeld.

De oorzaken van het toenemend aantal personen met chronische ziekten zijn ongetwijfeld multifactorieel. Zowel de individuele leefstijl als de fysieke en sociale omgeving spelen een rol. Op basis van een dwarsdoorsnede onderzoek zoals de Gezondheidsenquête is het echter niet mogelijk om eenduidige oorzakelijke verbanden te leggen die deze trend kunnen verklaren.

Bij vrouwen vinden we voor heel wat chronische aandoeningen hogere prevalenties dan bij mannen. Dit is o.m. het geval voor artrose, artritis, lage rugpijn, nekpijn, schildklierlijden, incontinentie, cataract, allergie, migraine, astma, depressie, langdurige vermoeidheid en osteoporose. Voor slechts enkele aandoeningen (hoog cholesterolgehalte in het bloed, coronair hartlijden, andere zware hartpathologie) vinden we een hogere prevalentie bij mannen.

Dat chronische ziekten vaker voorkomen bij laagopgeleiden dan bij hoogopgeleiden werd al vastgesteld in de allereerste gezondheidsenquête in 1997. Twintig jaar later is dit nog steeds niet veranderd. Laagopgeleiden lijden vaker dan hoogopgeleiden aan hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte in het bloed, hartinfarct, lage rugproblemen, artrose, artritis, diabetes, urinaire incontinentie, ernstige hoofdpijn zoals migraine, langdurige vermoeidheid, depressie en astma en hebben dan ook veel vaker te maken met multimorbiditeit.

Hoewel er enkele verschillen zijn in chronische morbiditeit tussen het Vlaams en Waals Gewest is de grootteorde van het probleem in beide gewesten vrij gelijk. In het Waals Gewest vinden we een hogere prevalentie van diabetes, schildklierlijden, depressie en astma. In het Vlaams Gewest noteren we een hogere prevalentie van personen met lage rugpijn, nekproblemen en ernstige hoofdpijn zoals migraine. Multimorbiditeit komt in beide gewesten in ongeveer dezelfde mate voor.

In het Brussels Gewest vinden we voor verscheidene chronische ziekten een lagere prevalentie dan in Vlaanderen en Wallonië en dat geldt ook voor multimorbiditeit. Bovendien lijkt de evolutie van sommige ziekten, maar ook van zelfgerapporteerde chronische morbiditeit en multimorbiditeit tussen 2013 en

2018 in Brussel gunstiger te zijn dan in de andere gewesten. Dit heeft misschien te maken met het feit dat Brussel een groot aantal inwoners heeft met een nationaliteit of geboorteland van buiten de EU. Voor verschillende chronische ziekten stellen we in deze bevolkingsgroep immers een lagere prevalentie vast dan bij personen met de Belgische nationaliteit.

Besluit

De resultaten van de Gezondheidsenquête tonen aan dat het aantal personen met een chronische aandoening en multimorbiditeit in België onmiskenbaar blijft toenemen. Dit heeft implicaties voor de gezondheidszorg. Ook de komende jaren zullen voldoende budgettaire middelen moeten vrijgemaakt worden om het toenemend aantal chronische patiënten de nodige zorg te geven. Door de toenemende multimorbiditeit zal ook de organisatie van de zorg moeten geheroriënteerd worden.

Minstens even belangrijk is dat het preventief gezondheidsbeleid verder inzet op de aanpak van belangrijke determinanten van chronische ziekten zoals roken, slechte voedingsgewoonten, alcoholgebruik, onvoldoende lichaamsbeweging. Daarbij mag de psychosociale context niet vergeten worden. De resultaten van de Gezondheidsenquête tonen aan dat het aantal mensen met depressie en langdurige vermoeidheid toeneemt in België. Ook hier moet het beleid zeker oog voor hebben.

De aanwezigheid van socio-economische ongelijkheden in de prevalentie van chronische ziekten en aandoeningen is nog steeds een pijnpunt. Vanuit het idee dat gezondheid een universeel mensenrecht is, is het nodig om verder te investeren in programma's die deze socio-economische ongelijkheden aanpakken.

AFKORTINGEN

DDD	Daily Defined Dose
EHIS	European Health Examination Survey, vertaald Europese Gezondheidsenquête
EU-SILC	EU statistic on income and livind conditions, vertaald : EU-statistiek van inkomens en levensomstandigheden
IMA	Intermutualistisch Agentschap
MEHM	Minimal European Healh Module, vertaald : Minimale Europese Gezondheidsenquête
WGO	Wereldgezondheidsorganisatie

INLEIDING

Chronische ziekten worden gekenmerkt door een relatief lange ziekteduur en zijn het resultaat van een combinatie van genetische, fysiologische, gedrags- en omgevingsgebonden factoren (1). Chronische aandoeningen omvatten ook gezondheidsproblemen die niet onmiddellijk als ziekte beschouwd worden, maar wel belangrijke risicofactoren zijn voor de gezondheid, zoals een hoge bloeddruk of een hoog cholesterolgehalte in het bloed.

Chronische ziekten en aandoeningen brengen specifieke gevolgen met zich mee voor de gezondheidsbeleving, het dagelijks functioneren en het gebruik van de gezondheidszorg. Voor een gezondheidsbeleid is het dus belangrijk om de prevalentie van deze ziekten en aandoeningen te kennen, om te weten welke aandoeningen het meest frequent voorkomen en om na te gaan welke impact deze hebben op het functioneren en op de medische consumptie (2). Personen die lijden aan chronische ziekten en aandoeningen hebben meer gezondheidsbehoeften en hogere gezondheidskosten (3). Informatie over de prevalentie van deze aandoeningen is dus nodig om de gezondheidsbehoeften en de bijhorende gezondheidskosten te kunnen inschatten.

Het nut van een module over chronische ziekten en aandoeningen in een gezondheidsenquête situeert zich op verschillende terreinen.

- Het instrument laat toe om prevalenties te bepalen van specifieke WGO-indicatoren, voornamelijk de prevalentie van hart- en vaataandoeningen, aandoeningen van het bewegingsstelsel, diabetes en chronische aandoeningen van de luchtwegen.
- Een gezondheidsenquête laat toe belangrijke informatie te verzamelen over chronische ziekten en aandoeningen waar anders nagenoeg geen informatie over beschikbaar is zoals migraine en allergie.
- Aan de hand van een gezondheidsenquête kunnen prevalentiegegevens die via andere bronnen bekomen werden, gevalideerd worden. Bovendien zijn de gegevens van een gezondheidsenquête in regel representatief voor de ganse bevolking.
- Een gezondheidsenquête is een ideaal instrument voor het meten van multimorbiditeit omdat op hetzelfde moment informatie wordt ingewonnen over het vóórkomen van een groot aantal verschillende aandoeningen.
- Op basis van een gezondheidsenquête kan het verband gelegd worden tussen de aanwezigheid van chronische ziekten en aandoeningen en functionele beperkingen.
- Aan de hand van de gegevens van een gezondheidsenquête kan het verband bestudeerd worden tussen het vóórkomen van chronische ziektenen aandoeningen en de medische consumptie, zowel voor wat betreft de contacten met artsen (huisarts, specialist), opname in het ziekenhuis als het gebruik van geneesmiddelen.

Deze module bestaat uit drie onderdelen. In een eerste deel wordt ingegaan op het vóórkomen van chronische ziekten aandoeningen in het algemeen. Wat een chronische ziekte of aandoening is, wordt daarbij ingevuld door de respondent zelf aan de hand van één globale vraag.

In een tweede deel van deze module wordt gepeild naar de prevalentie van specifieke ziekten en aandoeningen. Opgemerkt moet worden dat met de term prevalentie hier een periodeprevalentie bedoeld wordt: de aanwezigheid van de ziekte of aandoening in de periode van één jaar voor de bevraging.

Deze ziekten en aandoeningen betreffen zowel welomschreven ziekten (zoals diabetes), minder specifieke aandoeningen (zoals langdurige vermoeidheid voor een periode van minstens 3 maanden) als enkele aandoeningen die eerder acuut van aard zijn, maar kaderen binnen een meer chronische

problematiek (zoals heupfractuur dat hier vooral beschouwd wordt als een indicator voor ernstige osteoporose in de oudere bevolking). Bij kinderen is de prevalentie van de meeste chronische ziekten en aandoeningen zeer laag. Daarom worden de indicatoren in deze module enkel voorgesteld voor de bevolking van 15 jaar en ouder.

Uiteraard dient gewezen te worden op de beperkingen van een gezondheidsenquête bij het inschatten van prevalenties van specifieke chronische ziekten en aandoeningen. Het gaat om zelfgerapporteerde informatie. Het is mogelijk dat de aan- of afwezigheid van een bepaalde ziekte fout gerapporteerd wordt omdat de respondent onvoldoende medische kennis heeft of liever niet vermeldt aan een bepaalde ziekte of aandoening te lijden. Uit onderzoek is gebleken dat vooral bij oudere personen de validiteit van de bekomen informatie verschilt naargelang het soort ziekte of aandoening (4). Een vertekening van de resultaten kan ook optreden als de prevalentie van chronische ziekten of aandoeningen systematisch verschillend is bij respondenten en non-respondenten.

De oorspronkelijke lijst van ziekten en aandoeningen, die gebruikt werd in de eerste gezondheidsenquête in 1997, was gebaseerd op de vragenlijst van de Nederlandse Gezondheidsenquête (5). In 2001 en 2004 werden enkele aanpassingen doorgevoerd. In 2008 werd de lijst aangevuld en geharmoniseerd met de vragen voorgesteld in het kader van de uitbouw van de Europese Gezondheidsenquête (EHIS). In 2013 werd deze lijst door Eurostat herbekeken en beperkt tot 15 ziekten en aandoeningen. De totale lijst van ziekten en aandoeningen waarover informatie verzameld wordt in de Belgische gezondheidsenquête is echter uitgebreider en omvat sinds 2013 38 ziekten of aandoeningen. In de Gezondheidsenquête 2018 werd deze lijst niet gewijzigd (Tabel 1).

In een derde deel van dit hoofdstuk, tenslotte, gaat het over multimorbiditeit. Multimorbiditeit is de algemene term voor het optreden van meer dan één (chronische) ziekte in één individu tijdens een bepaalde periode.

Multimorbiditeit leidt regelmatig tot problemen bij de patiënt, zoals beperkingen in functioneren en verlies van kwaliteit van leven, meer zorggebruik, meer kans op complicaties bij behandeling en een hogere kans op vroegtijdige sterfte. Omdat er vaak veel verschillende zorgverleners betrokken zijn bij de behandeling, dreigt de zorg versnipperd te raken.

Een eenduidige definitie van multimorbiditeit is er niet. De prevalentie over multimorbiditeit varieert dan ook heel sterk naargelang de studies. In een systematische review van prevalentiestudies over multimorbiditeit wordt een onderscheid gemaakt tussen studies die prevalenties van multimorbiditeit rapporteren in de eerste lijn en studies die zich baseren op multimorbiditeit in de algemene populatie (6). Studies waarbij de prevalentie van multimorbiditeit werd nagegaan aan de hand van gezondheidsenquêtegegevens werden uitgevoerd in Canada, de Verenigde Staten en Spanje (7-10) .

Tabel | 1 Lijst van bevraagde aandoeningen en beschikbaarheid van informatie per enquêtejaar, Gezondheidsenquête, België, 2018.

Aandoeningen	'97	'01	'04	'08	'13	'18
Hart- en vaatziekten en cardiovasculaire risicofactoren						
Hartinfarct (of de gevolgen daarvan) [1]	(x)	(x)	(x)	x	x	x
Coronaire hartziekte (angina pectoris) [1]	(x)	(x)	(x)	x	x	x
Andere ernstige hartkwaal [1]	(x)	(x)	(x)		x	x
Vernauwing van de bloedvaten in de buik of de benen					x	x
Beroerte (hersenbloeding, hersentrombose) of de gevolgen daarvan	x	x	x	x	x	x
Hoge bloeddruk (hypertensie)	x	x	x	x	x	x
Hoog cholesterolgehalte in het bloed					x	x
Chronische longaandoeningen						
Astma (ook allergisch astma) [2]	(x)	x	x	x	x	x
Chronische bronchitis, chronisch obstructief longlijden, emfyseem	(x)	x	x	x	x	x
Aandoeningen van het bewegingsstelsel						
Reumatoïde artritis (ontsteking van de gewrichten)	x	x	x	x	x	x
Artrose (gewrichtsslijtage)	x	x	x	x	x	x
Lage rugprobleem of andere chronische rugaandoening[3]	(x)	(x)	(x)	x	x	x
Nekprobleem of andere chronische nekaandoening				x	x	x
Aandoeningen van het hormoonstelsel						
Diabetes	x	x	x	x	x	x
Schildklierlijden	x	x	x	x	x	x
Neurologische aandoeningen						
Ziekte van Parkinson	x	x	x	x	x	x
Epilepsie	x	x	x	x	x	x
Aandoeningen van het spijsverteringsstelsel						
Maagzweer of zweer aan de 12-vingerige darm	x	x	x	x	x	x
Levercirrose, ander leverlijden	x	x	x	x	x	x
Ernstige darmstoornissen voor een periode van minstens 3 maanden	x	x	x	x	x	x
Galstenen of galblaasontsteking	x	x	x	x	x	x
Aandoeningen van het urogenitaal systeem						
Nierstenen	x	x	x	x	x	x
Ernstige nierproblemen behalve nierstenen	x	x	x	x	x	x
Chronische blaasontsteking	x	x	x	x	x	x
Urinaire incontinentie, problemen om de urine op te houden				x	x	x
Prostaatklachten[4]	(x)	x	x	x	x	x
Oogaandoeningen						
Cataract (staar)	x	x	x	x	x	x
Glaucoom (verhoogde oogdruk)	x	x	x	x	x	x
Diabetische retinopathie					x	x
Maculadegeneratie					x	x
Andere aandoeningen						
Allergie, zoals neusloop, oogontsteking, huiduitslag, voedselallergie, of andere (maar geen allergisch astma)	x	x	x	x	x	x
Kanker	x	x	x	x	x	x
Ernstige hoofdpijn zoals migraine	x	x	x	x	x	x
Ernstige somberheid of depressie voor een periode van minstens 2 weken	x	x	x	x	x	x
Langdurige vermoeidheid voor een periode van minstens 3 maanden		x	x	x	x	x
Ernstige of chronische huidafwijking	X	x	x	x	x	x
Osteoporose (ontkalking van het bot)	X	x	x	x	x	x
Gebroken heup	x	x	x	x	x	x

[1] In 1997, 2001 en 2004 werd de vraag gesteld naar "Ernstige hartkwaal of hartinfarct (of de gevolgen daarvan)". Om te harmoniseren met de EHIS vragenlijst werd deze vraag in 2008 niet hernomen en vervangen door 2 EHIS-vragen die enkel betrekking hadden op hartinfarct (of de gevolgen daarvan) en coronaire hartziekte. Dit had tot gevolg dat een vergelijking met vorige jaren niet meer mogelijk was. In 2013 werd "andere ernstige hartkwaal" toegevoegd. De drie vragen samen zijn min of meer vergelijkbaar met de meer globale vraag die gesteld werd in 1997, 2001 en 2004

[2] In 1997 werd één vraag gesteld over "astma, chronische bronchitis of CARA".

[3] In 1997, 2001 en 2004 werd de volgende formulering gebruikt : "Rugaandoeningen van hardnekkige aard (langer dan 3 maanden) lumbago, ischias, discushernia". De formulering werd veranderd omwille van de integratie in EHIS. Dit heeft tot gevolg dat een vergelijking met vorige jaren niet mogelijk is.

[4] In 1997 werd dit enkel bevraagd bij ouderen.

VRAGEN

Vraag over chronische ziekten en aandoeningen in het algemeen

Een eerste vraag in deze module peilt naar de aanwezigheid van chronische ziekten in het algemeen. Op te merken valt dat deze vraag verschillend is van de vraag die aan bod kwam in de rapportering van vorige Gezondheidsenquêtes. Deze vorige vraag ("Hebt u een of meerdere langdurige ziekten, langdurige aandoeningen of handicaps?") peilde niet enkel naar chronische aandoeningen, maar ook naar handicaps en maakte deel uit van de mondelinge vragenlijst.

Deze vraag komt uit de schriftelijke vragenlijst en maakt deel uit van de Minimale Europese Gezondheidsmodule (MEHM) . Dit is een set van drie vragen die is opgenomen in de Europese Gezondheidsenquête (EHIS) en de EU-statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC), en dus in alle EU-lidstaten gebruikt wordt om gegevens over chronische ziekten in de algemene bevolking te verzamelen. De andere twee vragen van de MEHM werden besproken in vorige hoofdstukken van dit rapport, met name subjectieve gezondheidsbeleving en functionele beperkingen.

SH.02. Hebt u een langdurige ziekte of aandoening (gezondheidsprobleem)? *(Ja / Neen)*

Vragen over specifieke chronische ziekten en aandoeningen

De vraagstelling i.v.m. specifieke chronische ziekten of aandoeningen doorloopt de lijst die in de inleiding vermeld wordt aan de hand van de volgende vraag:

MA.01. Hebt u in de afgelopen 12 maanden één van de volgende ziekten of aandoeningen gehad? *(Ja / Neen)*

Indien het antwoord voor een bepaalde ziekte of aandoening "JA" is, wordt een bijkomende vraag gesteld:

MA02. Werd u hiervoor in de afgelopen 12 maanden opgevolgd door een dokter of andere gezondheidswerker? *(Ja / Neen)*

Voor personen die in de 12 maanden voorafgaand aan de enquête een hoge bloeddruk en/of een hoog cholesterolgehalte rapporteren, worden de volgende bijkomende vragen gesteld:

MA.03 – MA.05. Hebt u hiervoor de afgelopen 12 maanden een dieet gevolgd? *(Ja / Neen)*

MA.04 – MA.06. Hebt u hiervoor de afgelopen 12 maanden geneesmiddelen ingenomen? *(Ja / Neen)*

Voor personen die positief antwoorden op de vraag of ze de afgelopen 12 maanden aan diabetes of suikerziekte leden, worden de volgende bijkomende vragen gesteld:

MA.07. Hebt u hiervoor de afgelopen 12 maanden een dieet gevolgd? *(Ja / Neen)*

MA.08. Hebt u hiervoor de afgelopen 12 maanden insuline-inspuitingen gekregen? *(Ja / Neen)*

MA.09. Hebt u hiervoor de afgelopen 12 maanden pillen of tabletten genomen? *(Ja / Neen)*

Voor personen die positief antwoorden op de vraag of ze de afgelopen 12 maanden aan depressie leden, worden de volgende bijkomende vragen gesteld?

MA.10. Hebt u hiervoor de afgelopen 12 maanden geneesmiddelen ingenomen? *(Ja / Neen)*

MA.11. Hebt u hiervoor de afgelopen 12 maanden psychotherapie gevolgd? *(Ja / Neen)*

INDICATOREN

Een eerste indicator is gebaseerd op de algemene vraag over chronische ziekten.

MA_SH02 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een zelfgerapporteerde chronische ziekte of aandoening.

Een tweede reeks indicatoren heeft betrekking op specifieke chronische ziekten en aandoeningen. Voor elk van de 38 aandoeningen vermeld in Tabel 1 wordt de jaarprevalentie gerapporteerd. Voor enkele aandoeningen (diabetes, hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte in het bloed) wordt de therapeutische aanpak in kaart gebracht.

In eerste instantie werden indicatoren berekend voor de bevolking van 15 jaar en ouder. Dezelfde indicatoren werden echter ook berekend voor de bevolking van 65 jaar en ouder afzonderlijk.

MA01_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **astma** in de afgelopen 12 maanden

MA02_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **chronische bronchitis of emfyseem** in de afgelopen 12 maanden

MA03_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **hartinfarct** in de afgelopen 12 maanden

MA04_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **coronaire hartziekte** in de afgelopen 12 maanden

MA05_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **ernstige hartziekte (uitgezonderd hartinfarct of coronaire hartziekte)** in de afgelopen 12 maanden

MA06_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **hoge bloeddruk** in de afgelopen 12 maanden

MA06_3 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **hoge bloeddruk** dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden een **dieet** te hebben gevolgd

MA06_4 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **hoge bloeddruk** dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden **geneesmiddelen** te hebben genomen

MA06_5 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder met **hoge bloeddruk** volgens de **behandeling** van de aandoening

MA07_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **hoog cholesterolgehalte** in het bloed in de afgelopen 12 maanden

MA07_3 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **hoog cholesterolgehalte in** het bloed dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden een **dieet** te hebben gevolgd

MA07_4 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **hoog cholesterolgehalte** in het bloed dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden **geneesmiddelen** te hebben genomen

MA07_5 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder met **hoog cholesterolgehalte** in het bloed volgens de **behandeling** van de aandoening

MA08_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **beroerte** in de afgelopen 12 maanden

MA09_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **vernauwing van de bloedvaten in de buik of de benen** in de afgelopen 12 maanden

MA10_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **reumatoïde artritis** in de afgelopen 12 maanden

MA11_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **artrose** in de afgelopen 12 maanden

MA12_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een **lage rugprobleem** in de afgelopen 12 maanden

MA13_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een **nekprobleem** in de afgelopen 12 maanden

MA14_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **diabetes** in de afgelopen 12 maanden

MA14_3 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **diabetes** dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden een **dieet** volgde

MA14_4 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **diabetes** dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden **medicamenteus** behandeld werd

MA14_5 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **diabetes** dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden **insuline** gebruikte

MA14_6 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **diabetes** dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden **orale antidiabetica** gebruikte

MA14_7 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder met **diabetes** volgens de behandeling van de **aandoening**

MA15_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **allergie** in de afgelopen 12 maanden

MA16_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een **maagzweer** in de afgelopen 12 maanden

MA17_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **leverlijden** in de afgelopen 12 maanden

MA18_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **kanker** in de afgelopen 12 maanden

MA19_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **ernstige hoofdpijn** zoals migraine in de afgelopen 12 maanden

MA20_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **urinaire incontinentie** in de afgelopen 12 maanden

MA21_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **depressie** in de afgelopen 12 maanden

MA22_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **schildklierlijden** in de afgelopen 12 maanden

MA2301_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **cataract** in de afgelopen 12 maanden

MA2302_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **glaucoom** in de afgelopen 12 maanden

MA2303_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **maculadegeneratie** in de afgelopen 12 maanden

MA2304_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **diabetische retinopathie** in de afgelopen 12 maanden

MA24_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **ziekte van Parkinson** in de afgelopen 12 maanden

MA25_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **epilepsie** in de afgelopen 12 maanden

MA26_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **langdurige vermoeidheid** in de afgelopen 12 maanden

MA27_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **osteoporose** in de afgelopen 12 maanden

MA28_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **gebroken heup** in de afgelopen 12 maanden

MA29_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **darmziekte, langer dan 3 maanden** in de afgelopen 12 maanden

MA30_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **nierstenen** in de afgelopen 12 maanden

MA31_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **ernstige nierziekte behalve nierstenen** in de afgelopen 12 maanden

MA32_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **chronische blaasontsteking** in de afgelopen 12 maanden

MA33_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **ernstige of chronische huidaandoening** in de afgelopen 12 maanden

MA34_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met **galstenen of galblaasontsteking** in de afgelopen 12 maanden

MA35_1 Percentage van de mannelijke bevolking van 15 jaar en ouder met **prostaatklachten** in de afgelopen 12 maanden

MA01_10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **astma** in de afgelopen 12 maanden

MA02_10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **chronische bronchitis, chronisch obstructief longlijden of emfyseem** in de afgelopen 12 maanden

MA03_10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **hartinfarct** in de afgelopen 12 maanden

MA04_10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **coronaire hartziekte** in de afgelopen 12 maanden

MA05_10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **ernstige hartziekte (uitgezonderd hartinfarct of coronaire hartziekte)** in de afgelopen 12 maanden

MA06_10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **hoge bloeddruk** in de afgelopen 12 maanden

MA06_30 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **hoge bloeddruk** dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden een **dieet** te hebben gevolgd

MA06_40 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **hoge bloeddruk** dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden **geneesmiddelen** te hebben genomen

MA06_50 Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder met **hoge bloeddruk** volgens de **behandeling** van de aandoening

MA07_10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **hoog cholesterolgehalte in het bloed** in de afgelopen 12 maanden

MA07_30 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **hoog cholesterolgehalte in het bloed** dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden een **dieet** te hebben gevolgd

MA07_40 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **hoog cholesterolgehalte in het bloed** dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden **geneesmiddelen** te hebben genomen

MA07_50 Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder met **hoog cholesterolgehalte in het bloed** volgens de **behandeling** van de aandoening

MA08_10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **beroerte** in de afgelopen 12 maanden

MA09_10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **vernauwing van de bloedvaten in de buik of de benen** in de afgelopen 12 maanden

MA10_10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **reumatoïde artritis** in de afgelopen 12 maanden

MA11_10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **artrose** in de afgelopen 12 maanden

MA12_10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met een **lage rugprobleem** in de afgelopen 12 maanden

MA13_10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met een **nekprobleem** in de afgelopen 12 maanden

MA14_10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **diabetes** in de afgelopen 12 maanden

MA14_30 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **diabetes** dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden een **dieet** volgde

MA14_40 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **diabetes** dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden **medicamenteus** behandeld werd

MA14_50 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **diabetes** dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden **insuline** gebruikte

MA14_60 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **diabetes** dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden **orale antidiabetica** gebruikte

MA14_70 Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder met **diabetes** volgens de **behandeling** van de aandoening

MA15_10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **allergie** in de afgelopen 12 maanden

MA16_10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met een **maagzweer** in de afgelopen 12 maanden

MA17_10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **leverlijden** in de afgelopen 12 maanden

MA18_10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **kanker** in de afgelopen 12 maanden

MA19_10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **ernstige hoofdpijn zoals migraine** in de afgelopen 12 maanden

MA20_10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **urinaire incontinentie** in de afgelopen 12 maanden

MA21_10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **depressie** in de afgelopen 12 maanden

MA22_10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **schildklierlijden** in de afgelopen 12 maanden

MA2301_10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **cataract** in de afgelopen 12 maanden

MA2302_10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **glaucoom** in de afgelopen 12 maanden

MA2303_10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **maculadegeneratie** in de afgelopen 12 maanden

MA2304_10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **diabetische retinopathie** in de afgelopen 12 maanden

MA24_10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **ziekte van Parkinson** in de afgelopen 12 maanden

MA25_10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **epilepsie** in de afgelopen 12 maanden

MA26_10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **langdurige vermoeidheid** in de afgelopen 12 maanden

MA27_10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **osteoporose** in de afgelopen 12 maanden

MA28_10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **gebroken heup** in de afgelopen 12 maanden

MA29_10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **darmziekte, langer dan 3 maanden** in de afgelopen 12 maanden

MA30_10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **nierstenen** in de afgelopen 12 maanden

MA31_10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **ernstige nierziekte** behalve nierstenen in de afgelopen 12 maanden

MA32_10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **chronische blaasontsteking** in de afgelopen 12 maanden

MA33_10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **ernstige of chronische huidaandoening** in de afgelopen 12 maanden

MA34_10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met **galstenen of galblaasontsteking** in de afgelopen 12 maanden

MA35_10 Percentage van de mannelijke bevolking van 65 jaar en ouder met **prostaatklachten** in de afgelopen 12 maanden

Het derde deel van deze module gaat over multimorbiditeit.

Voor de eerste twee indicatoren rond multimorbiditeit werd uitgegaan van zes aandoeningen die in een Canadese studie geselecteerd werden om multimorbiditeit te bestuderen op basis van gegevens van een gezondheidsenquête (8). Het gaat om artritis/artrose, kanker, diabetes, hoge bloeddruk, hartziekten en obstructieve longziekten.

In een tweede benadering werd uitgegaan van 25 aandoeningen waarvoor vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn in de Gezondheidsenquêtes 2001, 2004 en 2013. Aandoeningen die hieraan voldoen zijn: astma, chronisch longlijden, ernstig hartlijden, hoge bloeddruk, beroerte (of de gevolgen daarvan), artritis/artrose, diabetes, allergie, maagzweer, chronische darmproblemen, leverlijden, galstenen/ontsteking van de galblaas, kanker, ernstige hoofdpijn, depressie, schildklierlijden, glaucoom, cataract, ziekte van Parkinson, epilepsie, ernstig nierlijden/nierstenen, chronische blaasontsteking, chronische vermoeidheid, osteoporose, ernstige huidziekte. Aandoeningen waarvoor die niet het geval was zijn: perifeer vaatlijden, een verhoogd cholesterolgehalte in het bloed, lage rugprobleem of andere chronische rugaandoening, nekprobleem of andere chronische nekaandoening, maculadegeneratie, diabetische retinopathie, heupfractuur, prostaatklachten.

De indicatoren over multimorbiditeit zijn niet beschikbaar voor de Gezondheidsenquête 2008, omdat de vraagstelling over hart- aandoeningen in 2008 beperkt was tot hartinfarct (of de gevolgen daarvan) en coronaire hartziekte [5].

Bij het aanmaken van de indicatoren rond multimorbiditeit werden enkele ziekten samengevoegd. Hartinfarct (of de gevolgen daarvan), coronaire hartziekte en andere hartkwaal vormen samen hartziekten. Artritis en artrose werden samengenomen omdat er van uitgegaan werd dat deze begrippen wel eens door elkaar gehaald worden. Ook nierstenen en ernstige nierziekten (maar geen nierstenen) vormen hier één categorie.

Meer specifiek worden in dit onderdeel de volgende indicatoren voorgesteld:

MA_1	Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens aantal aandoeningen waaraan ze lijden
MA_2	Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met multimorbiditeit
MA_3	Gemiddeld aantal chronische aandoeningen bij personen van 15 jaar en ouder (op een totaal van 25 aandoeningen)
MA_10	Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder volgens aantal aandoeningen waaraan ze lijden
MA_20	Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met multimorbiditeit
MA_30	Gemiddeld aantal chronische aandoeningen bij personen van 65 jaar en ouder (op een totaal van 25 aandoeningen)

In deze module wordt enkel indicator MA_2 in detail besproken. Voor alle indicatoren worden echter basistabellen weergegeven.

[5] In 1997, 2001 en 2004 werd de vraag gesteld naar "Ernstige hartkwaal of hartinfarct (of de gevolgen daarvan)". Om te harmoniseren met de EHIS vragenlijst werd deze vraag in 2008 niet hernomen en vervangen door 2 EHIS-vragen die enkel betrekking hadden op hartinfarct (of de gevolgen daarvan) en coronaire hartziekte. Dit had tot gevolg dat een vergelijking met vorige jaren niet meer mogelijk was. In 2013 werd "andere ernstige hartkwaal" toegevoegd. De drie vragen samen zijn min of meer vergelijkbaar met de meer globale vraag die gesteld werd in 1997, 2001 en 2004.

RESULTATEN

–

1. Zelfgerapporteerde chronische ziekte of aandoening

1.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË

29,3% van de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder geeft aan een chronische ziekte of aandoening te hebben.

Regionale verschillen

Het percentage personen met een chronische ziekte of aandoening is significant hoger in het Waals Gewest (32,7%) dan in het Vlaams (27,6%) en het Brussels Gewest (28,7%) (Figuur 3).

1.2. EVOLUTIE

Het percentage personen met een zelfgerapporteerde chronische ziekte of aandoening is tussen 2001 (25,1%) en 2018 (29,3%) significant gestegen (Figuur 3). Deze stijging kan voor een deel, maar niet volledig verklaard worden door de vergrijzing van de bevolking.

Regionale verschillen

De trend die geobserveerd wordt voor België wordt vooral bepaald door de evolutie in het Vlaams Gewest. In het Vlaams Gewest steeg het percentage personen met een zelfgerapporteerde chronische ziekte of aandoening van 20,6% in 2001 tot 27,6% in 2018.

In het Brussels Gewest observeren we een stijging van 28.7% in 2001 tot 32.3% in 2013, maar in 2018 is dit percentage merkwaardig genoeg terug gedaald tot 28.7%. Deze daling is significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

In het Waals Gewest bleef het percentage personen met een zelfgerapporteerde chronische ziekte of aandoening tussen 2001 (32,5%) en 2018 (32.7%) vrij stabiel.

Figuur 3 | **Percentage van de bevolking van 1 jaar en ouder met een zelfgerapporteerde chronische ziekte of aandoening, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018**



1.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN

Het percentage personen met een zelfgerapporteerde chronische ziekte of aandoening is significant hoger bij vrouwen (31.3%) dan bij mannen (27.2%) en stijgt sterk met de leeftijd, van 14,1% in de leeftijdsgroep tussen 15 en 24 jaar tot 44,1% bij 75-plussers (Figuur 4).

Regionale verschillen

In de drie gewesten is het percentage personen met een zelfgerapporteerde chronische ziekte of aandoening hoger bij vrouwen dan bij mannen: 28,6% versus 26,5% in het Vlaams Gewest, 31,1% versus 26,0% in het Brussels Gewest en 36,3% versus 28,7% in het Waals Gewest. Het verschil is dus het kleinst in het Vlaams Gewest, en het grootst in het Waals Gewest. In het Vlaams en Brussels Gewest is het verschil niet langer significant na correctie voor leeftijd.

De leeftijdsgradiënt is het meest uitgesproken in het Waals Gewest ,waar het percentage personen met een zelfgerapporteerde aandoening stijgt van 13,6% bij 15-24-jarigen tot 50,4% bij 75-plussers. In het Vlaams Gewest zijn deze percentages respectievelijk 14,6% en 40,9% en in het Brussels Gewest 13,2% en 47,6% (Figuur 4).

Figuur 4 | **Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een zelfgerapporteerde chronische ziekte of aandoening, volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018**



1.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN

Het percentage personen met een zelfgerapporteerde chronische ziekte of aandoening is het hoogst bij personen zonder diploma of enkel een diploma lager onderwijs (45,0%). Naargelang het opleidingsniveau stijgt, daalt dit percentage tot 25,6 % bij de hoogst opgeleiden. Wanneer we corrigeren voor leeftijd en geslacht, verkleinen de verschillen, maar het verschil tussen de hoogst en laagst opgeleiden blijft sterk significant.

Regionale verschillen

Ook in elk van de regio's vinden we deze socio-economische verschillen terug. Het meest uitgesproken verschil vinden we in het Vlaams Gewest, waar de prevalentie dubbel zo hoog is bij de laagst opgeleiden (46,7%) als bij de hoogst opgeleiden (23,3%). Ook na correctie voor leeftijd en geslacht is dit verschil sterk significant. In het Brussels Gewest zijn de percentages bij de laagst en hoogst opgeleiden respectievelijk 36,5% en 26,5% en in het Waals Gewest 44,8% en 29,8%, maar na correctie voor leeftijd en geslacht zijn deze verschillen niet meer significant.

2. Prevalentie van specifieke zieken en aandoeningen

De prevalentie die hier besproken wordt is de jaarprevalentie, d.i. de aanwezigheid van de betreffende ziekte of aandoening in het afgelopen jaar. Ook indien dit niet specifiek vermeld wordt, gaat het dus over het voorkomen van ziekten of aandoeningen in de 12 maanden voorafgaand aan het interview.

2.1. Globaal overzicht

Zoals aangegeven in de inleiding wordt in de Gezondheidsenquête gepeild naar de prevalentie van 38 chronische ziekten en aandoeningen. In enkele gevallen (hartinfarct, beroerte, heupbreuk) gaat het om een acute ziekte of aandoening met belangrijke chronische gevolgen.

In Figuur 5 wordt de top tien van de meest rapporteerde chronische ziekten en aandoeningen voorgesteld voor mannen en vrouwen van 15 jaar en ouder, en dit voor België en de drie gewesten. In Figuur 6 wordt dezelfde informatie voorgesteld voor 65-plussers.

De volgende ziekten of aandoeningen komen in minstens één ranking in de top tien voor:

Aandoeningen van hart- en vaatstelsel/cardiovasculaire risicofactoren:

- Hoge bloeddruk
- Hoog cholesterolgehalte in bloed
- Hartkwaal (hartinfarct en coronaire hartziekte niet meegerekend)

Aandoeningen van het bewegingsstelsel:

- Lage rugprobleem
- Nekprobleem
- Artrose
- Artritis

Aandoeningen van het hormoonstelsel:

- Diabetes
- Schildklierlijden

Aandoeningen van het urogenitaal stelsel:

- Prostaatklachten (bij mannen)
- Urinaire incontinentie

Andere ziekten en aandoeningen:

- Allergie
- Ernstige hoofdpijn zoals migraine
- Langdurige vermoeidheid
- Depressie
- Osteoporose
- Cataract

Deze ziekten worden verder in dit hoofdstuk meer in detail besproken. Globaal kan gesteld worden dat de meest voorkomende aandoeningen in de bevolking problemen met het bewegingsstelsel (lage rugprobleem, artrose, nekprobleem), cardiovasculaire risicofactoren (hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte in het bloed) en allergie zijn. Bij vrouwen staat ook schildklierlijden en bij mannen van 65 jaar en ouder prostaatklachten in de top tien.

Een ziekte die niet tot de top tien hoort, maar waarvan de prevalentie tussen 2013 en 2018 sterk gestegen is, is astma. Ook deze aandoening wordt verder in de tekst meer in detail besproken.

Voor alle ziekten worden basistabellen voorgesteld en dit zowel voor de leeftijdsgroep van 15 jaar en ouder als voor de 65-plussers.

Figuur 5 | **Top tien van de meest gerapporteerde chronische ziekten en aandoeningen in de bevolking van 15 jaar en ouder. Percentage van de bevolking met deze ziekte of aandoening in de afgelopen 12 maanden, Gezondheidsenquête, België 2018**



Figuur 6 | **Top tien van de meest gerapporteerde chronische ziekten en aandoeningen in de bevolking van 65 jaar en ouder. Percentage van de bevolking met deze ziekte of aandoening in de afgelopen 12 maanden, Gezondheidsenquête, België 2018**



** Hartinfarct en coronaire hartziekte niet meegerekend*

2.2. Hoge bloeddruk

2.2.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË

17,6% van de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder verklaart in de 12 maanden voorafgaand aan het interview een hoge bloeddruk te hebben gehad. Hiervan neemt 10,4% geen behandeling, 2,1% volgt enkel een dieet en 87,5% neemt geneesmiddelen.

Regionale verschillen

Het percentage personen met een hoge bloeddruk is significant lager in het Brussels Gewest (13,2%) dan in het Vlaams (17,9%) en het Waals Gewest (18,4%) (Figuur 7). Na correctie voor leeftijd en geslacht is er enkel nog een significant verschil tussen het Brussels en Waals Gewest.

Figuur 7 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een hoge bloeddruk in het afgelopen jaar, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018



2.2.2. EVOLUTIE

Het percentage personen met een hoge bloeddruk is in België tussen 1997 (10,9%) en 2018 (17,6%) significant gestegen (Figuur 7). Deze stijging kan voor een deel, maar niet volledig verklaard worden door de vergrijzing van de bevolking.

Regionale verschillen

De trend die geobserveerd wordt voor België is nog meer uitgesproken in het Vlaams Gewest, waar het percentage personen met een hoge bloeddruk tussen 1997 en 2018 gestaag steeg van 9,7% tot 17,9%.

In het Brussels Gewest was de stijging van het percentage personen met een hoge bloeddruk tussen 1997 en 2008 eerder beperkt (van 11.7% tot 13.5%), maar was er een grotere stijging tussen 2008 en 2013 (tot 15,7%). Merkwaardig genoeg observeren we in 2018 een daling van dit percentage tot 13,2%. Deze daling is ook na correctie voor leeftijd en geslacht significant.

In het Waals Gewest observeren we tussen 1997 (12,9%) en 2018 (18,4%) een toename van het percentage personen met een hoge bloeddruk, maar de stijging is iets minder uitgesproken dan in het

Vlaams Gewest en in 2013 vertoont de trend een dip. De stijging tussen 2013 en 2018 is significant, ook na correctie voor leeftijd en geslacht.

Vergelijking van de trend in de gezondheidsenquête met gegevens van de ziekteverzekering

In Figuur 8 wordt het percentage personen met hoge bloeddruk tussen 2008 en 2018 vergeleken met het percentage personen dat voor minstens 90 dagen geneesmiddelen kreeg voorgeschreven die gebruikt worden voor hoge bloeddruk op basis van gegevens van de Permanente Steekproef van het Intermutualistisch Agentschap (IMA). De Permanente Steekproef volgt voor een groep personen alle terugbetaalde gezondheidsuitgaven, inclusief uitgaven voor terugbetaalde geneesmiddelen, en dit over de jaren heen. Deze groep wordt samengesteld op basis van een willekeurige trekking van de personen die ingeschreven zijn bij de mutualiteiten (1 persoon op 40 voor de personen tot 65 jaar, 1 op 20 voor de 65-plussers) (11).

De geselecteerde geneesmiddelen behoren tot ATC klassen C03 (diuretica), C07 (bèta-blokkers), C08 (calciumantagonisten) en C09 (geneesmiddelen werkende op het renine-angiotensinesysteem). Deze geneesmiddelen worden meestal gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen, maar kunnen ook soms andere indicaties hebben.

Figuur 8 | Percentage personen met zelfgerapporteerde hoge bloeddruk in de Gezondheidsenquête versus percentage personen dat voor minstens 90 dagen geneesmiddelen kreeg voorgeschreven die gebruikt worden voor hoge bloeddruk in de Permanente Steekproef, volgens gewest en jaar, België, 2008-2018



* DDD = Daily Defined Dose

In beide bronnen zien we over de volledige periode in het Vlaams en Waals Gewest een lichte stijging. In het Brussels Gewest blijft het percentage stabiel.

2.2.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN

Het percentage personen met een hoge bloeddruk is op het niveau van België ongeveer gelijk bij mannen (17,2%) als bij vrouwen (17,9%), maar stijgt sterk met de leeftijd van 1,0 % in de leeftijdsgroep tussen 15 en 24 jaar tot 39,0% bij 75-plussers (Figuur 9).

Figuur 9 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een hoge bloeddruk in het afgelopen jaar, volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018



Regionale verschillen

In het Vlaams en Waals Gewest is het percentage personen met een hoge bloeddruk niet verschillend tussen mannen en vrouwen. In het Brussels Gewest daarentegen is het percentage vrouwen met een hoge bloeddruk (14,7%) significant hoger dan het percentage mannen (11,6%). Na correctie voor leeftijd is dit verschil minder uitgesproken en niet meer significant.

De toename van het percentage personen met een hoge bloeddruk in functie van de leeftijd is van dezelfde grootteorde in alle gewesten. (Figuur 9)

2.2.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN

Het percentage personen met een hoge bloeddruk is het hoogst bij personen zonder diploma of enkel een diploma lager onderwijs (28,6%). Naargelang het opleidingsniveau stijgt, daalt dit percentage tot 14,0% bij de hoogst opgeleiden. Wanneer we corrigeren voor leeftijd en geslacht, verkleinen de verschillen fors. Toch is het percentage personen met een hoge bloeddruk ook na correctie voor leeftijd en geslacht significant hoger bij personen met een diploma lager secundair dan bij de hoogst opgeleiden.

Regionale verschillen

In de drie regio's observeren we dezelfde opleidingsgradiënt. In het Vlaams en Waals Gewest vinden we na correctie voor leeftijd en geslacht geen significante verschillen meer in het percentage personen met een hoge bloeddruk tussen hoog- en laagopgeleiden. In het Brussels Gewest is dit percentage ook na correctie voor leeftijd en geslacht significant lager bij de hoogst opgeleiden dan bij de andere drie opleidingsklassen.

2.3. Hoog cholesterolgehalte in het bloed

2.3.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË

18,0% van de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder verklaart in de 12 maanden voorafgaand aan het interview een hoog cholesterolgehalte in het bloed te hebben gehad. Hiervan neemt 23,6% geen behandeling, 6,6% volgt enkel een dieet en 69,7% neemt geneesmiddelen.

Regionale verschillen

Het percentage personen met een hoog cholesterolgehalte in het bloed is significant lager in het Brussels Gewest (13,2%) dan in het Vlaams (18,9%) en het Waals Gewest (18,0%) (Figuur 10) en dit blijft zo na correctie voor leeftijd en geslacht.

Figuur 10 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een hoog cholesterolgehalte in het bloed in het afgelopen jaar, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018



2.3.2. EVOLUTIE

Het percentage personen met een hoog cholesterolgehalte in het bloed is in België tussen 2013 (16,8%) en 2018 (18,0%) licht gestegen (Figuur 10) maar het verschil is niet significant.

Regionale verschillen

De trend die geobserveerd wordt voor België vinden we zowel terug in het Vlaams Gewest als in het Waals Gewest. Het betreft een lichte stijging, die niet significant is.

In het Brussels Gewest stellen we echter een significante daling vast van het percentage personen met een hoog cholesterolgehalte in het bloed van 16,3% in 2013 naar 13,2% in 2018. Deze daling is ook na correctie voor leeftijd en geslacht significant.

Vergelijking van de trend met gegevens van de ziekteverzekering

In Figuur 11 wordt het percentage personen met hoog cholesterolgehalte in het bloed tussen 2012 en 2018 vergeleken met het percentage personen dat voor minstens 90 dagen cholesterolremmers (ATC klasse C10) kreeg voorgeschreven op basis van gegevens van de Permanente Steekproef van het IMA.

Figuur 11 | Percentage personen met zelfgerapporteerd hoog cholesterolgehalte in het bloed in de Gezondheidsenquête versus percentage personen dat voor minstens 90 dagen cholesterolremmers kreeg voorgeschreven op basis van gegevens van de Permanente Steekproef, volgens gewest en jaar (2012-2018)



* DDD = Daily Defined Dose

De trends in het Vlaams en Brussels Gewest komen vrij goed overeen. Voor het Waals Gewest is dit niet het geval.

2.3.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN

Het percentage personen met een hoog cholesterolgehalte in het bloed is significant hoger bij mannen (18,9%) dan bij vrouwen (17,1%), en stijgt sterk met de leeftijd van 1,3 % in de leeftijdsgroep tussen 15 en 24 jaar tot 38,2% bij 65 tot 74-jarigen, om bij 75-plussers te dalen tot 35,9% (Figuur 12). Deze laatste daling is echter niet significant.

Regionale verschillen

Het verschil in de prevalentie van een hoog cholesterolgehalte in het bloed tussen mannen en vrouwen is enkel significant in het Vlaams Gewest. In het Brussels Gewest is deze prevalentie zelfs nagenoeg gelijk bij mannen (13.4%) en vrouwen (13,0%). Uit Figuur 12 blijkt tevens dat de hogere prevalentie van een hoog cholesterolgehalte in het bloed bij mannen dan bij vrouwen in het Vlaams Gewest vooral wordt geobserveerd in de leeftijdsgroep van 35 en 64 jaar.

Figuur 12 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een hoog cholesterolgehalte in het bloed in het afgelopen jaar, volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018



2.3.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN

De prevalentie van een hoge cholesterolgehalte in het bloed is het hoogst bij personen zonder diploma of enkel een diploma lager onderwijs (28,1%). Naargelang het opleidingsniveau stijgt, daalt dit percentage tot 14,7 % bij de hoogst opgeleiden. Wanneer we corrigeren voor leeftijd en geslacht, verkleinen de verschillen fors. Toch is het percentage personen met een hoog cholesterolgehalte in het bloed ook na correctie voor leeftijd en geslacht significant hoger bij personen met een diploma lager secundair dan bij de hoogst opgeleiden.

Regionale verschillen

Wanneer we het verband tussen de prevalentie van een hoog cholesterolgehalte in het bloed nagaan en het opleidingsniveau na correctie voor leeftijd en geslacht zijn er kleine verschillen tussen de drie regio's. In het Vlaams Gewest is deze prevalentie hoger bij personen met een opleiding lager secundair onderwijs dan bij de hoogst opgeleiden, in het Brussels gewest is de prevalentie hoger bij personen zonder diploma of enkel een diploma lager onderwijs dan bij de hoogst opgeleiden, en in het Waals Gewest vinden we geen significante verschillen.

In het Brussels Gewest rapporteren personen met een nationaliteit of geboorteland buiten de EU minder vaak dat ze een hoog cholesterolgehalte hebben dan Belgen, ook na correctie voor leeftijd, geslacht en opleiding.

2.4. Hartkwaal

In de lijst van aandoeningen die in de Gezondheidsenquête worden bevraagd, zijn er drie hartaandoeningen:

- Hartinfarct
- Coronaire hartziekte
- Andere ernstige hartkwaal

Enkel deze laatste aandoening bevindt zich in één van de top tien rangschikkingen die eerder werden voorgesteld, meer bepaald bij 65-plussers bij mannen. Er wordt niet gepreciseerd om welke hartkwaal het precies gaat, maar wellicht kan men er van uitgaan dat het vooral hartdecompensatie en hartritmestoornissen betreft.

Voor de volledigheid bespreken we hier de drie hartaandoeningen die in de Gezondheidsenquête aan bod komen. Voor “hartinfarct” en “coronaire hartziekte” zijn er vergelijkende gegevens in de Gezondheidsenquête sinds 2008, voor “andere ernstige hartkwaal” pas vanaf 2013.

Een hartinfarct is een acuut gebeuren en normaal gezien wordt de grootteorde van dit probleem in een populatie voorgesteld als een incidentie of een attack rate. In de gezondheidsenquête worden echter enkel prevalentiegegevens verzameld. In de context van een hartinfarct gaat het om het percentage personen dat in het jaar voorafgaand aan de enquête één of meerdere hartinfarcten heeft gehad.

2.4.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË

0,7% van de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder verklaart in de 12 maanden voorafgaand aan het interview een hartinfarct te hebben gehad, 1,3% geeft aan te hebben geleden aan coronaire hartziekte, terwijl 3,4% vermeldt aan een andere ernstige hartkwaal te hebben geleden.

Regionale verschillen

In het Vlaams Gewest zijn deze percentages respectievelijk 0.6%, 1.3% en 4.0%, in het Brussels Gewest, 0.6%, 1.0% en 1,6% en in het Waals Gewest 1.0%, 1,4% en 2,9% (Figuur 13).

Er zijn geen significante regionale verschillen voor wat betreft de prevalentie van hartinfarct en coronaire hartziekte. In het Brussels Gewest rapporteren echter significant minder personen aan een andere ernstige hartkwaal te lijden, ook na correctie voor leeftijd en geslacht (Figuur 13).

2.4.2. EVOLUTIE

Uit Figuur 13 blijkt dat de evolutie van de prevalentie van de hartafwijkingen tussen 2013 en 2018 verschilt naargelang de hartafwijking. Tussen 2008 en 2018 bleef de prevalentie van een hartinfarct vrij stabiel en nam de prevalentie van coronaire hartziekte af van 2,1% in 2008 over 1,5% in 2013 naar 1,3% in 2018. Het gaat om een significante daling. Anderzijds steeg het percentage personen met een ernstige hartkwaal (uitgezonderd hartinfarct en coronaire hartziekte) tussen 2013 en 2018 van 2,2% naar 3,4%, en dit verschil is ook significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

Regionale verschillen

In het Vlaams en Waals Gewest is de evolutie van de prevalentie van hartaandoeningen gelijk aan wat geobserveerd wordt voor het hele land. De significante toename van het percentage personen met een ernstige hartkwaal (uitgezonderd hartinfarct en coronaire hartziekte) in het Vlaams en Waals Gewest tussen 2013 en 2018 wordt niet geobserveerd in het Brussels Gewest.

Figuur 13 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een hartprobleem in het afgelopen jaar, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018



2.4.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN

In regel nemen alle hartafwijkingen toe met de leeftijd en is de prevalentie van hartafwijkingen hoger bij mannen dan bij vrouwen. Het verschil tussen mannen en vrouwen is echter na correctie voor leeftijd niet significant voor wat betreft de prevalentie van coronaire hartziekten.

Regionale verschillen

In de drie gewesten stijgt de prevalentie van hartafwijkingen met de leeftijd. Opmerkelijk is echter de zeer hoge prevalentie van een ernstige hartkwaal (uitgezonderd hartinfarct en coronaire hartziekte) in het Vlaams Gewest bij 75-plussers (15,5 %). In het Brussels en Waals Gewest is dit respectievelijk 7,6% en 6,0%.

Verder blijken hartinfarct en coronaire hartziekte in het Waals Gewest in dezelfde mate voor te komen bij mannen en vrouwen, daar waar de prevalenties van deze aandoeningen in het Brussels en Vlaams Gewest veel hoger zijn bij mannen dan bij vrouwen.

2.4.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN

Voor elk van deze drie aandoeningen geldt dat ze vaker voorkomen naarmate men minder opgeleid is. Na correctie voor leeftijd en geslacht zijn de verschillen niet meer significant, behalve voor de prevalentie van een hartinfarct, waarvoor na correctie voor leeftijd en geslacht nog steeds een zeer duidelijke opleidingsgradiënt geobserveerd wordt.

Regionale verschillen

Na correctie voor leeftijd en geslacht zijn de verschillen in de prevalentie van hartinfarct volgens opleiding veel duidelijker in het Vlaams Gewest dan in de andere gewesten. Voor de andere hartafwijkingen zijn er weinig tot geen regionale verschillen.

2.5. Lage rugprobleem

2.5.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË

24,8% van de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder verklaart in de 12 maanden voorafgaand aan het interview een lage rugprobleem te hebben gehad.

Regionale verschillen

Het percentage personen met een lage rugprobleem is het hoogst in het Vlaams Gewest (27,4%), minder hoog in het Waals Gewest (22,9%) en het laagst in het Brussels Gewest (17,5%) (Figuur 14). Alle verschillen tussen de gewesten zijn significant, ook na correctie voor leeftijd en geslacht.

Figuur 14 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een lage rugprobleem, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018



2.5.2. EVOLUTIE

Het percentage personen met een lage rugprobleem bleef tussen 2008 (20,5%) en 2013 (20,8%) stabiel, maar is in 2018 significant gestegen tot 24,8% (Figuur 14). Deze stijging is significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

Regionale verschillen

De trend die geobserveerd wordt voor België wordt zowel in het Vlaams Gewest als het Waals Gewest teruggevonden. De stijging van het percentage personen met een rugprobleem tussen 2013 en 2018 is meer uitgesproken in het Waals Gewest (van 17,0% naar 22,9%) dan in het Vlaams Gewest (van 23,1% naar 27,4%), maar ook de toename in het Vlaams Gewest is significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

In het Brussels Gewest is de prevalentie van lage rugpijn tussen 2013 en 2018 gedaald van 20,1% naar 17,5%, maar deze daling is na correctie voor leeftijd en geslacht niet significant.

2.5.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN

Het percentage vrouwen van 15 jaar en ouder met een lage rugprobleem (26,4%) is hoger dan het percentage mannen met dit probleem (23,2%) en dit verschil blijft significant na correctie voor leeftijd.

De prevalentie van een lage rugprobleem neemt sterk toe met de leeftijd, van 9,7 % in de leeftijdsgroep tussen 15 en 24 jaar tot 35,2% bij 75-plussers (Figuur 15).

Figuur 15 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een lage rugprobleem, in het afgelopen jaar, volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018



Regionale verschillen

Hoewel de prevalentie van een laag rugprobleem in alle gewesten hoger is bij vrouwen dan bij mannen, is het verschil na correctie voor leeftijd enkel significant in het Brussels Gewest. De toename in functie van de leeftijd is vrij constant in de drie gewesten (Figuur 15).

2.5.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN

Het percentage personen met een lage rugprobleem is het hoogst bij personen zonder diploma of enkel een diploma lager onderwijs (32,8%). Naargelang het opleidingsniveau stijgt, daalt dit percentage tot 21,0 % bij de hoogst opgeleiden. Wanneer we corrigeren voor leeftijd en geslacht, verkleinen de verschillen fors. Er is geen duidelijke opleidingsgradiënt meer, hoewel de laagst opgeleiden significant vaker een rugprobleem vermelden dan de hoogst opgeleiden. Ook personen met een diploma hoger secundair onderwijs blijken echter significant vaker een lage rugprobleem te rapporteren dan personen met een diploma hoger onderwijs.

Regionale verschillen

Zowel in Vlaanderen als in Wallonië vinden we na correctie voor leeftijd en geslacht een significant hogere prevalentie van lage rugproblemen bij de laagst opgeleiden en personen met een opleiding hoger secundair t.o.v. personen met een diploma hoger onderwijs. In het Brussels Gewest vinden we

ook na correctie voor leeftijd en geslacht een opleidingsgradiënt: hoe hoger opgeleid, hoe minder rugklachten. De onderlinge verschillen zijn echter niet significant.

2.6. Nekprobleem

2.6.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË

14,9% van de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder verklaart in de 12 maanden voorafgaand aan het interview een nekprobleem te hebben gehad.

Regionale verschillen

Het percentage personen met een nekprobleem is het hoogst in het Vlaams Gewest (16,0%), minder hoog in het Waals Gewest (14,3%) en het laagst in het Brussels Gewest (10,2%) (Figuur 16). Het verschil tussen het Vlaams Gewest en het Waals Gewest is niet significant, maar in het Brussels Gewest is het percentage personen met een nekprobleem significant lager dan in Vlaanderen en Wallonië, ook na correctie voor leeftijd en geslacht.

Figuur 16 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een nekprobleem in het afgelopen jaar, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018



2.6.2. EVOLUTIE

Het percentage personen met een nekprobleem bleef tussen 2008 (11,5%) en 2013 (11,8%) stabiel, maar is in 2018 significant gestegen tot 14,9% (Figuur 16). Deze stijging is significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

Regionale verschillen

De trend die geobserveerd wordt voor België wordt zowel in het Vlaams Gewest als in het Waals Gewest teruggevonden. De stijging van het percentage personen met een nekprobleem tussen 2013 en 2018 is van dezelfde grootteorde in het Waals Gewest (van 10,5% naar 14,3%) als in het Vlaams Gewest (van 12,2% naar 16,0%) (Figuur 16).

In het Brussels Gewest is de prevalentie van nekpijn tussen 2013 en 2018 significant gedaald van 13,0% naar 10,2%. Ook na correctie voor leeftijd en geslacht is de daling significant.

2.6.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN

Het percentage vrouwen van 15 jaar en ouder met een nekprobleem (13,7%) is fors hoger dan het percentage mannen met dit probleem (6,4%) en dit verschil blijft significant na correctie voor leeftijd. De prevalentie van nekproblemen neemt eerst toe met de leeftijd (van 5,4 % in de leeftijdsgroep tussen 15 en 24 jaar tot 19,4 % bij 45-54 jarigen), maar blijft in de oudere leeftijdsgroepen quasi gelijk (Figuur 17).

Figuur 17 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een nekprobleem, in het afgelopen jaar, volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018



Regionale verschillen

Nekproblemen komen in alle drie de gewesten veel vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Ook de verschillen in functie van leeftijd zijn dezelfde in de drie gewesten (Figuur 17)

Opmerkelijk is dat in het Brussels Gewest mensen met een niet-Europese nationaliteit significant minder vaak aangeven dat ze last hebben van een nekprobleem.

2.6.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN

Er zijn geen significante verschillen in het percentage personen met een nekprobleem volgens het opleidingsniveau, ook niet na correctie voor leeftijd en geslacht.

Regionale verschillen

Ook op het niveau van de regio's worden geen noemenswaardige opleidingsverschillen vastgesteld

2.7. Artrose

2.7.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË

18,6% van de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder verklaart in de 12 maanden voorafgaand aan het interview artrose te hebben gehad.

Regionale verschillen

Het percentage personen met artrose is het hoogst in het Waals Gewest (20,8%), lager in het Vlaams Gewest (18,4%) en het laagst in het Brussels Gewest (12,3%) (Figuur 18). Alle verschillen tussen de gewesten zijn ook na correctie voor leeftijd en geslacht significant.

Figuur 18 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met artrose in het afgelopen jaar, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018



2.7.2. EVOLUTIE

Het percentage personen met artrose bleef tussen 1997 (12,1%) en 2004 (12,6%) vrij stabiel, maar is sindsdien in stijgende lijn: 15,9% in 2008, 16,7% in 2013 en 18,6% in 2018 (Figuur 18). De stijging is significant, ook na correctie voor leeftijd en geslacht. De toename van de prevalentie van artrose kan dus niet enkel toegeschreven worden aan de verouderende bevolking.

Regionale verschillen

De trend die geobserveerd wordt voor België wordt zowel in het Vlaams Gewest als het Waals Gewest teruggevonden, maar de stijging van het percentage personen met artrose tussen 2004 en 2018 is iets mee uitgesproken in het Waals Gewest (van 13,4% naar 20,8%) dan in het Vlaams Gewest (van 12,6% naar 18,0%) (Figuur 18). In het Brussels Gewest vertoont de prevalentie van artrose tussen 1997 en 2018 zeer weinig variatie.

2.7.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN

Het percentage vrouwen van 15 jaar en ouder met artrose (22,7%) is fors hoger dan het percentage mannen met dit probleem (14,3%) en dit verschil blijft significant na correctie voor leeftijd. De prevalentie

van artrose neemt sterk toe met de leeftijd, van 1,1 % in de leeftijdsgroep tussen 15 en 24 jaar tot 44,1% bij 75-plussers (Figuur 19).

Figuur 19 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met artrose in het afgelopen jaar, volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018



Regionale verschillen

Verschillen in de prevalentie van artrose in functie van leeftijd en geslacht zijn dezelfde in de drie gewesten (Figuur 19).

Opmerkelijk is dat in het Brussels Gewest mensen met een niet-Belgische nationaliteit (zowel EU-burgers als niet EU-burgers) significant minder vaak aangeven dat ze last hebben van artrose.

2.7.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN

Op basis van de ruwe cijfers lijkt het alsof de prevalentie van artrose toeneemt naarmate het opleidingsniveau daalt, maar na correctie voor leeftijd en geslacht is er enkel nog een significant verschil tussen de hoogst opgeleiden, bij wie artrose minder voorkomt, en personen in de andere drie opleidingscategorieën.

Regionale verschillen

Uit de analyses per regio blijkt dat er enkel in het Vlaams Gewest een significant verschil is in de prevalentie van artrose tussen de hoogst opgeleiden en de andere opleidingscategorieën. In het Brussels en Waals Gewest worden na correctie voor leeftijd en geslacht geen significante verschillen teruggevonden in functie van de opleiding.

2.8. Artritis

In de gezondheidsenquête wordt apart nagevraagd of mensen artrose (slijtage van de gewrichten) en reumatoïde artritis (ontsteking van de gewrichten) hebben. Het is duidelijk dat mensen niet steeds goed het onderscheid kunnen maken tussen deze twee aandoeningen. Bovendien mag aangenomen worden dat ook andere gewrichtsontstekingen door leken soms al reumatoïde artritis of 'reuma' bestempeld worden. In deze bespreking maken we daarom gebruik van de term "artritis".

2.8.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË

7,8% van de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder verklaart in de 12 maanden voorafgaand aan het interview artritis te hebben gehad.

Regionale verschillen

Het percentage personen met artritis bedraagt 9,6% in het Vlaams Gewest, 5,8% in het Waals Gewest en 4,4% in het Brussels Gewest (Figuur 20). Na correctie voor leeftijd en geslacht zijn enkel de verschillen tussen enerzijds het Vlaams Gewest en anderzijds het Brussels en Waals Gewest significant.

Figuur 20 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een artritis in het afgelopen jaar, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018



2.8.2. EVOLUTIE

Het percentage personen met een artritis bleef op het niveau van België tussen 1997 en 2018 vrij constant (tussen 6,6% en 8,1%) (Figuur 20).

Regionale verschillen

Voor deze aandoening zijn de trends zeer verschillend tussen de gewesten. In het Vlaams Gewest noteren we tussen 1997 en 2018 een stijging van de prevalentie van artritis van 5,1% naar 9,6%. In het Brussels Gewest noteren we tijdens dezelfde periode een daling van 7,5% in 1997 naar 4,4% in 2018. Ook in het Waals Gewest is er een belangrijke daling (9,0% in 1997, 5,8% in 2018). Het gaat om significante verschillen, ook na correctie voor leeftijd en geslacht.

2.8.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN

Het percentage vrouwen van 15 jaar en ouder met artritis (9,5%) is significant hoger dan het percentage mannen met dit probleem (5,9%) en dit verschil blijft significant na correctie voor leeftijd. De prevalentie van artritis neemt toe met de leeftijd, van 1,6 % in de leeftijdsgroep tussen 15 en 24 jaar tot 17,4% bij 75-plussers (Figuur 21).

Regionale verschillen

Verschillen in de prevalentie van artritis in functie van leeftijd en geslacht zijn dezelfde in de drie gewesten (Figuur 21).

In het Brussels Gewest geven mensen met een geboorteland buiten de EU minder aan dat ze lijden aan artritis dan personen die in België geboren zijn, maar dat verschil is niet meer significant na correctie voor leeftijd, geslacht en opleiding.

Figuur 21 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met artritis in het afgelopen jaar, volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018



2.8.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN

Op basis van de ruwe cijfers lijkt het alsof de prevalentie van artritis toeneemt naarmate het opleidingsniveau daalt, maar na correctie voor leeftijd en geslacht is er enkel nog een significant verschil tussen de hoogste opleidingscategorie, met de laagst prevalentie van artritis, en de andere drie opleidingscategorieën.

Regionale verschillen

In de drie regio's wordt de laagste prevalentie gevonden bij de hoogst opgeleiden, maar het verschil in de prevalentie van artritis tussen de hoogst en de laagst opgeleiden is na correctie voor leeftijd en geslacht enkel significant in het Waals Gewest.

2.9. Diabetes

2.9.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË

5,9% van de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder verklaart in de 12 maanden voorafgaand aan het interview diabetes te hebben gehad. Hiervan geeft 4,7% aan geen behandeling te nemen, 3,8 % volgt enkel een dieet, 61,8% neemt enkel orale antidiabetica en 29,7% gebruikt insuline. 91,5% van de personen met diabetes geeft dus aan hiervoor medicamenteus behandeld te worden.

Regionale verschillen

Het percentage personen met diabetes is 6,6% in het Waals Gewest, 5,9% in het Brussels Gewest en 5,5% in het Vlaams Gewest (Figuur 22). Na correctie voor leeftijd en geslacht is het percentage personen met diabetes significant lager in het Vlaams Gewest dan in de andere twee gewesten.

Figuur 22 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een diabetes in het afgelopen jaar, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018



2.9.2. EVOLUTIE

Het percentage personen met diabetes is in België tussen 1997 (2,7%) en 2018 (5,9%) significant gestegen (Figuur 22). Deze stijging is over de jaren heen vrij lineair en kan voor een deel, maar zeker niet volledig verklaard worden door de vergrijzing van de bevolking.

Regionale verschillen

De toename van het percentage personen met diabetes doet zich voor in de drie gewesten. In het Vlaams Gewest steeg dit percentage tussen 1997 en 2018 van 2,1% naar 5,5%, in het Brussels Gewest van 3,3% naar 5,9% en in het Waals Gewest van 3,6% naar 6,6%.

Vergelijking van de trend met gegevens van de ziekteverzekering

In Figuur 23 wordt het percentage personen met diabetes tussen 2008 en 2018 vergeleken met het percentage personen dat voor minstens 90 dagen geneesmiddelen voor diabetes (ATC klasse A10) kreeg voorgeschreven op basis van gegevens van de Permanente Steekproef van het IMA.

Figuur 23 | Percentage personen met diabetes in de Gezondheidsenquête versus percentage personen dat voor minstens 90 dagen geneesmiddelen voor diabetes kreeg voorgeschreven op basis van gegevens van de Permanente Steekproef, volgens gewest en jaar (2008-2018)



* DDD = Daily Defined Dose

In de drie gewesten komen de trends goed overeen.

2.9.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN

Het percentage personen met diabetes is op het niveau van België iets hoger bij mannen (6,1%) dan bij vrouwen (5,6%), maar dit verschil is niet significant. De prevalentie van diabetes stijgt sterk met de leeftijd: van 1,0 % in de leeftijdsgroep tussen 15 en 24 jaar tot 14,4% bij 75-plussers (Figuur 24).

Regionale verschillen

In het Vlaams Gewest is de prevalentie van diabetes na correctie voor leeftijd significant hoger bij mannen dan bij vrouwen. In de andere twee gewesten worden geen verschillen in functie van het geslacht voorgesteld.

De toename van het percentage personen met diabetes in functie van de leeftijd is van dezelfde grootteorde in de drie gewesten (Figuur 24).

In het Brussels Gewest zijn er na correctie voor leeftijd, geslacht en opleidingsniveau geen verschillen in de prevalentie van diabetes in functie van nationaliteit of geboorteland.

Figuur 24 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes, in het afgelopen jaar, volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018



2.9.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN

Het percentage personen met diabetes is het hoogst bij personen zonder diploma of enkel een diploma lager onderwijs (13,4%). Naargelang het opleidingsniveau stijgt, daalt dit percentage tot 3,6 % bij de hoogst opgeleiden. Na correctie voor leeftijd en geslacht verkleinen de verschillen, maar blijft er een duidelijke opleidingsgradiënt bestaan.

Regionale verschillen

In de drie regio's observeren we dezelfde duidelijke opleidingsgradiënt, ook na correctie voor leeftijd en geslacht.

2.10. Schildklierlijden

2.10.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË

7,0 % van de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder verklaart in de 12 maanden voorafgaand aan het interview schildklierlijden te hebben gehad.

Het percentage personen met schildklierlijden bedraagt 10,9% in het Waals Gewest, 7,0% in het Brussels Gewest en 4,7% in het Vlaams Gewest (Figuur 25). De verschillen tussen de gewesten zijn ook na correctie voor leeftijd en geslacht sterk significant.

Figuur 25 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met schildlierlijden in het afgelopen jaar, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018



2.10.2. EVOLUTIE

Het percentage personen met schildklierlijden is in België tussen 1997 (3,1%) en 2018 (7,0%) significant gestegen (Figuur 25). De stijging wordt niet verklaard door de vergrijzing van de bevolking. Ook na correctie voor leeftijd en geslacht is er een zeer sterke toename.

Regionale verschillen

De toename van het percentage personen met schildklierlijden doet zich voor in de drie gewesten, maar is het meest uitgesproken in het Waals Gewest en het minst in het Vlaams Gewest. Ook in Vlaanderen is de stijging echter zeer significant. In het Waals Gewest steeg de prevalentie van schildklierlijden tussen 1997 en 2018 van 4,4% naar 10,9%, in het Brussels Gewest van 3,0% naar 7,0% en in het Vlaams Gewest van 2,5% naar 4,7%.

Vergelijking van de trend met gegevens van de ziekteverzekering

In Figuur 26 wordt het percentage personen met schildklierlijden tussen 2008 en 2018 vergeleken met het percentage personen dat voor minstens 90 dagen geneesmiddelen voor schildklierlijden (ATC klasse H03) kreeg voorgeschreven op basis van gegevens van de Permanente Steekproef van het IMA.

Figuur 26 | Percentage personen met schildklierlijden in de Gezondheidsenquête versus percentage personen dat voor minstens 90 dagen geneesmiddelen voor schildklierlijden kreeg voorgeschreven op basis van gegevens van de Permanente Steekproef, volgens gewest en jaar (2008-2018)



* DDD = Daily Defined Dose

In de drie gewesten komen de trends vrij goed overeen.

2.10.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN

De prevalentie van schildklierlijden is vier maal hoger bij vrouwen (11,0%) dan bij mannen (2,8%) en stijgt sterk met de leeftijd: van 2,9 % in de leeftijdsgroep tussen 15 en 24 jaar tot 12,2% bij 65-74 jarigen en 11,5% bij 75-plussers (Figuur 27).

Regionale verschillen

De verschillen volgens leeftijd en geslacht die geobserveerd worden in België worden teruggevonden in elk van de regio's.

In het Brussels Gewest blijkt dat personen met een nationaliteit van buiten de EU significant minder vaak schildklierlijden rapporteren dan Belgen en dit verschil blijft significant na correctie voor leeftijd, geslacht en opleidingsniveau.

Figuur 27 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met schildklierlijden in het afgelopen jaar, volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018



2.10.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN

De ruwe cijfers suggereren dat schildklierlijden zou afnemen naarmate het opleidingsniveau stijgt, maar correctie voor leeftijd en geslacht geeft aan dat dit volledig te maken heeft met het feit dat laagopgeleiden in regel ouder zijn. Na correctie voor leeftijd en geslacht worden geen verschillen waargenomen in de prevalentie van schildklierlijden in functie van het opleidingsniveau.

Regionale verschillen

In geen enkele regio zijn er na correctie voor leeftijd en geslacht verschillen in de prevalentie van schildklierlijden in functie van het opleidingsniveau.

2.11. Prostaatklachten

2.11.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË

4,9 % van de mannelijke Belgische bevolking van 15 jaar en ouder verklaart in de 12 maanden voorafgaand aan het interview prostaatklachten te hebben gehad.

Regionale verschillen

Het percentage mannen met prostaatklachten bedraagt 5,2% in het Vlaams Gewest, 4,7% in het Waals Gewest en 4,2% in het Brussels Gewest (Figuur 28). De verschillen tussen de gewesten zijn na correctie voor leeftijd echter niet significant.

Figuur 28 | Percentage van de mannelijke bevolking van 15 jaar en ouder met prostaatklachten in het afgelopen jaar, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018



2.11.2. EVOLUTIE

Het percentage mannen met prostaatklachten in België is sinds 2008 licht gestegen, maar deze stijging kan volledig verklaard worden door de vergrijzing van de bevolking. Na correctie voor leeftijd is de toename niet langer significant.

Regionale verschillen

Na correctie voor leeftijd wordt in geen enkel van de 3 gewesten een toename vastgesteld van het percentage mannen met prostaatklachten (Figuur 28).

2.11.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN

Prostaatlijden is een typische ouderdomsziekte en beneden de 65 jaar is de prevalentie laag. Bij 65-plussers heeft 18,7% van de mannen hiermee te kampen. Bij 75-plussers loopt dit op tot 26,1%. (Figuur 29).

Regionale verschillen

De leeftijdsverdeling is dezelfde in de drie gewesten. In het Vlaams Gewest rapporteert 18,2% van de mannelijke 65-plussers prostaatklachten. In het Brussels Gewest is dit 20,3% en in het Waals gewest 19,4% .

Een merkwaardige vaststelling is dat in het Brussels Gewest prostaatklachten significant meer voorkomen bij niet Belgische EU burgers dan bij Belgen en dit verschil is sterk significant na correctie voor leeftijd en opleidingsniveau.

Figuur 29 | Percentage van de mannelijke bevolking van 15 jaar en ouder met prostaatklachten in het afgelopen jaar, volgens leeftijd, voor België en de drie gewesten, Gezondheidsenquête, België 2018



2.11.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN

De ruwe cijfers suggereren dat prostaatklachten zouden toenemen naarmate het opleidingsniveau daalt, maar na correctie voor leeftijd worden geen verschillen meer waargenomen in de prevalentie van prostaatklachten in functie van het opleidingsniveau. De opleidingsgradiënt kan dus verklaard worden door de samenhang tussen leeftijd en opleidingsniveau.

Regionale verschillen

In geen enkele regio zijn er na correctie voor leeftijd verschillen in de prevalentie van prostaatklachten in functie van het opleidingsniveau.

2.12. Urinaire incontinentie

2.12.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË

5,0 % van de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder verklaart in de 12 maanden voorafgaand aan het interview urinaire incontinentie te hebben gehad.

Regionale verschillen

Het percentage personen met urinaire incontinentie is 5,6% in het Vlaams Gewest,4,5% in het Waals Gewest en 3,5% in het Brussels Gewest (Figuur 30). De verschillen tussen de gewesten zijn echter niet significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

Figuur 30 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met urinaire incontinentie in het afgelopen jaar, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018



2.12.2. EVOLUTIE

Het percentage personen met urinaire incontinentie is in België tussen 2008 (3,6%) en 2018 (5.0%) significant gestegen (Figuur 30). De stijging wordt niet volledig verklaard door de vergrijzing van de bevolking. Ook na correctie voor leeftijd en geslacht is er een significante toename.

Regionale verschillen

De evolutie is niet identiek in de drie gewesten (Figuur 30).

In het Vlaams Gewest stijgt het percentage personen met incontinentie tussen 2008 en 2018 significant van 3,9% naar 5,6%. Deze stijging blijft significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

In het Waals Gewest stijgt dit percentage tussen 2008 en 2018 van 3,3% naar 4,5%, maar de stijging is niet significant.

In het Brussels Gewest noteren we tussen 2008 en 2018 geen significante verschillen.

2.12.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN

De prevalentie van urinaire incontinentie is hoger bij vrouwen (6,4%) dan bij mannen (3,6%) en stijgt met de leeftijd. Pas vanaf de leeftijd van 65 jaar neemt de prevalentie sterk toe. Ongeveer 1 op 5 (21,4%) van de 75-plussers heeft met dit probleem te kampen (Figuur 31).

Figuur 31 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met urinaire incontinentie, in het afgelopen jaar, volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018



Regionale verschillen

In het Vlaams en Waals Gewest komt urinaire continentie vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. In het Brussels Gewest is het verschil tussen mannen en vrouwen niet significant, en het verkleint nog na correctie voor leeftijd. In de drie regio's stijgt de prevalentie sterk met de leeftijd.

In het Brussels Gewest blijkt dat personen met een nationaliteit van buiten de EU significant minder vaak urinaire incontinentie rapporteren dan Belgen en dit verschil blijft significant na correctie voor leeftijd, geslacht en opleidingsniveau.

2.12.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN

De ruwe cijfers suggereren dat urinaire incontinentie toeneemt naarmate het opleidingsniveau daalt. Na correctie voor leeftijd en geslacht verkleinen de verschillen, maar deze verdwijnen niet. Ook na correctie voor leeftijd en geslacht blijkt dat de laagst opgeleiden significant vaker urinaire incontinentie rapporteren dan de hoogst opgeleiden.

Regionale verschillen

De verschillen volgens opleiding gelden niet voor alle regio's. In het Vlaams Gewest en het Waals Gewest observeren we na correctie voor leeftijd en geslacht een significant hogere prevalentie van urinaire incontinentie bij de laagst opgeleiden. In het Brussels Gewest worden na correctie voor leeftijd en geslacht geen verschillen in functie van de opleiding vastgesteld.

2.13. Allergie

Het betreft hier alle vormen van allergie zoals neusloop, oogontsteking, huiduitslag, voedselallergie, … maar geen allergisch astma.

2.13.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË

18,7% van de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder verklaart in de 12 maanden voorafgaand aan het interview last te hebben gehad van allergie.

Regionale verschillen

Het percentage personen met allergie is 19,5% in het Vlaams Gewest, 17,9% in het Brussels Gewest en 17,6% in het Waals Gewest. De verschillen tussen de gewesten zijn echter niet significant na correctie voor leeftijd en geslacht (Figuur 32).

Figuur 32 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met allergie in het afgelopen jaar, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018



2.13.2. EVOLUTIE

Het percentage personen met allergie situeerde zich tussen 1997 en 2013 steeds in de buurt van de 13 tot 14%, maar steeg in 2018 significant naar 18,7% (Figuur 32). De stijging blijft significant als gecorrigeerd wordt voor leeftijd en geslacht.

Regionale verschillen

Zowel in het Vlaams als het Waals Gewest stijgt de prevalentie van allergie tussen 2013 en 2018 significant. In het Vlaams Gewest is er een toename van 14,9% naar 19,5%, in het Waals Gewest een toename van 12,1 naar 17,6%. In het Brussels Gewest is de toename tussen 2013 (16,5%) en 2018 (17,9%) kleiner en niet significant.

Vergelijking van de trend met gegevens van de ziekteverzekering

In Figuur 33 wordt het percentage personen met allergie tussen 2008 en 2018 vergeleken met het percentage personen dat voor minstens 30 dagen antihistaminica (ATC klasse H03) kreeg voorgeschreven op basis van gegevens van de Permanente Steekproef van het IMA.

Figuur 33 | Percentage personen met allergie in de Gezondheidsenquête versus percentage personen dat voor minstens 30 dagen antihistaminica kreeg voorgeschreven op basis van gegevens van de Permanente Steekproef, volgens gewest en jaar (2008-2018)

* DDD = Daily Defined Dose

In de drie gewesten komen de trends vrij goed overeen, hoewel de stijging in de gezondheidsenquête meer uitgesproken is.

2.13.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN

De prevalentie van allergie is hoger bij vrouwen (20,3%) dan bij mannen (17,0%) en na correctie voor leeftijd is dit verschil significant. Verschillen in functie van de leeftijd zijn relatief beperkt, maar een iets hogere prevalentie (meer dan 20%) wordt vastgesteld in de leeftijdsgroep jonger dan 45 jaar (Figuur 34). Bij 75-plussers is de prevalentie van allergie het laagst (15,1%).

Regionale verschillen

In de drie regio's blijkt dat allergie vaker gerapporteerd wordt door vrouwen dan mannen, maar enkel in het Brussels Gewest is dit verschil significant (Figuur 34).

In alle regio's zijn de verschillen in de prevalentie volgens leeftijd vrij beperkt, maar in het Waals Gewest is deze prevalentie bij 75-plussers (11,2%) veel lager dan in het Vlaams Gewest (16,5%) en het Brussels Gewest (19,8%).

In Brussels Gewest is de prevalentie van allergie significant lager bij mensen met een nationaliteit of geboorteland van buiten de EU dan bij Belgen. Ook personen die geboren zijn in een EU-land buiten België rapporteren significant minder vaak allergie dan personen die in België geboren zijn.

Figuur 34 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met allergie, in het afgelopen jaar, volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018



2.13.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN

Op het niveau van België stellen we geen samenhang vast tussen de prevalentie van allergie en het opleidingsniveau.

Regionale verschillen

In het Waals en Vlaams Gewest varieert de prevalentie van allergie niet volgens het opleidingsniveau. In het Brussels Gewest is dit echter wel het geval. De prevalentie van allergie neemt er toe naarmate het opleidingsniveau toeneemt. Het verschil in prevalentie tussen de laagste en hoogste opleidingsklasse is significant, ook na correctie van leeftijd en geslacht.

2.14. Ernstige hoofdpijn zoals migraine

2.14.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË

10,2% van de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder verklaart in de 12 maanden voorafgaand aan het interview ernstige hoofdpijn zoals migraine te hebben gehad. In de verdere bespreking gebruiken we de term ‘ernstige hoofdpijn’.

Regionale verschillen

Het percentage personen met ernstige hoofdpijn is 11,2% in het Vlaams Gewest, 9,5% in het Brussels Gewest en 8,9% in het Waals Gewest (8,9%) (Figuur 35). Het verschil tussen het Vlaams Gewest en de twee andere gewesten is significant, ook na correctie voor leeftijd en geslacht.

Figuur 35 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ernstige hoofdpijn in het afgelopen jaar, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018



2.14.2. EVOLUTIE

Het percentage personen met ernstige hoofdpijn is in België tussen 1997 en 2018 relatief stabiel gebleven (Figuur 35).

Regionale verschillen

De evolutie van de prevalentie van ernstige hoofdpijn vertoonde tussen 1997 en 2008 belangrijke regionale verschillen (Figuur 35), met name een daling van deze prevalentie in het Waals en Brussels Gewest en geen duidelijke trend in het Vlaams Gewest. Tussen 2008 en 2018 blijft het percentage personen met ernstige hoofdpijn in de drie gewesten vrij stabiel. Toch noteren we in het Vlaams Gewest tussen 2013 en 2018 een toename, die ook significant is na correctie voor leeftijd en geslacht.

2.14.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN

De prevalentie van ernstige hoofdpijn is ongeveer dubbel zo hoog bij vrouwen (13,4%) als bij mannen (6,9%) en ook na correctie voor leeftijd is dit verschil sterk significant. Bij 15 tot 24-jarigen bedraagt deze prevalentie 10,0%. Deze stijgt tot maximaal 14,6% in de leeftijdsgroep 35-44 jaar om vervolgens te dalen tot 4,8% bij de 75-plussers (Figuur 36).

Regionale verschillen

De demografische verschillen en trends zijn dezelfde in de drie regio's. In het Vlaams Gewest wordt de hoogste prevalentie echter genoteerd in de leeftijdsgroep van 55 tot 64 jaar en in het Brussels Gewest bij de 45 tot 54 jarigen.

In het Brussels Gewest blijkt dat de prevalentie van ernstige hoofdpijn na correctie voor leeftijd en geslacht significant lager is bij niet EU burgers dan bij Belgen.

Figuur 36 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ernstige hoofdpijn zoals migraine, in het afgelopen jaar, volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018



2.14.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN

Ernstige hoofdpijn komt significant vaker voor bij de laagst opgeleiden dan bij de hoogst opgeleiden, ook na correctie voor leeftijd en geslacht, maar op het niveau van België is er geen duidelijke opleidingsgradiënt.

Regionale verschillen

De opleidingsverschillen voor deze indicator zijn niet dezelfde in de drie regio's.

In het Vlaams Gewest is er een duidelijke opleidingsgradiënt: hoe hoger opgeleid, hoe lager het percentage personen met ernstige hoofdpijn. In het Brussels Gewest zijn er na correctie voor leeftijd en geslacht geen significante verschillen in functie van het opleidingsniveau.

In het Waals Gewest komt ernstige hoofdpijn het vaakst voor bij personen met een diploma hoger secundair onderwijs. Na correctie voor leeftijd en geslacht blijkt ernstige hoofdpijn in deze opleidingsgroep significant vaker voor te komen dan bij personen met een diploma hoger onderwijs

2.15. Langdurige vermoeidheid

Langdurige vermoeidheid wordt in gezondheidsenquête gedefinieerd als "Langdurige vermoeidheid voor een periode van minstens 3 maanden". Langdurige vermoeidheid kan uiteraard een symptoom zijn van een aantal ziekten, zoals kanker en hartfalen, maar in de literatuur wordt dit ook beschouwd als een

entiteit op zich, die vaak voorkomt zonder dat er een onderliggende ziekte aan de basis ligt en waarvoor het zinvol is om gegevens op het niveau van de algemene populatie te verzamelen.

2.15.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË

8,2% van de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder verklaart in de 12 maanden voorafgaand aan het interview langdurige vermoeidheid te hebben gehad.

Regionale verschillen

Het percentage personen met langdurige vermoeidheid bedraagt 8,0% in het Vlaams Gewest, 7,1% in het Brussels Gewest en 8,7 % in het Waals Gewest (Figuur 37). De verschillen tussen de gewesten zijn niet significant, ook niet na correctie voor leeftijd en geslacht.

Figuur 37 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met langdurige vermoeidheid in het afgelopen jaar, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018



2.15.2. EVOLUTIE

Het percentage personen met langdurige vermoeidheid daalde tussen 2001 en 2008 van 5,2% naar 4,0%, om in 2013 terug te stijgen tot 5,0%. In 2018 zette deze stijging zich door tot 8,2% in 2018 (Figuur 37). De toename tussen 2013 en 2018 is significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

Regionale verschillen

In het Vlaams Gewest stijgt het percentage personen met langdurige vermoeidheid tussen 2013 en 2018 van 4,3% naar 8,0%. In het Waals Gewest is er een stijging van 4,8% naar 8,7%. In het Brussels Gewest is er echter een daling van 9,0% naar 7,1%. Al deze verschillen zijn significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

2.15.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN

De prevalentie van langdurige vermoeidheid is hoger bij vrouwen (9,8%) dan bij mannen (6,5%) en ook na correctie voor leeftijd is dit verschil sterk significant. De verschillen per leeftijdsgroep vertonen geen duidelijk patroon. Het percentage personen met langdurige vermoeidheid is vooral hoog bij vrouwen in de leeftijdsgroep 45-54 jaar (Figuur 38).

Regionale verschillen

In de drie gewesten komt langdurige vermoeidheid vaker voor bij vrouwen dan bij mannen, maar in het Waals Gewest is dit verschil minder uitgesproken en niet significant.

In het Vlaams en Waals Gewest komt langdurige vermoeidheid het frequentst voor bij vrouwen van 45-54 jaar (Figuur 38). In het Brussels Gewest wordt de hoogste prevalentie van langdurige vermoeidheid geobserveerd bij 75-plussers en wordt langdurige vermoeidheid in deze leeftijdsgroep in dezelfde mate gerapporteerd door mannen en vrouwen.

Figuur 38 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met langdurige vermoeidheid in het afgelopen jaar, volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018



2.15.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN

De prevalentie van langdurige vermoeidheid neemt af naarmate het opleidingsniveau stijgt. Ook na correctie voor leeftijd en geslacht blijft er een opleidingsgradiënt.

Regionale verschillen

De opleidingsgradiënt die gevonden wordt voor België vinden we min of meer terug in de 3 gewesten, maar de verschillen tussen de opleidingscategorieën zijn niet significant.

2.16. Depressie

2.16.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË

7,4% van de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder verklaart in de 12 maanden voorafgaand aan het interview een depressie te hebben gehad. Het betreft meer bepaald een ernstige somberheid of depressie voor een periode van minstens 2 weken.

Regionale verschillen

Het percentage personen met depressie bedraagt 8,4% in het Waals Gewest, 7,7% in het Brussels Gewest en 6,7 % in het Vlaams Gewest (Figuur 39). Enkel het verschil tussen het Waals Gewest en het Vlaams Gewest is significant, en dit blijft zo na correctie voor leeftijd en geslacht.

Figuur 39 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met depressie in het afgelopen jaar, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018



2.16.2. EVOLUTIE

Het percentage personen met depressie bleef tussen 1997 en 2008 vrij constant (percentages variërend tussen 5,9% en 6,5%), maar nam tussen 2008 en 2018 toe van 6,0% naar 7,4%. Het betreft een kleine maar significante stijging, die ook significant is na correctie voor leeftijd en geslacht.

Regionale verschillen

De stijging tussen 2008 en 2018 wordt zowel geobserveerd in het Vlaams Gewest als in het Waals Gewest, maar is enkel significant in het Vlaams Gewest. In het Brussels Gewest wordt geen toename van de prevalentie van depressie geobserveerd.

Vergelijking van de trend met gegevens van de ziekteverzekering

In Figuur 40 wordt het percentage personen met depressie tussen 2008 en 2018 vergeleken met het percentage personen dat voor minstens 90 dagen antidepressiva (ATC klasse N06A) kreeg voorgeschreven op basis van gegevens van de Permanente Steekproef van het IMA.

Figuur 40 | Percentage personen met depressie in de Gezondheidsenquête versus percentage personen dat voor minstens 90 dagen antidepressiva kreeg voorgeschreven op basis van gegevens van de Permanente Steekproef, volgens gewest en jaar (2008-2018)



* DDD = Daily Defined Dose

In de drie gewesten komen de trends goed overeen. Het is wel opvallend dat het verschil tussen het percentage personen met depressie in de gezondheidsenquête en het percentage personen dat minstens 90 dagen antidepressiva kreeg voorgeschreven op basis van gegevens van de Permanente Steekproef veel groter is in het Vlaams en Waals Gewest dan in het Brussels Gewest.

2.16.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN

De prevalentie van depressie is hoger bij vrouwen (9,1%) dan bij mannen (8,6%) en ook na correctie voor leeftijd is dit verschil sterk significant. De prevalentie van depressie is het laagst in de leeftijdsgroep 15-24 jaar, waar deze 3,0% bedraagt en neemt geleidelijk toe tot 9,2% bij 45-64 jarigen, waar het cijfer het hoogst is (Figuur 41). Ook bij 75-plussers noteren we een hoog percentage personen die een depressie rapporteren (8,8%).

Regionale verschillen

De verschillen in functie van leeftijd en geslacht zijn vrij gelijkaardig in de drie gewesten. Toch valt op dat depressie bij mannelijke 75-plussers in het Vlaams Gewest vaker voorkomt dan in de andere gewesten.

In het Brussels Gewest komt depressie significant vaker voor bij personen met de Belgische nationaliteit dan bij andere EU-burgeres of personen met een nationaliteit van buiten de EU.

Figuur 41 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met depressie, in het afgelopen jaar, volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018



2.16.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN

De prevalentie van depressie neemt af naarmate het opleidingsniveau stijgt. Ook na correctie voor leeftijd en geslacht blijft er een opleidingsgradiënt. De verschillen zijn groot. Depressie komt dubbel zo vaak voort bij de laagst opgeleiden als bij de hoogst opgeleiden.

Regionale verschillen

De opleidingsgradiënt die gevonden wordt voor België vinden we terug in de 3 gewesten.

2.17. Osteoporose

2.17.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË

3,3% van de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder verklaart in de 12 maanden voorafgaand aan het interview een osteoporose te hebben gehad.

Regionale verschillen

Het percentage personen met osteoporose bedraagt 3,8% in het Vlaams Gewest, 2,8% in het Brussels Gewest en 2,7% in het Vlaams Gewest (Figuur 42). Geen enkel verschil is na correctie voor leeftijd en geslacht significant.

Figuur 42 **Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met osteoporose in het afgelopen jaar, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018**



2.17.2. EVOLUTIE

Het percentage personen met osteoporose nam tussen 1997 en 2008 toe van 2,8% tot 4,7%, maar is sindsdien gedaald. In 2013 bedroeg dit percentage 4,1% en in 2018 3,3% (Figuur 42). De daling tussen 2013 en 2018 is significant, ook na correctie voor leeftijd en geslacht.

Regionale verschillen

De daling van de prevalentie van osteoporose tussen 2013 en 2018 is het meest uitgesproken in het Waals Gewest (van 4,6% naar 2,7%), maar wordt ook teruggevonden in het Brussels Gewest (van 3,6% naar 2,8). In het Vlaams Gewest is er weliswaar een lichte daling tussen 2008 (4,8%) en 2013 (3,9%), maar blijft de prevalentie in 2018 quasi gelijk (3,8%) t.o.v. 2013.

2.17.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN

De prevalentie van osteoporose is veel hoger bij vrouwen (6,5%) dan bij mannen (1,0%).en neemt sterk toe met de leeftijd (Figuur 43).

Regionale verschillen

De verschillen in functie van leeftijd en geslacht zijn dezelfde in de drie gewesten.

In het Brussels Gewest komt osteoporose significant minder vaak voor bij personen met een nationaliteit van buiten de EU dan bij Belgen, ook na correctie voor leeftijd, geslacht en opleiding. Ook personen die in een niet EU-land geboren zijn, rapporteren minder vaak te lijden aan osteoporose dan personen die in België geboren zijn.

Figuur 43 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met osteoporose in het afgelopen jaar, volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018



2.17.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN

De ruwe cijfers suggereren dat osteoporose zou afnemen naarmate het opleidingsniveau stijgt, maar na correctie voor leeftijd en geslacht blijkt dat dit volledig te maken heeft met het feit dat laagopgeleiden in regel ouder zijn. Na correctie voor leeftijd en geslacht worden geen verschillen waargenomen in de prevalentie van osteoporose in functie van het opleidingsniveau.

Regionale verschillen

In geen enkele regio zijn er na correctie voor leeftijd en geslacht verschillen in de prevalentie van osteoporose in functie van het opleidingsniveau.

2.18. Cataract

Cataract is de meest gerapporteerde oogafwijking. Daarbij moet opgemerkt worden dat refractieafwijkingen (zoals bijziendheid en verziendheid) niet aan bod komen in de gezondheidsenquête).

2.18.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË

3,5% van de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder verklaart in de 12 maanden voorafgaand aan het interview cataract te hebben gehad.

Regionale verschillen

Het percentage personen met cataract bedraagt 3,7% in het Vlaams Gewest, 2,4% in het Brussels Gewest en 3,3% in het Vlaams Gewest (Figuur 44). Geen enkel regionaal verschil is na correctie voor leeftijd en geslacht significant.

Figuur 44 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met cataract in het afgelopen jaar, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018



2.18.2. EVOLUTIE

Het percentage personen met cataract nam tussen 1997 en 2018 gestaag toe. In 1997 was dit nog 1,3%. In 2018 is dit percentage gestegen tot 3,5% (Figuur 44). Na correctie voor leeftijd en geslacht verkleinen de verschillen, want cataract is inderdaad een ouderdomsziekte, maar de gradiënt blijft significant.

Regionale verschillen

De evolutie van de prevalentie van cataract is sterk verschillend in de drie regio's. In het Vlaams Gewest is er tussen 1997 en 2018 een geleidelijke toename. In het Brussels gewest is er eerder een afname. In het Waals Gewest blijft de prevalentie vrij stabiel, zeker na correctie voor leeftijd en geslacht.

2.18.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN

De prevalentie van cataract neemt sterk toe met de leeftijd en is hoger bij vrouwen (4,1%) dan bij mannen (2,8%) (Figuur 45). Na correctie voor leeftijd blijkt echter dat cataract in dezelfde mate voorkomt bij mannen als bij vrouwen.

Regionale verschillen

De verschillen in functie van leeftijd en geslacht zijn dezelfde in de drie gewesten.

2.18.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN

De ruwe cijfers suggereren dat cataract zou toenemen naarmate het opleidingsniveau daalt, maar correctie voor leeftijd en geslacht geeft aan dat dit volledig te maken heeft met het feit dat

laagopgeleiden in regel ouder zijn. Na correctie voor leeftijd en geslacht worden geen verschillen waargenomen in de prevalentie van cataract in functie van het opleidingsniveau.

Regionale verschillen

In geen enkele regio zijn er na correctie voor leeftijd en geslacht verschillen in de prevalentie van cataract in functie van het opleidingsniveau.

Figuur 45 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met cataract, in het afgelopen jaar, volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018



2.19. Astma

2.19.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË

5,8% van de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder verklaart in de 12 maanden voorafgaand aan het interview aan astma te hebben geleden.

Regionale verschillen

Het percentage personen met astma bedraagt 4,6% in het Vlaams Gewest, 7,2% in het Brussels Gewest en 7,3% in het Vlaams Gewest (Figuur 46). Het verschil tussen het Vlaams Gewest en de andere twee gewesten is significant, ook na correctie voor leeftijd en geslacht.

2.19.2. EVOLUTIE

Het percentage personen met astma bleef tussen 1997 en 2013 vrij constant (met percentages fluctuerend rond de 4,5%), maar steeg tussen 2013 en 2018 significant van 4,3% naar 5,8% (Figuur 46). Het verschil blijft significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

Regionale verschillen

De toename van de prevalentie van astma tussen 2013 en 2018 wordt geobserveerd in de drie gewesten. Na correctie voor leeftijd en geslacht is deze toename enkel significant in het Vlaams en Waals Gewest.

Figuur 46 |Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met astma in het afgelopen jaar, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018



2.19.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN

De prevalentie van astma is hoger bij vrouwen (6,5%) dan bij mannen (5,0%) en dit verschil is significant na correctie voor leeftijd. Er zijn geen belangrijke verschillen in functie van de leeftijd (Figuur 47).

Regionale verschillen

In de drie gewesten vinden we een hogere prevalentie van astma bij vrouwen dan bij mannen, maar enkel in het Brussels Gewest is dit verschil significant.

In het Brussels Gewest is de prevalentie van astma significant lager bij personen met een niet-Belgische nationaliteit en dit geldt zowel voor EU-burgers als niet-EU burgers.

2.19.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN

De prevalentie van astma vertoont een opleidingsgradiënt: hoe hoger opgeleid, hoe lager de prevalentie.

Regionale verschillen

In het Vlaams Gewest zijn er geen significante verschillen in functie van het opleidingsniveau.

In het Brussels Gewest wordt de hoogste astmaprevalentie vastgesteld bij personen met een opleiding lager secundair. In deze groep is de prevalentie significant hoger dan bij personen met een opleiding hoger onderwijs.

In het Waals Gewest is er een duidelijk en significant verschil tussen de astmaprevalentie van de laagst en hoogst opgeleiden.

Figuur 47 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met astma, in het afgelopen jaar, volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018



3. Multimorbiditeit

In deze indicator worden de volgende zes chronische aandoeningen in rekening gebracht: hartziekte, chronische longziekte, diabetes, kanker, artritis en/of artrose en hypertensie. Multimorbiditeit wordt hier gedefinieerd als het hebben van minstens twee van deze ziekten of aandoeningen.

3.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË

In de bevolking van 15 jaar en ouder geeft 60,5% aan geen enkele van deze ziekten of aandoeningen te hebben, 24,3% heeft er één, 10,6% heeft er twee en 4,6% heeft er drie of meer. Multimorbiditeit, volgens deze definitie, komt voor bij 15,2% van de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder.

Bij 65-plussers zijn deze cijfers respectievelijk 28,4%, 33,7%, 24,9% en 13,0%. Het percentage 65-plussers met multimorbiditeit bedraagt dus 37,9%.

Regionale verschillen

In het Vlaams Gewest gaat het om 15,2% van de bevolking, in het Brussels Gewest is dit percentage 10,9% en in het Waals Gewest 16,6% (Figuur 48). Het verschil in de prevalentie van multimorbiditeit tussen het Brussels Gewest en de andere twee gewesten is ook na correctie voor leeftijd en geslacht significant.

Figuur 48 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met multimorbiditeit volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018



3.2. EVOLUTIE

Het percentage personen met multimorbiditeit steeg tussen 1997 en 2018 van 8,9% naar 15,2% (Figuur 48). Deze toename kan voor een groot stuk kan verklaard worden door de vergrijzing van de bevolking, want na correctie voor leeftijd en geslacht is de toename minder groot, maar ze blijft wel significant.

Regionale verschillen

De trend die wordt geobserveerd voor België wordt teruggevonden in het Vlaams en Waals Gewest. Zo nam het percentage personen met multimorbiditeit in het Vlaams Gewest toe van 7,5% in 1997 naar 15,2% in 2018 en in het Waals Gewest van 11.0% in 1997 tot 16,6% in 2018. In het Brussels Gewest bleef deze prevalentie stabiel en tussen 2013 en 2018 was er zelfs een daling, hoewel niet significant.

3.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN

Het percentage personen met multimorbiditeit is significant hoger bij vrouwen (16,6%) dan bij mannen (13,7%), maar dit verschil is niet langer significant na correctie voor leeftijd (Figuur 49). De prevalentie van multimorbiditeit stijgt zeer sterk met de leeftijd: van 0,8% in de leeftijdsgroep 15-24 jaar tot 41,8% bij 75-plussers. In de groep van 65-plussers bedraagt het percentage personen met multimorbiditeit 36,4% bij mannen en 39,1% bij vrouwen.

Regionale verschillen

De leeftijdsgradiënt vertoont geen verschillen naargelang het gewest. In het Brussels Gewest komt multimorbiditeit veel vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. In het Vlaams en het Waal Gewest worden er na correctie voor leeftijd geen significante verschillen vastgesteld in de prevalentie van multimorbiditeit volgens het geslacht.

Figuur 49 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met multimorbiditeit, volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018



3.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN

Het percentage personen met multimorbiditeit is het hoogst bij personen zonder diploma of enkel een diploma lager onderwijs (31,1%). Naargelang het opleidingsniveau stijgt, daalt dit percentage tot 10,1% bij de hoogst opgeleiden. Wanneer we corrigeren voor leeftijd en geslacht, verkleinen de verschillen, maar het verschil tussen de hoogst en laagst opgeleiden blijft sterk significant.

Regionale verschillen

Ook in de drie gewesten apart vinden we deze socio-economische verschillen terug.

BESPREKING EN CONCLUSIE

Informatie over de prevalentie van chronische ziekten op het niveau van de bevolking is een essentieel onderdeel van een gezondheidsinformatiesysteem. Voor de planning van de zorg is het belangrijk om de grootteorde van dit probleem zo correct mogelijk in te schatten. De budgettaire implicaties van chronische ziekten zijn immers enorm. De factuur van de vier belangrijkste chronische aandoeningen in de EU loopt op tot bijna € 500 miljard of ongeveer 35% van de totale uitgaven aan gezondheidszorg (12). Naast deze directe medische kost is er een hoge indirecte niet-medische kost – voornamelijk als gevolg van verliezen in productie en productiviteit – van € 321 miljard in 2015 (2,2 % van het Europese BBP). Naast andere bronnen blijft een gezondheidsenquête een belangrijke bron voor het leveren van prevalentiegegevens over chronische ziekten en aandoeningen in de algemene bevolking.

In dit hoofdstuk worden over chronische ziekten gerapporteerd vanuit 3 perspectieven

1. Eén indicator is gebaseerd op een globale vraag over chronische zieken. Hierbij bepaalt de respondent zelf wat hij/zij onder een chronische of langdurige ziekte verstaat. Dit omvat een subjectief element, maar dit is net een meerwaarde. Inderdaad, voor het beleid is het ook belangrijk om informatie te verzamelen over chronisch ziek zijn vanuit het standpunt van de patiënt.

2. Daarnaast wordt gepeild naar het voorkomen van specifieke chronische ziekten. Niettegenstaande de informatie is gebaseerd op zelfrapportering, is er een algemene consensus dat interviewmethodes voldoende betrouwbaar, en vooral efficiënt en praktisch zijn om deze informatie te verzamelen (13). Voor verschillende ziekten en aandoeningen zijn er trouwens geen andere gegevensbronnen die toelaten om representatieve prevalentiecijfers op het niveau van de totale bevolking te produceren. De keuze van de ziekten en aandoeningen die aan bod komen in de Belgische gezondheidsenquête is in de eerste plaatst gebaseerd op de lijst van ziekten waarover België in het kader van de Europese Gezondheidsenquête (EHIS) informatie moet doorgeven aan Eurostat. Voor andere ziekten en aandoeningen geldt dat ze in voldoende mate in de algemene bevolking moeten voorkomen en omwille van hun ernst en/of frequentie een belangrijke impact hebben op de ziektelast van de bevolking.

3. Doordat tegelijkertijd informatie wordt ingewonnen over een heel aantal ziekten, is de Gezondheidsenquête een uitstekend instrument om informatie te verschaffen over multimorbiditeit.

In essentie probeert de module over chronische ziekten in de Gezondheidsenquête een antwoord te geven op een aantal vragen die we hier één voor één bespreken.

Welke zijn de frequentste ziekten en aandoeningen in de algemene bevolking?

Doordat in de gezondheidsenquête tegelijkertijd wordt gevraagd naar een heleboel aandoeningen is het mogelijk om een rangorde te maken van de meest voorkomende aandoeningen. Daarbij moeten wel enige kanttekeningen worden gemaakt. Uiteraard is de lijst van aandoeningen niet exhaustief. Om na te gaan of geen frequente ziekten worden gemist, is in de gezondheidsenquête een open vraag voorzien, zodat respondenten ziekten kunnen vermelden die niet in de lijst staan. Op basis van de analyse van de antwoorden op deze vraag zijn er tot nu toe geen argumenten om nog bijkomende ziekten of aandoeningen toe te voegen. Een ander probleem bij het opstellen van dergelijke rangorde is dat sommige ziekten of aandoeningen in de lijst veel specifieker zijn dan andere. Diabetes is bijvoorbeeld een heel welomschreven aandoening, terwijl lage rugproblemen verschillende pathologische ziektebeelden omvat. Een laatste probleem is dat de validiteit van de informatie verschillend kan zijn per ziektebeeld, zodat verschillen in prevalentie niet enkel het gevolg zijn van de

mate waarin een ziekte of aandoening in de bevolking voorkomt, maar ook te maken heeft met kennis over de ziekte en eventuele terughoudendheid van de respondent om aan te geven dat hij of zij aan de ziekte lijdt.

Niettegenstaande deze beperkingen biedt de Gezondheidsenquête toch een vrij goed beeld van de belangrijkste ziekten en aandoeningen die in de bevolking voorkomen. De top tien die we hier krijgen is heel verschillend van de top tien van de doodsoorzaken, waarin hart- en vaatziekten en kanker bovenaan staan (14). In de Gezondheidsenquête staan aandoeningen van het bewegingsstelsel, zoals lage rugproblemen en artrose, bovenaan de lijst. Dit zijn aandoeningen waaraan men niet overlijdt, maar die wel een belangrijke impact hebben op het functioneren en de levenskwaliteit. Hetzelfde geldt ook voor allergie, dat zowel bij mannen als vrouwen van 15 jaar en ouder tot de top vijf behoort. Hoewel we bovenaan de lijst geen hart- en vaatziekten vinden, vervolledigen twee belangrijke risicofactoren hiervoor – hoge bloeddruk en een hoog cholesterolgehalte in het bloed – de top vijf.

Samengevat zijn de meest voorkomende gezondheidsproblemen waarmee de bevolking te maken heeft dus 1) lage rugproblemen en artrose 2) hoge bloeddruk en hoog cholesterolgehalte in het bloed 3) allergie. Vooral de eerste twee problemen zijn vanuit het perspectief van de volksgezondheid belangrijk. Lage rugproblemen hebben bijvoorbeeld niet alleen een impact op de levenskwaliteit, maar zijn ook een belangrijke oorzaak van werkverlet. Hoge bloedruk en een hoog cholesterolgehalte verlopen zeker in de aanvangsfase vaak asymptomatisch, en men kan er dan ook van uitgaan dat de werkelijke prevalentie nog een stuk hoger is dan de zelfgerapporteerde prevalentie. Bij een deel van de respondenten van de gezondheidsenquête 2018 werd ook een gezondheidsonderzoek uitgevoerd, met onder meer een bloeddrukmeting en een cholesterolbepaling in het bloed. De resultaten hiervan, die in een apart rapport zullen verschijnen, zullen toelaten om nog beter in te schatten welke percentage van de bevolking een risico loopt.

Hoe evolueert het aantal mensen met een of meerdere chronische aandoeningen in de tijd?

Een gezondheidsenquête is een nuttig instrument om de prevalentie van chronische ziekten en aandoeningen over tijd te meten. Omdat de Belgische Gezondheidsenquête al sinds 1997 georganiseerd wordt, en in 2018 zijn zesde editie kende, is het mogelijk om een goed inzicht te krijgen over de evolutie van de prevalentie van heel wat chronische ziekten in de 2 laatste decennia.

Om de validiteit hiervan te beoordelen werd gebruik gemaakt van de Permanente Steekproef (11). De Permanente Steekproef (EPS) volgt voor een groep personen alle terugbetaalde gezondheidsuitgaven, inclusief uitgaven voor terugbetaalde geneesmiddelen, en dit over de jaren heen. Deze groep wordt samengesteld op basis van een willekeurige trekking van ongeveer 1 op 40 van leden van de ziekenfondsen. Voor 6 ziekten die opgenomen zijn in de lijst van de Gezondheidsenquête en waarvoor min of meer specifieke terugbetaalde geneesmiddelen bestaan, werd de prevalentie van de ziekten sinds 2008 vergeleken met het aantal personen dat een bepaalde hoeveelheid van het overeenkomstig geneesmiddel gebruikte. Het betreft hoge bloeddruk, een hoog cholesterolgehalte in het bloed, diabetes, schildklierlijden, allergie en depressie. Globaal genomen blijkt dat de trend van de prevalentie van die ziekte op basis van de Gezondheidsenquête vrij behoorlijk overeenstemt met de trend van het aantal personen dat een specifiek geneesmiddel voor die ziekte of aandoening gebruikte op basis van de EPS-gegevens.

Uit de resultaten van de gezondheidsenquête blijkt dat de chronische ziekten en aandoeningen die het frequentst voorkomen, blijven toenemen. Het percentage van de bevolking met hoge bloeddruk, lage rugproblemen, nekproblemen, artrose, diabetes, schildklierlijden is sinds de eerste gezondheidsenquête nog nooit zo hoog geweest, en hoewel deze toename voor een stuk te maken heeft met de vergrijzing van de bevolking, verklaart dit niet het volledig plaatje. Ook aandoeningen die ook de jongere bevolkingsgroepen treffen, zoals allergie en astma zijn de afgelopen 5 jaar toegenomen. Verder blijkt ook een toenemend aantal mensen te kampen met depressie en langdurige vermoeidheid. De toename van een aantal belangrijke chronische ziekten weerspiegelt zich ook in een belangrijke toename van de multimorbiditeit. Deze is in de afgelopen 20 jaar bijna verdubbeld is.

De bevindingen van de Belgische gezondheidsenquête liggen in lijn met wat in vele landen wordt geobserveerd, onder meer in de grote nationale gezondheidsenquête van de Verenigde Staten, die al langer dan 50 jaar wordt georganiseerd (15). Ook dichter bij huis, in Nederland, komt men zowel op basis van enquêtegegevens als huisartsregistraties tot de vaststelling dat het toenemend aantal chronisch ziekten niet louter kan verklaard worden door de vergrijzing van de bevolking (16).

De oorzaken van het toenemend aantal personen met chronische ziekten zijn ongetwijfeld multifactorieel. Zowel de individuele leefstijl als de fysieke en sociale omgeving spelen een rol. Op basis van een dwarsdoorsnede onderzoek zoals de gezondheidsenquête is het echter niet mogelijk om eenduidige oorzakelijke verbanden te leggen die deze trend kunnen verklaren.

Welke socio-demografische en regionale verschillen worden vastgesteld?

Bij vrouwen vinden we voor heel wat chronische aandoeningen hogere prevalenties dan bij mannen. Dit is o.m. het geval voor artrose, artritis, lage rugpijn, nekpijn, schildklierlijden, incontinentie, cataract, allergie, migraine, astma, depressie, langdurige vermoeidheid en osteoporose. Voor slechts enkele aandoeningen (hoog cholesterolgehalte in het bloed, coronair hartlijden, andere zware hartpathologie) vinden we een hogere prevalentie bij mannen. De hogere prevalentie van chronische aandoeningen bij vrouwen wordt bevestigd in de literatuur. Mogelijke oorzaken die hiervoor worden gesuggereerd zijn onder meer een verhoogd biologisch risico, een verhoogd verworven risico, een rapporteringsvertekening en een verschillend zorggebruik (17).

Dat chronische ziekten vaker voorkomen bij laagopgeleiden dan bij hoogopgeleiden werd al vastgesteld in de allereerste gezondheidsenquête en komt overeen met literatuurgegevens hieromtrent (18). Ook in deze enquête kunnen we enkel vaststellen dat deze ongelijkheden blijven bestaan en dit geldt zowel voor zelfgerapporteerde chronische morbiditeit in het algemeen, heel wat chronische aandoeningen en multimorbiditeit.

Hoewel er enkele verschillen zijn in chronische morbiditeit tussen het Vlaams en Waals Gewest is de grootteorde van het probleem in beide gewesten vrij gelijk. In het Waals Gewest vinden we een hogere prevalentie van diabetes, schildklierlijden, depressie en astma. In het Vlaams Gewest noteren we een hogere prevalentie van personen met lage rugpijn, nekproblemen en ernstige hoofdpijn zoals migraine. Multimorbiditeit komt in beide gewesten in ongeveer dezelfde mate voor.

In het Brussels Gewest vinden we voor verscheidene chronische ziekten een lagere prevalentie dan in Vlaanderen en Wallonië en dat geldt ook voor multimorbiditeit. Bovendien lijkt de evolutie van sommige ziekten, maar ook van zelfgerapporteerde chronische morbiditeit en multimorbiditeit tussen 2013 en 2018 in Brussel gunstiger te zijn dan in de andere gewesten. Dit heeft misschien te maken met het feit dat Brussel een groot aantal inwoners met een nationaliteit of geboorteland van buiten de EU. Voor verschillende chronische ziekten stellen we bij deze inwoners een lagere prevalentie vast dan bij personen met de Belgische nationaliteit. Of dit te maken heeft met een werkelijk lager voorkomen van de aandoeningen of met een minder vaak rapporteren van de aandoening, kan op basis van de resultaten niet geconcludeerd worden.

Aanbevelingen

De resultaten van de Gezondheidsenquête tonen aan dat het aantal mensen met een chronische aandoening en multimorbiditeit in België onmiskenbaar blijft toenemen. Dit heeft implicaties voor de gezondheidszorg. Ook de komende jaren zullen voldoende budgettaire middelen moeten vrijgemaakt worden om het toenemend aantal chronische patiënten de nodige zorg te geven. Door de toenemende multimorbiditeit zal ook de organisatie van de zorg moeten geheroriënteerd worden.

Minstens even belangrijk is dat het preventief gezondheidsbeleid verder inzet op de aanpak van belangrijke determinanten van chronische ziekten zoals roken, slechte voedingsgewoonten, alcoholgebruik, onvoldoende lichaamsbeweging. Daarbij mag de psychosociale context niet vergeten worden. De resultaten van de Gezondheidsenquête tonen aan dat het aantal mensen met depressie en langdurige vermoeidheid toeneemt in België. Ook hier moet het beleid zeker oog voor hebben.

De aanwezigheid van socio-economische ongelijkheden in de prevalentie van chronische ziekten en aandoeningen blijft een pijnpunt. Vanuit het idee dat gezondheid een universeel mensenrecht is, blijft het opzetten en evalueren van programma's die deze socio-economische ongelijkheden aanpakken een prioriteit.

In dit hoofdstuk noteren we tenslotte, zoals dit trouwens ook het geval is in een aantal andere hoofdstukken van dit rapport, enkele opmerkelijke resultaten voor het Brussels Gewest, waar de evolutie iets gunstiger lijkt te zijn dan in de andere gewesten. Het is nodig om verder te onderzoeken hoe dit kan verklaard worden.

SAMENVATTENDE TABELLEN

Tabel 2 | Evolutie van chronische ziekten en aandoeningen in België, 1997-2018

	1997	2001	2004	2008	2013	2018
Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met …						
een langdurige ziekte of aandoening (volgens persoon zelf)		25,1	25,7	28,1	28,6	29,3
multimorbiditeit	8,9	11,4	11,5		13,5	15,2

Tabel 3 | Evolutie van chronische ziekten en aandoeningen in het Vlaams Gewest, 1997-2018

	1997	2001	2004	2008	2013	2018
Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met …						
een langdurige ziekte of aandoening (volgens persoon zelf)		20,6	22,1	25,7	26,3	27,6
multimorbiditeit	7,5	10,6	10,6		13,6	15,2

Tabel 4 | Evolutie van chronische ziekten en aandoeningen in het Brussels Gewest, 1997-2018

	1997	2001	2004	2008	2013	2018
Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met …						
een langdurige ziekte of aandoening (volgens persoon zelf)		28,7	30,6	31,7	32,3	28,7
multimorbiditeit	10,0	11,1	11,0		12,4	10,9

Tabel 5 | Evolutie van chronische ziekten en aandoeningen in het Waals Gewest, 1997-2018

	1997	2001	2004	2008	2013	2018
Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met …						
een langdurige ziekte of aandoening (volgens persoon zelf)		32,5	31,0	32,1	32,3	32,7
multimorbiditeit	11,0	13,0	13,3		13,6	16,6

Tabel 6 | Prevalentie van chronische ziekten en aandoeningen (% volgens dalende grootteorde in de Gezondheidsenquête 2018) – mannen 15 jaar en ouder - België

	1997 (n =4139)	2001 (n =4928)	2004 (n =5164)	2008 (n =4417)	2013 (n =4343)	2018 (n = 4674)
Lage rugprobleem	-	-	-	17,8	18,7	23,2
Hoog cholesterolgehalte in bloed	-	-	-	-	16,3	18,9
Hoge bloeddruk	9,5	12,5	13,4	13,7	15,6	17,2
Allergie	10,4	12,3	11,2	10,9	12,7	17,0
Artrose	9,6	10,4	9,7	10,5	11,8	14,3
Nekprobleem	-	-	-	7,8	9,1	10,6
Ernstige hoofdpijn zoals migraine	7,0	6,2	5,6	4,7	5,1	6,9
Langdurige vermoeidheid	-	3,5	3,4	2,4	3,6	6,5
Diabetes	2,5	3,2	4,1	4,1	5,4	6,1
Artritis	4,4	5,3	5,3	4,8	6,5	5,9
Depressie	4,7	4,8	4,6	4,3	4,9	5,4
Astma	-	4,9	4,2	3,4	4,4	5,0
Prostaatklachten	-	4,2	4,4	3,8	4,3	4,9
Hartkwaal (geen infarct/coronair lijden)	-	-	-	-	2,8	3,8
Chronische bronchitis of emfyseem	-	6,0	5,8	3,9	3,5	3,7
Urinaire incontinentie	-	-	-	2,2	2,9	3,6
Ernstige of chronische huidaandoening	3,2	3,1	3,8	2,6	2,6	3,3
Darmziekte, langer dan 3 maanden	2,7	2,6	2,9	2,0	2,2	3,2
Maagzweer	3,0	3,5	2,9	3,7	2,5	3,0
Cataract	0,8	1,2	1,5	1,9	2,1	2,8
Schildklierlijden	1,0	1,6	1,4	1,6	1,8	2,8
Vernauwing bloedvaten in buik of benen	-	-	-	-	2,0	2,2
Kanker	0,7	1,3	0,7	2,0	1,4	2,1
Coronaire hartziekte	-	-	-	2,6	1,7	1,6
Nierstenen	1,1	0,9	1,2	1,0	1,2	1,2
Glaucoom	1,2	1,8	2,1	1,2	0,7	1,2
Beroerte (of de gevolgen daarvan)	0,6	0,7	0,7	1,0	1,1	1,1
Hartinfarct (of de gevolgen daarvan)	-	-	-	1,0	1,3	1,0
Chronische blaasontsteking	0,8	1,0	1,2	0,6	1,1	1,0
Epilepsie	0,5	0,8	0,9	0,4	1,0	1,0
Osteoporose	0,9	1,5	1,0	1,5	1,4	0,8
Leverlijden	0,8	0,8	0,9	0,6	0,7	0,8
Ernstige nierziekte behalve nierstenen	0,7	0,5	0,5	0,6	1,0	0,7
Galstenen of galblaasontsteking	0,3	0,6	0,6	0,4	0,5	0,6
Ziekte van Parkinson	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5
Gebroken heup	0,2	0,4	0,3	0,3	0,5	0,4
Maculadegeneratie	-	-	-	-	0,5	0,4
Diabetische retinopathie	-	-	-	-	0,2	< 0,1

Tabel | 7 **Prevalentie van chronische ziekten en aandoeningen (% volgens dalende grootteorde in de Gezondheidsenquête 2018) – vrouwen 15 jaar en ouder – België**

	1997 (n =4421)	2001 (n =5228)	2004 (n =6056)	2008 (n =5234)	2013 (n =4770)	2018 (n = 5079)
Lage rugprobleem	-	-	-	23,0	22,7	26,4
Artrose	14,5	18,2	15,4	20,9	21,2	22,7
Allergie	15,0	15,4	15,5	15,5	15,6	20,3
Nekprobleem	-	-	-	14,9	14,3	18,9
Hoge bloeddruk	12,4	15,5	16,4	17,7	17,3	17,9
Hoog cholesterolgehalte in bloed	-	-	-	-	17,3	17,1
Ernstige hoofdpijn zoals migraine	15,8	15,3	12,8	14,2	13,2	13,4
Schildklierlijden	5,3	6,5	7,0	7,1	9,6	11,0
Langdurige vermoeidheid	-	6,7	6,3	5,4	6,2	9,8
Artritis	8,7	10,2	8,8	9,7	9,6	9,5
Depressie	8,2	7,7	7,1	7,7	8,3	9,1
Astma	-	4,5	4,4	4,9	4,2	6,5
Urinaire incontinentie	-	-	-	4,9	5,4	6,4
Darmziekte, langer dan 3 maanden	4,4	4,3	3,4	4,1	3,3	6,1
Osteoporose	4,8	7,0	6,7	7,8	6,7	5,7
Diabetes	3,0	3,5	4,2	4,3	5,2	5,6
Chronische bronchitis of emfyseem	-	6,1	5,8	4,1	4,4	4,6
Ernstige of chronische huidaandoening	3,9	4,0	3,6	3,1	3,1	4,5
Cataract	1,8	2,8	3,1	3,7	3,9	4,1
Maagzweer	3,1	4,2	3,6	3,9	2,9	4,1
Chronische blaasontsteking	3,0	2,8	3,0	2,1	2,3	3,2
Hartkwaal (geen infarct/coronair lijden)	-	-	-	-	1,7	3,0
Kanker	1,6	2,0	1,6	2,1	2,5	2,8
Vernauwing bloedvaten in buik of benen	-	-	-	-	2,7	2,0
Glaucoom	1,5	2,6	2,5	2,3	1,2	1,4
Galstenen of galblaasontsteking	1,3	1,3	1,4	0,9	1,0	1,4
Ernstige nierziekte behalve nierstenen	0,9	0,8	0,8	0,8	0,9	1,3
Leverlijden	1,0	1,1	0,7	0,5	0,6	1,2
Coronaire hartziekte	-	-	-	1,7	1,2	1,1
Epilepsie	0,7	0,5	0,7	1,0	0,8	0,8
Nierstenen	0,9	0,9	1,0	0,4	0,4	0,7
Gebroken heup	0,3	0,6	0,6	0,5	0,7	0,6
Maculadegeneratie	-	-	-	-	0,6	0,6
Hartinfarct (of de gevolgen daarvan)	-	-	-	0,6	0,8	0,5
Beroerte (of de gevolgen daarvan)	1,1	0,6	0,8	1,2	0,9	0,4
Ziekte van Parkinson	0,5	0,4	0,4	0,4	0,6	0,4
Diabetische retinopathie	-	-	-	-	0,1	0,2

Tabel 8 | Prevalentie van chronische ziekten en aandoeningen (% volgens dalende grootteorde in de Gezondheidsenquête 2018) – mannen 65 jaar en ouder - België

	1997 (n =756)	2001 (n =938)	2004 (n =1404)	2008 (n =1057)	2013 (n =891)	2018 (n = 1092)
Hoog cholesterolgehalte in bloed	-	-	-	-	31,9	38,1
Hoge bloeddruk	21,0	27,3	30,7	33,8	35,2	35,3
Artrose	21,4	27,7	23,5	27,3	28,4	32,4
Lage rugprobleem	-	-	-	24,1	27,5	29,4
Prostaatklachten	13,6	17,3	16,7	14,9	16,8	18,7
Diabetes	9,2	10,6	10,7	11,1	14,6	16,4
Urinaire incontinentie	-	-	-	8,8	10,9	13,5
Nekprobleem	-	-	-	13,5	16,2	12,9
Allergie	6,8	6,8	8,6	8,8	10,2	11,9
Hartkwaal (geen infarct/coronair lijden)	-	-	-	-	8,1	11,5
Cataract	5,5	5,8	6,2	8,3	8,5	11,4
Artritis	13,0	11,8	11,8	13,0	15,4	10,9
Chronische bronchitis of emfyseem	-	15,2	14,3	11,2	8,4	7,7
Langdurige vermoeidheid	-	6,1	4,4	2,8	4,6	7,0
Kanker	3,0	5,3	2,6	6,7	4,6	7,0
Coronaire hartziekte	-	-	-	7,6	6,0	5,8
Darmziekte, langer dan 3 maanden	4,2	3,8	4,8	4,1	5,8	5,7
Vernauwing bloedvaten in buik of benen	-	-	-	-	7,1	5,5
Schildklierlijden	1,8	3,7	3,3	3,3	3,0	5,4
Depressie	4,4	6,5	3,6	5,1	5,0	4,6
Ernstige of chronische huidaandoening	4,2	3,5	3,6	4,5	4,8	4,3
Astma	-	8,6	6,5	5,7	4,9	4,1
Beroerte (of de gevolgen daarvan)	2,0	3,1	2,3	3,0	3,2	3,4
Chronische blaasontsteking	3,6	3,3	3,1	2,0	3,9	3,3
Hartinfarct (of de gevolgen daarvan)	-	-	-	2,7	3,8	3,3
Ernstige hoofdpijn zoals migraine	5,3	4,4	3,1	2,6	4,5	3,0
Glaucoom	3,7	4,2	5,6	4,2	1,7	2,8
Ziekte van Parkinson	1,3	1,4	1,2	1,3	1,9	2,5
Osteoporose	3,1	4,1	2,5	5,5	4,3	2,4
Ernstige nierziekte behalve nierstenen	2,7	0,9	1,1	1,3	2,8	2,2
Maagzweer	5,9	5,9	3,8	5,5	4,8	2,1
Gebroken heup	1,2	1,5	0,8	0,8	2,2	1,9
Nierstenen	2,5	1,4	1,5	2,0	1,9	1,8
Epilepsie	2,2	1,1	0,6	0,1	1,6	1,6
Galstenen of galblaasontsteking	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5
Leverlijden	3,0	1,2	1,0	0,5	1,1	1,5
Maculadegeneratie	-	-	-	-	1,8	1,4
Diabetische retinopathie	-	-	-	-	0,8	0,1

Tabel 9 | Prevalentie van chronische ziekten en aandoeningen (% volgens dalende grootteorde in de Gezondheidsenquête 2018) – vrouwen 65 jaar en ouder – België

	1997 (n =1006)	2001 (n =1199)	2004 (n =2111)	2008 (n =1802)	2013 (n =1135)	2018 (n =1291)
Artrose	38,8	47,3	39,9	50,4	49,8	47,9
Hoge bloeddruk	32,0	37,5	36,4	38,8	38,0	39,3
Hoog cholesterolgehalte in bloed	-	-	-	-	38,2	36,3
Lage rugprobleem	-	-	-	36,4	34,2	36,2
Nekprobleem	-	-	-	21,8	20,0	23,8
Artritis	22,2	25,1	22,3	25,6	21,1	19,7
Allergie	9,1	13,1	13,9	11,1	10,4	18,9
Schildklierlijden	6,2	11,6	10,9	10,4	13,2	17,5
Osteoporose	15,5	20,8	19,2	22,6	19,5	15,4
Urinaire incontinentie	-	-	-	14,0	15,7	14,6
Cataract	10,4	11,5	12,2	13,2	13,4	13,6
Diabetes	6,5	9,2	10,6	10,5	12,4	11,9
Langdurige vermoeidheid	-	9,8	9,2	6,5	6,0	10,0
Depressie	11,3	8,4	8,0	8,0	11,1	9,2
Chronische bronchitis of emfyseem	-	9,7	9,6	7,0	7,7	8,5
Darmziekte, langer dan 3 maanden	5,9	9,0	5,6	6,8	6,2	8,5
Hartkwaal (geen infarct/coronair lijden)	-	-	-	-	4,9	7,2
Astma	-	6,3	6,2	5,5	3,2	6,9
Ernstige hoofdpijn zoals migraine	9,5	9,4	8,6	10,2	11,6	6,5
Ernstige of chronische huidaandoening	3,8	4,0	4,3	2,4	3,7	5,4
Vernauwing bloedvaten in buik of benen	-	-	-	-	7,4	5,3
Chronische blaasontsteking	4,4	4,5	5,4	3,6	3,9	5,3
Kanker	5,4	4,0	2,3	5,3	5,3	4,7
Maagzweer	4,7	7,4	5,5	5,9	5,0	4,3
Glaucoom	3,2	7,5	6,6	7,2	3,7	3,7
Galstenen of galblaasontsteking	3,1	3,5	3,1	1,8	1,3	2,6
Coronaire hartziekte	-	-	-	5,9	4,3	2,3
Gebroken heup	1,6	2,5	2,1	1,8	2,3	2,3
Leverlijden	0,9	2,4	2,2	0,9	0,6	2,0
Maculadegeneratie	-	-	-	-	2,4	1,9
Ernstige nierziekte behalve nierstenen	2,1	1,9	1,1	1,0	1,7	1,8
Ziekte van Parkinson	2,4	1,4	1,5	1,7	2,3	1,6
Hartinfarct (of de gevolgen daarvan)	-	-	-	2,0	2,4	1,4
Beroerte (of de gevolgen daarvan)	5,9	1,6	2,3	3,1	2,0	1,0
Nierstenen	1,4	1,5	1,2	0,8	0,6	0,7
Epilepsie	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,6
Diabetische retinopathie	-	-	-	-	0,2	0,2

Tabel 10 | Prevalentie van chronische ziekten en aandoeningen (% volgens dalende grootteorde in de Gezondheidsenquête 2018) – mannen 15 jaar en ouder – Vlaams Gewest

	1997 (n =1471)	2001 (n =1746)	2004 (n =1879)	2008 (n =1613)	2013 (n =1444)	2018 (n = 1769)
Lage rugprobleem	-	-	-	18,1	20,8	26,1
Hoog cholesterolgehalte in bloed	-	-	-	-	16,6	20,2
Hoge bloeddruk	9,3	12,1	13,4	13,1	15,9	18,3
Allergie	9,3	12,0	10,6	10,9	13,1	18,1
Artrose	11,1	10,7	10,0	10,1	12,5	14,6
Nekprobleem	-	-	-	7,6	9,9	12,0
Artritis	3,9	4,9	5,7	4,4	7,2	7,4
Ernstige hoofdpijn zoals migraine	4,8	4,7	3,3	4,4	4,4	7,0
Diabetes	2,1	2,6	3,4	3,9	4,6	6,3
Langdurige vermoeidheid	-	2,5	2,1	2,0	2,6	6,2
Depressie	4,0	4,3	3,3	3,3	4,1	5,3
Prostaatklachten	-	4,0	4,6	3,8	4,5	5,2
Hartkwaal (geen infarct/coronair lijden)	-	-	-	-	3,0	4,3
Astma	-	3,8	3,0	2,3	3,5	4,1
Urinaire incontinentie	-	-	-	2,3	3,2	4,1
Darmziekte, langer dan 3 maanden	2,5	2,5	2,5	1,9	1,8	3,9
Chronische bronchitis of emfyseem	-	4,5	4,5	3,1	2,8	3,8
Ernstige of chronische huidaandoening	3,2	3,0	3,6	3,0	2,6	3,7
Cataract	0,5	0,9	1,1	1,8	2,3	3,2
Vernauwing bloedvaten in buik of benen	-	-	-	-	2,0	2,5
Kanker	0,3	1,0	0,6	2,3	1,4	2,3
Maagzweer	1,7	2,3	1,3	2,4	1,3	1,9
Coronaire hartziekte	-	-	-	2,3	1,3	1,7
Schildklierlijden	0,8	1,2	0,7	0,9	1,1	1,5
Glaucoom	1,0	1,6	2,2	1,2	0,7	1,4
Chronische blaasontsteking	0,5	1,0	0,8	0,5	0,8	1,2
Nierstenen	1,1	1,0	1,3	1,0	1,2	1,1
Osteoporose	0,5	1,5	0,9	1,6	1,2	1,0
Beroerte (of de gevolgen daarvan)	0,6	0,6	0,7	0,6	1,1	1,0
Hartinfarct (of de gevolgen daarvan)	-	-	-	0,6	1,0	0,9
Leverlijden	0,3	0,5	0,4	0,5	0,8	0,8
Epilepsie	0,5	0,9	0,9	0,2	1,1	0,7
Galstenen of galblaasontsteking	0,1	0,4	0,3	0,6	0,5	0,7
Ziekte van Parkinson	0,2	0,5	0,3	0,6	0,5	0,7
Ernstige nierziekte behalve nierstenen	0,5	0,4	0,5	0,7	1,1	0,6
Gebroken heup	0,0	0,3	0,2	0,1	0,7	0,3
Maculadegeneratie	-	-	-	-	0,2	0,3
Diabetische retinopathie	-	-	-	-	0,2	< 0,1

Tabel 11 | Prevalentie van chronische ziekten en aandoeningen (% volgens dalende grootteorde in de Gezondheidsenquête 2018) – vrouwen 15 jaar en ouder – Vlaams Gewest

	1997 (n =1515)	2001 (n =1752)	2004 (n =2087)	2008 (n =1798)	2013 (n =1547)	2018 (n = 1870)
Lage rugprobleem	-	-	-	24,9	25,2	28,6
Artrose	15,4	18,3	15,2	19,8	21,1	22,2
Allergie	14,6	14,5	14,4	15,9	16,6	20,8
Nekprobleem	-	-	-	15,0	14,4	19,9
Hoog cholesterolgehalte in bloed	-	-	-	-	18,3	17,7
Hoge bloeddruk	10,3	15,8	16,2	17,7	18,6	17,6
Ernstige hoofdpijn zoals migraine	12,0	12,3	10,4	14,7	14,0	15,9
Artritis	6,3	9,6	7,7	9,5	10,6	11,6
Langdurige vermoeidheid	-	4,7	5,0	4,9	5,8	9,9
Depressie	6,3	5,5	6,2	6,7	7,6	8,1
Schildklierlijden	4,2	4,3	4,3	5,7	6,9	7,8
Urinaire incontinentie	-	-	-	5,4	6,2	7,1
Darmziekte, langer dan 3 maanden	3,8	3,8	2,9	3,8	3,7	6,9
Osteoporose	4,0	5,8	5,6	7,7	6,5	6,5
Astma	-	3,5	3,2	3,6	3,1	5,0
Diabetes	2,2	2,6	3,8	3,8	5,4	4,7
Ernstige of chronische huidaandoening	3,2	3,7	3,1	2,9	3,3	4,7
Cataract	0,7	2,1	2,2	3,6	4,2	4,3
Hartkwaal (geen infarct/coronair lijden)	-	-	-	-	2,0	3,7
Chronische bronchitis of emfyseem	-	4,8	4,7	3,6	3,8	3,5
Chronische blaasontsteking	2,7	2,7	2,3	1,9	2,3	3,5
Kanker	1,8	1,8	1,7	1,9	2,5	2,9
Vernauwing bloedvaten in buik of benen	-	-	-	-	3,4	2,3
Galstenen of galblaasontsteking	1,3	1,5	1,3	0,8	1,0	1,9
Maagzweer	1,9	2,7	1,9	1,9	1,4	1,7
Leverlijden	1,0	1,0	0,6	0,3	0,6	1,4
Glaucoom	1,3	1,9	2,2	2,2	1,2	1,2
Coronaire hartziekte	-	-	-	1,8	1,3	0,9
Epilepsie	0,8	0,5	0,5	1,1	0,9	0,8
Ernstige nierziekte behalve nierstenen	0,9	0,6	0,9	0,7	1,1	0,7
Gebroken heup	0,1	0,4	0,5	0,4	0,6	0,6
Nierstenen	1,0	1,1	1,1	0,4	0,5	0,5
Maculadegeneratie	-	-	-	-	0,4	0,5
Ziekte van Parkinson	0,4	0,4	0,4	0,5	0,7	0,4
Hartinfarct (of de gevolgen daarvan)	-	-	-	0,6	0,8	0,3
Beroerte (of de gevolgen daarvan)	0,6	0,3	0,5	0,9	0,6	0,1
Diabetische retinopathie	-	-	-	-	0,1	0,1

Tabel 12 | Prevalentie van chronische ziekten en aandoeningen (% volgens dalende grootteorde in de Gezondheidsenquête 2018) – mannen 65 jaar en ouder – Vlaams Gewest

	1997 (n =247)	2001 (n =332)	2004 (n =534)	2008 (n =438)	2013 (n =336)	2018 (n=467)
Hoog cholesterolgehalte in bloed	-	-	-	-	31,6	40,7
Hoge bloeddruk	20,6	28,0	31,0	32,5	35,8	36,2
Lage rugprobleem	-	-	-	21,8	29,0	33,1
Artrose	22,8	28,5	22,7	26,8	29,1	30,2
Prostaatklachten	11,5	17,9	16,1	13,3	15,7	18,2
Diabetes	8,9	9,8	8,9	11,3	12,7	16,2
Urinaire incontinentie	-	-	-	8,8	10,1	15,6
Allergie	4,6	5,8	6,4	8,8	9,5	13,3
Artritis	10,8	11,2	9,9	12,7	16,3	13,2
Hartkwaal (geen infarct/coronair lijden)	-	-	-	-	8,1	12,5
Nekprobleem	-	-	-	13,2	17,5	11,9
Cataract	4,5	4,4	3,5	7,9	8,4	11,2
Langdurige vermoeidheid	-	5,6	2,8	1,4	3,4	8,1
Kanker	1,6	4,4	2,5	7,2	4,3	7,6
Darmziekte, langer dan 3 maanden	3,2	4,1	4,5	3,6	4,2	7,1
Chronische bronchitis of emfyseem	-	12,3	12,3	9,7	8,4	6,8
Depressie	1,8	7,5	3,2	6,2	3,9	6,4
Vernauwing bloedvaten in buik of benen	-	-	-	-	6,7	6,1
Coronaire hartziekte	-	-	-	6,6	4,4	5,8
Ernstige of chronische huidaandoening	5,0	2,8	2,9	5,6	5,1	4,8
Chronische blaasontsteking	1,8	3,9	2,2	1,1	2,5	3,8
Astma	-	7,3	5,9	4,9	4,7	3,6
Beroerte (of de gevolgen daarvan)	2,2	2,9	2,6	2,5	2,5	3,6
Hartinfarct (of de gevolgen daarvan)	-	-	-	1,6	2,2	3,3
Ziekte van Parkinson	2,1	2,0	1,1	1,7	2,1	3,0
Glaucoom	3,7	3,3	6,0	4,7	1,8	3,0
Osteoporose	1,7	5,2	1,9	5,8	3,6	2,9
Schildklierlijden	0,7	2,7	1,5	1,5	2,2	2,5
Ernstige hoofdpijn zoals migraine	2,9	2,9	1,4	2,5	2,8	2,3
Ernstige nierziekte behalve nierstenen	0,6	0,6	0,8	0,8	2,2	2,3
Galstenen of galblaasontsteking	0,7	1,4	0,2	0,9	1,5	1,8
Nierstenen	3,3	1,4	1,7	1,9	0,8	1,7
Epilepsie	3,9	1,6	0,6	0,0	2,0	1,6
Leverlijden	0,6	0,8	0,8	0,6	1,3	1,6
Gebroken heup	0,3	1,4	0,6	0,4	2,9	1,5
Maagzweer	3,5	5,2	1,7	3,9	2,6	1,0
Maculadegeneratie	-	-	-	-	0,8	0,8
Diabetische retinopathie	-	-	-	-	0,7	< 0,1

Tabel 13 | Prevalentie van chronische ziekten en aandoeningen (% volgens dalende grootteorde in de Gezondheidsenquête 2018) – vrouwen 65 jaar en ouder – Vlaams Gewest

	1997 (n =312)	2001 (n =358)	2004 (n =714)	2008 (n =660)	2013 (n =409)	2018 (n=513)
Artrose	39,4	48,5	41,5	49,5	48,7	46,0
Hoog cholesterolgehalte in bloed	-	-	-	-	41,2	38,3
Hoge bloeddruk	25,1	39,1	37,3	38,5	41,0	38,1
Lage rugprobleem	-	-	-	38,2	34,0	35,7
Nekprobleem	-	-	-	20,2	19,0	24,6
Artritis	13,8	25,2	20,3	25,1	22,0	22,1
Allergie	8,4	11,5	13,1	9,4	9,9	18,1
Osteoporose	11,9	17,7	16,8	22,1	18,3	17,3
Urinaire incontinentie	-	-	-	15,6	17,1	14,9
Cataract	4,4	8,8	8,5	12,6	14,0	14,2
Schildklierlijden	5,9	8,9	8,1	8,3	9,0	13,4
Diabetes	4,3	7,4	9,8	10,3	14,2	10,7
Langdurige vermoeidheid	-	8,1	7,1	5,1	5,7	9,9
Darmziekte, langer dan 3 maanden	5,0	8,6	5,3	5,9	6,1	9,7
Hartkwaal (geen infarct/coronair lijden)	-	-	-	-	5,6	8,9
Depressie	10,0	5,1	7,6	6,5	11,4	8,6
Chronische bronchitis of emfyseem	-	7,5	8,6	7,1	8,0	6,6
Chronische blaasontsteking	2,8	3,7	5,1	3,4	3,6	6,6
Ernstige hoofdpijn zoals migraine	4,2	7,2	6,0	10,3	12,5	6,5
Vernauwing bloedvaten in buik of benen	-	-	-	-	9,9	6,1
Ernstige of chronische huidaandoening	2,3	4,3	4,7	2,3	3,2	5,7
Astma	-	5,2	5,3	6,0	2,1	5,2
Kanker	6,9	4,1	2,6	5,6	5,3	4,5
Galstenen of galblaasontsteking	3,8	4,2	3,4	2,2	1,5	3,3
Glaucoom	2,5	6,6	6,4	7,1	3,4	3,0
Leverlijden	0,8	2,6	2,3	0,8	0,6	2,8
Maagzweer	2,7	5,5	3,4	2,4	1,8	1,8
Gebroken heup	0,5	1,4	1,5	1,3	1,7	1,8
Coronaire hartziekte	-	-	-	5,7	4,7	1,5
Ziekte van Parkinson	2,4	1,2	1,3	1,9	2,8	1,5
Maculadegeneratie	-	-	-	-	1,5	1,4
Ernstige nierziekte behalve nierstenen	2,8	1,6	1,5	1,0	2,2	1,3
Hartinfarct (of de gevolgen daarvan)	-	-	-	2,1	2,3	0,7
Nierstenen	1,7	1,7	1,3	0,9	0,9	0,7
Epilepsie	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,5
Beroerte (of de gevolgen daarvan)	4,4	0,7	1,4	2,1	1,3	0,2
Diabetische retinopathie	-	-	-	-	0,3	< 0,1

Tabel 14 | Prevalentie van chronische ziekten en aandoeningen (% volgens dalende grootteorde in de Gezondheidsenquête 2018) – mannen 15 jaar en ouder – Brussels Gewest

	1997 (n =1236)	2001 (n =1166)	2004 (n =1334)	2008 (n =1275)	2013 (n =1177)	2018 (n = 1169)
Lage rugprobleem	-	-	-	15,4	17,9	15,4
Allergie	13,9	15,9	13,9	11,4	14,4	14,2
Hoog cholesterolgehalte in bloed	-	-	-	-	16,8	13,4
Hoge bloeddruk	9,6	11,6	10,8	11,8	14,1	11,6
Artrose	7,6	8,6	6,5	7,3	7,5	7,8
Nekprobleem	-	-	-	7,3	9,6	6,4
Ernstige hoofdpijn zoals migraine	11,0	10,5	9,9	5,7	7,7	6,4
Depressie	5,9	6,1	6,6	5,7	6,8	6,4
Langdurige vermoeidheid	-	5,3	5,8	4,2	7,6	5,6
Diabetes	3,1	2,8	3,7	5,4	6,1	5,6
Astma	-	7,1	5,1	5,2	5,8	5,5
Prostaatklachten	-	4,4	4,4	3,7	4,2	4,2
Artritis	5,4	4,7	4,8	4,6	4,7	3,6
Maagzweer	6,0	3,8	6,1	6,0	3,7	3,4
Chronische bronchitis of emfyseem	-	7,1	6,5	5,0	3,0	3,2
Urinaire incontinentie	-	-	-	1,8	3,0	2,8
Ernstige of chronische huidaandoening	3,7	4,4	4,3	1,9	3,1	2,5
Darmziekte, langer dan 3 maanden	4,4	2,2	3,2	2,9	3,7	2,0
Hartkwaal (geen infarct/coronair lijden)	-	-	-	-	2,4	2,0
Cataract	3,0	3,2	2,5	2,6	2,2	2,0
Schildklierlijden	1,0	1,6	1,5	1,5	1,8	1,9
Coronaire hartziekte	-	-	-	3,0	1,8	1,5
Epilepsie	0,7	0,8	1,3	0,6	0,9	1,3
Vernauwing bloedvaten in buik of benen	-	-	-	-	3,4	1,2
Kanker	1,9	1,5	1,5	1,2	1,6	1,2
Leverlijden	3,1	1,4	1,9	0,5	0,8	1,1
Chronische blaasontsteking	1,6	1,1	1,5	1,1	1,3	0,9
Nierstenen	1,0	0,8	1,1	1,1	1,1	0,9
Hartinfarct (of de gevolgen daarvan)	-	-	-	2,2	0,9	0,9
Ernstige nierziekte behalve nierstenen	2,4	0,5	0,5	0,9	1,5	0,8
Osteoporose	1,6	1,5	1,3	1,4	0,6	0,8
Glaucoom	2,2	1,9	2,4	1,8	0,5	0,8
Beroerte (of de gevolgen daarvan)	1,2	0,8	0,8	2,1	0,3	0,5
Ziekte van Parkinson	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,5
Maculadegeneratie	-	-	-	-	0,5	0,4
Gebroken heup	0,8	0,7	0,4	0,1	0,4	0,2
Galstenen of galblaasontsteking	1,1	0,6	0,5	0,2	0,2	0,2
Diabetische retinopathie	-	-	-	-	0,4	0,1

Tabel 15 | Prevalentie van chronische ziekten en aandoeningen (% volgens dalende grootteorde in de Gezondheidsenquête 2018) – vrouwen 15 jaar en ouder – Brussels Gewest

	1997 (n =1332)	2001 (n =1331)	2004 (n =1651)	2008 (n =1556)	2013 (n =1355)	2018 (n=1344)
Allergie	18,2	20,3	20,7	16,9	18,4	21,4
Lage rugprobleem	-	-	-	21,8	22,1	19,6
Artrose	13,4	17,0	13,7	18,4	18,4	16,6
Hoge bloeddruk	13,7	14,9	14,7	15,0	17,3	14,7
Nekprobleem	-	-	-	14,6	16,1	13,7
Hoog cholesterolgehalte in bloed	-	-	-	-	15,8	13,0
Ernstige hoofdpijn zoals migraine	18,3	21,8	14,8	12,8	13,0	12,5
Schildklierlijden	4,9	6,9	7,0	6,8	10,3	11,8
Depressie	10,4	11,4	8,4	8,8	8,4	9,0
Astma	-	5,8	6,6	6,7	5,6	8,7
Langdurige vermoeidheid	-	10,5	8,4	8,8	10,2	8,5
Diabetes	3,4	3,8	5,1	5,6	5,7	6,2
Artritis	9,5	11,6	10,4	9,3	7,0	5,1
Osteoporose	7,1	9,1	7,8	7,1	6,3	4,7
Maagzweer	4,0	6,0	5,9	6,7	4,0	4,4
Chronische bronchitis of emfyseem	-	8,0	5,9	4,7	4,0	4,2
Urinaire incontinentie	-	-	-	4,5	5,2	4,1
Ernstige of chronische huidaandoening	3,7	4,7	4,7	3,7	3,6	4,1
Darmziekte, langer dan 3 maanden	6,5	5,4	4,4	4,5	3,0	3,6
Chronische blaasontsteking	2,3	2,4	3,6	2,4	2,3	3,0
Cataract	5,2	4,4	4,5	3,7	3,8	2,8
Glaucoom	1,4	2,9	2,7	2,6	1,3	1,9
Kanker	1,4	2,7	1,7	2,6	2,9	1,5
Hartkwaal (geen infarct/coronair lijden)	-	-	-	-	1,8	1,3
Vernauwing bloedvaten in buik of benen	-	-	-	-	1,7	1,3
Ernstige nierziekte behalve nierstenen	0,9	0,7	0,6	0,7	0,9	1,3
Galstenen of galblaasontsteking	1,2	1,4	0,8	0,8	0,7	1,2
Leverlijden	1,6	1,3	1,1	0,8	1,0	1,1
Maculadegeneratie	-	-	-	-	1,0	1,0
Coronaire hartziekte	-	-	-	2,0	0,6	0,7
Epilepsie	0,2	0,8	0,9	0,9	0,6	0,6
Gebroken heup	0,6	1,0	0,6	1,3	0,4	0,5
Nierstenen	1,4	0,6	1,1	0,8	0,9	0,4
Beroerte (of de gevolgen daarvan)	1,4	0,7	0,8	1,8	0,9	0,3
Hartinfarct (of de gevolgen daarvan)	-	-	-	0,7	0,4	0,3
Ziekte van Parkinson	0,3	0,7	0,5	0,4	0,3	0,2
Diabetische nefropathie	-	-	-	-	0,3	0,1

Tabel 16 | Prevalentie van chronische ziekten en aandoeningen (% volgens dalende grootteorde in de Gezondheidsenquête 2018) – mannen 65 jaar en ouder – Brussels Gewest

	1997 (n =246)	2001 (n =216)	2004 (n =375)	2008 (n =252)	2013 (n =172)	2018 (n = 213)
Hoge bloeddruk	24,6	33,9	33,2	35,3	39,6	33,5
Hoog cholesterolgehalte in bloed	-	-	-	-	39,4	31,7
Artrose	17,5	26,4	24,8	29,6	26,1	25,5
Lage rugprobleem	-	-	-	26,6	26,7	24,0
Prostaatklachten	8,6	18,5	19,1	19,6	21,8	20,3
Diabetes	8,3	8,3	12,7	16,0	22,9	18,9
Cataract	16,2	15,7	12,2	16,5	10,5	11,7
Artritis	15,3	15,6	12,9	13,4	17,4	10,0
Urinaire incontinentie	-	-	-	9,9	16,2	9,2
Allergie	9,5	10,1	11,4	12,8	12,6	8,7
Coronaire hartziekte	-	-	-	15,3	6,1	8,7
Hartkwaal (geen infarct/coronair lijden)	-	-	-	-	9,6	8,2
Langdurige vermoeidheid	-	7,6	8,1	9,6	11,7	7,5
Nekprobleem	-	-	-	12,5	17,5	7,0
Schildklierlijden	1,5	4,0	2,3	3,2	2,4	6,7
Astma	-	9,7	6,2	9,1	9,7	6,3
Hartinfarct (of de gevolgen daarvan)	-	-	-	9,9	2,5	6,2
Chronische bronchitis of emfyseem	-	15,6	13,5	14,5	8,5	6,0
Ernstige of chronische huidaandoening	4,7	5,3	7,5	2,2	6,6	5,4
Vernauwing bloedvaten in buik of benen	-	-	-	-	13,4	5,2
Ernstige nierziekte behalve nierstenen	14,5	1,2	2,0	4,7	4,5	4,0
Ziekte van Parkinson	1,4	1,7	1,7	2,0	2,0	3,9
Osteoporose	2,3	5,3	2,9	6,6	2,4	3,7
Darmziekte, langer dan 3 maanden	6,4	1,0	6,7	8,5	7,2	3,5
Maagzweer	10,0	8,7	9,6	9,3	7,1	3,4
Depressie	6,0	9,2	6,3	7,0	5,2	3,4
Glaucoom	8,9	5,1	7,5	8,3	1,9	3,2
Beroerte (of de gevolgen daarvan)	4,2	4,0	3,3	7,4	2,1	3,1
Nierstenen	2,3	3,7	1,8	5,6	3,1	2,3
Epilepsie	0,6	1,3	0,0	0,0	0,7	2,2
Leverlijden	15,4	1,2	2,1	2,0	0,9	2,1
Kanker	10,2	5,6	4,3	3,2	9,2	2,0
Maculadegeneratie	-	-	-	-	1,8	1,9
Chronische blaasontsteking	5,3	4,5	3,9	4,9	5,5	1,5
Ernstige hoofdpijn zoals migraine	7,8	7,7	6,5	2,9	9,6	1,4
Gebroken heup	4,1	3,2	1,7	0,6	1,1	1,1
Galstenen of galblaasontsteking	3,3	1,8	1,9	1,1	0,8	0,6
Diabetische retinopathie	-	-	-	-	1,7	0,4

Tabel 17 | Prevalentie van chronische ziekten en aandoeningen (% volgens dalende grootteorde in de Gezondheidsenquête 2018) – vrouwen 65 jaar en ouder – Brussels Gewest

	1997 (n =319)	2001 (n =333)	2004 (n =593)	2008 (n =490)	2013 (n =255)	2018 (n = 290)
Artrose	33,3	44,5	36,2	47,1	51,4	49,6
Hoge bloeddruk	28,2	29,5	34,5	36,0	41,0	37,1
Hoog cholesterolgehalte in bloed	-	-	-	-	38,8	34,0
Lage rugprobleem	-	-	-	31,8	39,5	31,9
Schildklierlijden	8,0	8,0	12,3	12,2	17,3	24,1
Allergie	12,8	18,6	15,3	12,3	17,2	23,9
Nekprobleem	-	-	-	22,8	25,9	16,8
Diabetes	7,8	9,0	10,6	13,1	14,2	16,6
Osteoporose	22,6	27,3	23,4	23,1	19,4	14,1
Urinaire incontinentie	-	-	-	14,7	21,7	14,0
Artritis	23,5	27,8	27,2	20,3	18,0	13,5
Astma	-	8,8	6,3	6,9	6,6	12,5
Cataract	21,7	16,9	18,0	13,6	15,6	12,1
Langdurige vermoeidheid	-	14,0	11,8	11,7	12,1	11,1
Depressie	9,3	15,1	9,0	10,4	10,2	10,9
Ernstige of chronische huidaandoening	5,1	6,4	3,4	1,1	4,3	7,5
Glaucoom	3,8	6,9	8,0	7,0	3,0	7,5
Chronische bronchitis of emfyseem	-	15,2	10,6	7,2	7,9	7,3
Maagzweer	5,4	9,9	7,5	9,5	6,2	7,0
Darmziekte, langer dan 3 maanden	9,9	8,9	7,4	8,7	6,9	6,8
Ernstige hoofdpijn zoals migraine	18,8	12,4	9,2	9,7	11,1	5,4
Maculadegeneratie	-	-	-	-	3,7	4,9
Hartkwaal (geen infarct/coronair lijden)	-	-	-	-	5,3	4,3
Vernauwing bloedvaten in buik of benen	-	-	-	-	4,1	4,1
Chronische blaasontsteking	2,6	4,9	4,7	4,0	5,1	3,6
Kanker	2,4	3,4	2,7	5,2	5,3	3,1
Ernstige nierziekte behalve nierstenen	1,3	1,2	0,7	0,6	1,8	3,0
Coronaire hartziekte	-	-	-	6,7	2,3	2,7
Gebroken heup	2,3	3,9	1,5	4,4	1,8	2,0
Hartinfarct (of de gevolgen daarvan)	-	-	-	3,2	1,0	1,7
Beroerte (of de gevolgen daarvan)	6,2	2,5	2,3	6,7	2,4	1,2
Galstenen of galblaasontsteking	3,0	2,7	2,5	1,4	2,5	1,1
Leverlijden	1,4	2,0	2,0	1,1	1,4	0,7
Ziekte van Parkinson	1,3	2,2	2,2	1,8	1,2	0,7
Epilepsie	0,3	1,9	0,8	1,3	0,8	0,6
Diabetische retinopathie	-	-	-	-	0,9	0,4
Nierstenen	1,1	1,5	1,2	0,2	0,7	0,4

Tabel 18 | Prevalentie van chronische ziekten en aandoeningen (% volgens dalende grootteorde in de Gezondheidsenquête 2018) – mannen 15 jaar en ouder – Waals Gewest

	1997 (n =1432)	2001 (n =2016)	2004 (n =1951)	2008 (n =1529)	2013 (n =1722)	2018 (n = 1736)
Lage rugprobleem	-	-	-	17,9	15,3	20,8
Hoog cholesterolgehalte in bloed	-	-	-	-	15,5	18,5
Hoge bloeddruk	9,8	13,6	14,4	15,4	15,8	17,2
Allergie	11,3	11,8	11,4	10,5	11,4	16,2
Artrose	7,6	10,4	10,3	12,3	12,0	15,8
Nekprobleem	-	-	-	8,5	7,4	9,7
Langdurige vermoeidheid	-	5,1	5,0	2,8	4,0	7,3
Ernstige hoofdpijn zoals migraine	10,0	7,6	8,5	4,9	5,6	6,8
Astma	-	6,3	6,3	5,0	5,5	6,2
Diabetes	2,9	4,7	5,5	4,0	6,7	6,1
Depressie	5,7	5,4	6,5	5,6	5,5	5,7
Schildklierlijden	1,4	2,4	2,8	3,0	3,1	5,3
Maagzweer	4,3	5,5	5,1	5,4	4,3	4,8
Prostaatklachten	-	4,6	4,1	3,9	3,9	4,7
Artritis	5,0	6,1	4,7	5,5	5,9	4,1
Chronische bronchitis of emfyseem	-	8,4	8,0	5,1	4,8	3,8
Hartkwaal (geen infarct/coronair lijden)	-	-	-	-	2,6	3,4
Urinaire incontinentie	-	-	-	2,2	2,4	2,9
Ernstige of chronische huidaandoening	3,2	2,8	3,9	2,3	2,5	2,8
Cataract	0,5	1,2	2,1	1,7	1,6	2,4
Darmziekte, langer dan 3 maanden	2,5	3,0	3,6	1,8	2,5	2,3
Vernauwing bloedvaten in buik of benen	-	-	-	-	1,6	2,1
Kanker	1,1	1,7	0,7	1,6	1,2	2,0
Epilepsie	0,5	0,8	0,9	0,8	1,0	1,4
Coronaire hartziekte	-	-	-	3,0	2,4	1,3
Beroerte (of de gevolgen daarvan)	0,4	0,9	0,7	1,3	1,4	1,3
Nierstenen	1,0	0,8	1,1	0,9	1,2	1,3
Hartinfarct (of de gevolgen daarvan)	-	-	-	1,1	2,0	1,0
Glaucoom	1,1	2,2	1,9	1,1	0,8	1,0
Chronische blaasontsteking	1,2	1,1	2,0	0,8	1,5	0,7
Leverlijden	0,9	1,0	1,6	0,8	0,4	0,7
Gebroken heup	0,4	0,5	0,2	0,7	0,3	0,7
Ernstige nierziekte behalve nierstenen	0,6	0,7	0,5	0,4	0,8	0,6
Galstenen of galblaasontsteking	0,3	0,8	1,2	0,2	0,5	0,6
Osteoporose	1,2	1,5	0,9	1,2	2,1	0,5
Maculadegeneratie	-	-	-	-	1,0	0,5
Ziekte van Parkinson	0,1	0,1	0,3	0,1	0,2	0,3
Diabetische retinopathie	-	-	-	-	0,1	0,1

Tabel 19 | Prevalentie van chronische ziekten en aandoeningen (% volgens dalende grootteorde in de Gezondheidsenquête 2018) – vrouwen 15 jaar en ouder – Waals Gewest

	1997 (n =1574)	2001 (n =2145)	2004 (n =2318)	2008 (n =1880)	2013 (n =1868)	2018 (n = 1865)
Artrose	13,2	18,5	16,1	23,8	22,3	25,4
Lage rugprobleem	-	-	-	20,0	18,6	24,8
Hoge bloeddruk	15,8	15,3	17,4	18,3	15,0	19,5
Allergie	14,7	15,4	15,8	14,4	12,8	19,0
Nekprobleem	-	-	-	14,6	13,5	18,7
Hoog cholesterolgehalte in bloed	-	-	-	-	16,0	17,5
Schildklierlijden	7,3	10,3	11,6	9,8	14,0	16,2
Ernstige hoofdpijn zoals migraine	21,8	18,7	16,5	13,7	12,0	10,9
Depressie	10,8	10,4	8,3	9,1	9,6	10,9
Langdurige vermoeidheid	-	9,2	7,8	5,2	5,6	10,1
Astma	-	6,0	5,9	6,7	5,8	8,4
Maagzweer	4,8	6,3	5,7	6,6	5,3	8,4
Artritis	12,9	10,9	10,2	10,2	8,7	7,4
Diabetes	4,2	4,9	4,7	4,8	4,8	7,0
Chronische bronchitis of emfyseem	-	7,9	7,8	5,0	5,7	6,6
Urinaire incontinentie	-	-	-	4,2	4,2	6,0
Darmziekte, langer dan 3 maanden	4,6	4,9	4,1	4,5	2,9	5,6
Osteoporose	5,3	8,5	8,5	8,2	7,0	4,8
Ernstige of chronische huidaandoening	5,1	4,2	4,0	3,7	2,6	4,3
Cataract	2,7	3,6	4,2	3,8	3,4	4,2
Kanker	1,4	2,2	1,2	2,3	2,4	2,9
Chronische blaasontsteking	3,7	3,6	4,0	2,2	2,5	2,8
Hartkwaal (geen infarct/coronair lijden)	-	-	-	-	1,3	2,4
Ernstige nierziekte behalve nierstenen	0,9	1,2	0,7	1,2	0,6	2,2
Vernauwing bloedvaten in buik of benen	-	-	-	-	1,8	1,8
Glaucoom	2,1	3,8	2,9	2,4	1,3	1,5
Coronaire hartziekte	-	-	-	1,6	1,3	1,4
Nierstenen	0,6	0,8	0,9	0,4	0,1	1,1
Hartinfarct (of de gevolgen daarvan)	-	-	-	0,5	0,9	1,0
Galstenen of galblaasontsteking	1,2	1,0	1,8	1,0	0,9	1,0
Beroerte (of de gevolgen daarvan)	1,8	1,1	1,2	1,5	1,4	0,9
Gebroken heup	0,5	0,9	0,8	0,5	0,9	0,8
Epilepsie	0,9	0,5	0,9	0,8	0,7	0,8
Leverlijden	0,8	1,1	0,8	0,6	0,4	0,8
Maculadegeneratie	-	-	-	-	0,9	0,6
Ziekte van Parkinson	0,6	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5
Diabetische retinopathie	-	-	-	-	0,1	0,5

Tabel 20 | Prevalentie van chronische ziekten en aandoeningen (% volgens dalende grootteorde in de Gezondheidsenquête 2018) – mannen 65 jaar en ouder – Waals Gewest

	1997 (n =263)	2001 (n =390)	2004 (n =495)	2008 (n =367)	2013 (n =383)	2018 (n=412)
Artrose	20,7	26,4	24,6	27,7	27,5	38,3
Hoog cholesterolgehalte in bloed	-	-	-	-	30,5	34,3
Hoge bloeddruk	20,4	23,9	29,3	36,2	32,7	34,0
Lage rugprobleem	-	-	-	28,2	24,7	23,4
Prostaatklachten	18,8	15,9	17,1	17,2	17,8	19,4
Nekprobleem	-	-	-	14,5	13,2	16,4
Diabetes	10,1	12,9	13,9	9,3	16,5	16,1
Cataract	3,0	5,5	1,0	6,9	8,2	11,6
Urinaire incontinentie	-	-	-	8,4	11,1	10,4
Hartkwaal (geen infarct/coronair lijden)	-	-	-	-	7,7	10,3
Allergie	9,2	7,6	12,7	7,6	10,9	9,8
Chronische bronchitis of emfyseem	-	20,6	18,7	13,6	8,3	9,8
Schildklierlijden	3,8	5,4	7,6	7,5	4,8	7,7
Kanker	2,6	6,9	2,3	6,7	4,0	6,9
Artritis	15,6	12,0	15,6	13,6	13,1	6,5
Coronaire hartziekte	-	-	-	7,6	9,4	5,1
Ernstige hoofdpijn zoals migraine	8,0	6,2	5,5	2,5	6,9	4,7
Langdurige vermoeidheid	-	6,7	6,8	3,8	5,4	4,6
Astma	-	10,8	7,9	6,6	4,1	4,5
Vernauwing bloedvaten in buik of benen	-	-	-	-	6,1	4,4
Maagzweer	8,2	6,5	6,6	8,2	8,8	4,1
Darmziekte, langer dan 3 maanden	4,8	4,1	4,8	3,7	8,9	3,2
Beroerte (of de gevolgen daarvan)	4,2	4,0	3,3	7,4	2,1	3,1
Ernstige of chronische huidaandoening	2,8	4,5	4,0	2,9	3,7	3,0
Gebroken heup	1,5	1,1	0,9	1,9	1,1	2,9
Chronische blaasontsteking	5,7	1,9	4,8	3,2	6,5	2,8
Hartinfarct (of de gevolgen daarvan)	-	-	-	3,0	7,4	2,7
Maculadegeneratie	-	-	-	-	3,8	2,6
Glaucoom	1,7	5,8	4,2	1,8	1,4	2,4
Nierstenen	1,5	0,8	1,2	1,0	3,9	1,9
Ernstige nierziekte behalve nierstenen	1,4	1,2	1,4	1,5	3,7	1,5
Depressie	7,8	3,8	3,5	2,3	7,4	1,4
Ziekte van Parkinson	0,0	0,3	1,1	0,3	1,3	1,4
Epilepsie	0,0	0,2	0,7	0,2	1,0	1,4
Galstenen of galblaasontsteking	2,0	2,2	2,1	0,1	2,3	1,2
Leverlijden	2,1	2,0	1,0	0,0	0,8	1,0
Osteoporose	5,6	1,8	3,6	4,6	6,1	0,9
Diabetische nefropathie	-	-	-	-	0,6	0,3

Tabel 21 | Prevalentie van chronische ziekten en aandoeningen (% volgens dalende grootteorde in de Gezondheidsenquête 2018) – vrouwen 65 jaar en ouder – Waals Gewest

	1997 (n =375)	2001 (n =508)	2004 (n =804)	2008 (n =652)	2013 (n =471)	2018 (n = 488)
Artrose	40,2	46,1	38,1	53,1	51,6	51,0
Hoge bloeddruk	43,7	37,5	35,5	40,2	31,5	42,0
Lage rugprobleem	-	-	-	34,3	33,3	38,1
Hoog cholesterolgehalte in bloed	-	-	-	-	32,4	33,4
Nekprobleem	-	-	-	24,8	20,3	23,9
Schildklierlijden	5,9	17,0	15,3	13,9	20,2	23,4
Allergie	8,5	14,0	14,9	14,0	9,8	19,2
Artritis	34,1	24,1	24,3	28,0	20,4	16,8
Urinaire incontinentie	-	-	-	10,8	11,7	14,4
Diabetes	9,2	12,2	11,8	10,1	8,6	13,0
Cataract	14,5	14,3	16,9	14,3	11,8	12,8
Osteoporose	17,8	23,9	22,1	23,5	21,8	12,3
Chronische bronchitis of emfyseem	-	11,7	10,9	6,8	7,1	12,1
Depressie	14,1	11,9	8,4	9,9	10,8	9,9
Langdurige vermoeidheid	-	11,4	12,0	7,8	4,9	9,8
Astma	-	7,5	7,8	4,1	4,4	8,6
Maagzweer	7,5	9,8	8,5	11,6	10,8	8,4
Ernstige hoofdpijn zoals migraine	13,4	12,2	13,1	10,2	10,1	6,8
Darmziekte, langer dan 3 maanden	5,7	9,6	5,6	7,9	6,2	6,7
Kanker	4,5	4,0	1,8	4,9	5,1	5,5
Hartkwaal (geen infarct/coronair lijden)	-	-	-	-	3,6	4,6
Ernstige of chronische huidaandoening	5,4	2,8	3,9	3,1	4,4	4,3
Vernauwing bloedvaten in buik of benen	-	-	-	-	3,5	4,2
Glaucoom	3,9	9,2	6,5	7,3	4,5	4,1
Coronaire hartziekte	-	-	-	6,0	4,2	3,7
Chronische blaasontsteking	7,4	5,6	6,2	3,7	4,1	3,3
Gebroken heup	3,0	3,9	3,1	2,2	3,4	3,2
Hartinfarct (of de gevolgen daarvan)	-	-	-	1,6	2,8	2,7
Ernstige nierziekte behalve nierstenen	1,5	2,7	0,5	1,3	0,8	2,5
Beroerte (of de gevolgen daarvan)	8,1	2,9	4,0	3,8	3,2	2,4
Maculadegeneratie	-	-	-	-	3,7	2,0
Ziekte van Parkinson	2,7	1,4	1,6	1,4	1,7	1,8
Galstenen of galblaasontsteking	2,2	2,5	2,8	1,1	0,5	1,5
Leverlijden	0,9	2,3	2,0	1,2	0,4	1,0
Epilepsie	0,8	0,6	0,5	0,5	0,9	0,7
Nierstenen	1,2	1,2	0,9	0,8	0,0	0,6
Diabetische nefropathie					0,0	0,4

REFERENTIES

(1) World Health Organization. Noncommunicable Disease Fact Sheet. Report 2018 June 1 [cited 2019 May 27];Available from: URL: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases
(2) Verbrugge LM, Patrick DL. Seven chronic conditions: Their impact on US adults' activity levels and use of medical services. Am J Public Health 1995;85:173-82.
(3) Hoffman C, Rice D, Sung HY. Persons with chronic conditions. Their prevalence and costs. JAMA 1996 Nov 13;276(18):1473-9.
(4) Beckett M, Weinstein M, Goldman N, Yu-Hsuan L. Do health interview surveys yield reliable data on chronic illness among older respondents? Am J Epidemiol 2000 Feb 1;151(3):315-23.
(5) Mootz M, Van den Berg J. [Indicators of health status in the CBS-Health Interview Survey]. Mndber Gezondheid (CBS) 1989;2:4-10.
(6) Fortin M, Stewart M, Poitras ME, Almirall J, Maddocks H. A systematic review of prevalence studies on multimorbidity: toward a more uniform methodology. Ann Fam Med 2012 Mar;10(2):142-51.
(7) Chronic Conditions: Making the Case for Ongoing Care. 2004. Baltimore, Partnership for Solutions, Johns Hopkins University. Online Source
(8) Cazale L, Dumitru V. Les maladies chroniques au Québec : quelques faits marquants. Zoom Santé 2008;(Mars):1-4.
(9) Loza E, Jover JA, Rodriguez L, Carmona L. Multimorbidity: prevalence, effect on quality of life and daily functioning, and variation of this effect when one condition is a rheumatic disease. Semin Arthritis Rheum 2009 Feb;38(4):312-9.
(10) Rapoport J, Jacobs P, Bell NR, Klarenbach S. Refining the measurement of the economic burden of chronic diseases in Canada. Chronic Dis Can 2004;25(1):13-21.
(11) InterMutualistisch Agentschap. De Permanente Steekproef. 2019. 30-5-2019. Online Source
(12) Albrecht J, Vandenberghe Désirée. De kost van chronische aandoeningen; wat is de impact van een sterk preventiebeleid? Itinera Institute; 2018.
(13) Heliovaara M, Aromaa A, Klaukka T, Knekt P, Joukamaa M, Impivaara O. Reliability and Validity of Interview Data on Chronic Diseases - The Mini-Finland Health Survey. J Clin Epidemiol 1993;46:181-91.
(14) Statistics Belgium. België - Sterfgevallen per geslacht en gewest, voor enkele groepen van doodsoorzaken, 2016. 21-1-0019. 30-5-0019. Online Source
(15) Freid VM, Bernstein AB, Bush MA. Multiple chronic conditions among adults aged 45 and over: trends over the past 10 years. NCHS Data Brief 2012 Jul;(100):1-8.
(16) van Oostrom SH, Gijsen R, Stirbu I, Korevaar JC, Schellevis FG, Picavet HS, et al. Time Trends in Prevalence of Chronic Diseases and Multimorbidity Not Only due to Aging: Data from General Practices and Health Surveys. PLoS One 2016;11(8):e0160264.
(17) Macintyre S, Hunt K, Sweeting H. Gender differences in health: are things really as simple as they seem? Soc Sci Med 1996 Feb;42(4):617-24.
(18) Dalstra JA, Kunst AE, Borrell C, Breeze E, Cambois E, Costa G, et al. Socioeconomic differences in the prevalence of common chronic diseases: an overview of eight European countries. Int J Epidemiol 2005 Apr;34(2):316-26.

LIJST VAN TABELLEN

Tabel B 1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een zelfge rapporteerde chronische ziekte of aandoening, België 115

Tabel 2 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met astma in de afgelopen 12 maanden, België 116

Tabel B3 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met chronisch longlijden in de afgelopen 12 maanden, België 117

Tabel B4 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hartinfarct in de afgelopen 12 maanden, België 118

Tabel B5 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met coronaire hartziekte in de afgelopen 12 maanden, België 119

Tabel B6 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ernstige hartziekte (uitgezonderd hartinfarct of coronaire hartziekte) in de afgelopen 12 maanden, België....120

Tabel B7 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoge bloeddruk in de afgelopen 12 maanden, België 121

Tabel B8 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoge bloeddruk dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet te hebben gevolgd, België....122

Tabel B9 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoge bloeddruk dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden geneesmiddelen te hebben genomen, België....123

Tabel B10 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoge bloeddruk volgens de behandeling van de aandoening, België 124

Tabel B11 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed in de afgelopen 12 maanden, België....125

Tabel B12 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet te hebben gevolgd, België 126

Tabel B13 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden geneesmiddelen te hebben genomen, België 127

Tabel B14 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed volgens de behandeling van de aandoening, België 128

Tabel B15 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met beroerte in de afgelopen 12 maanden, België 129

Tabel B16 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met vernauwing van de bloedvaten in de buik of de benen in de afgelopen 12 maanden, België....130

Tabel B17 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met reumatoïde artritis in de afgelopen 12 maanden, België 131

Tabel B18 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met artrose in de afgelopen 12 maanden, België 132

Tabel B19 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een lage rugprobleem in de afgelopen 12 maanden, België 133

Tabel B20 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een nekprobleem in de afgelopen 12 maanden, België 134

Tabel B21 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes in de afgelopen 12 maanden, België 135
Tabel B22 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet volgde, België 136
Tabel B23 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden medicamenteus behandeld werd, België 137
Tabel B24 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden insuline gebruikte, België 138
Tabel B25 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden orale antidiabetica gebruikte, België 139
Tabel B26 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes volgens de behandeling van de aandoening, België 140
Tabel B27 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met allergie in de afgelopen 12 maanden, België 141
Tabel B28 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een maagzweer in de afgelopen 12 maanden, België 142
Tabel B29 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met leverlijden in de afgelopen 12 maanden, België 143
Tabel B30 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met kanker in de afgelopen 12 maanden, België 144
Tabel B31 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ernstige hoofdpijn zoals migraine in de afgelopen 12 maanden, België 145
Tabel B32 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met urinaire incontinentie in de afgelopen 12 maanden, België 146
Tabel B33 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met depressie in de afgelopen 12 maanden, België 147
Tabel B34 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met schildklierlijden in de afgelopen 12 maanden, België 148
Tabel B35 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met cataract in de afgelopen 12 maanden, België 149
Tabel B36 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met glaucoom in de afgelopen 12 maanden, België 150
Tabel B37 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met maculadegeneratie in de afgelopen 12 maanden, België 151
Tabel B38 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetische retinopathie in de afgelopen 12 maanden, België 152
Tabel B39 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ziekte van Parkinson in de afgelopen 12 maanden, België 153
Tabel B40 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met epilepsie in de afgelopen 12 maanden, België 154
Tabel B41 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met langdurige vermoeidheid in de afgelopen 12 maanden, België 155
Tabel B42 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met osteoporose in de afgelopen 12 maanden, België 156
Tabel B43 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met gebroken heup in de afgelopen 12 maanden, België 157

Tabel B44 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met darmziekte, langer dan 3 maanden in de afgelopen 12 maanden, België 158
Tabel B45 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met nierstenen in de afgelopen 12 maanden, België 159
Tabel B46 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ernstige nierziekte behalve nierstenen in de afgelopen 12 maanden, België 160
Tabel B47 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met chronische blaasontsteking in de afgelopen 12 maanden, België 161
Tabel B48 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ernstige of chronische huidaandoening in de afgelopen 12 maanden, België 162
Tabel B49 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met galstenen of galblaasontsteking in de afgelopen 12 maanden, België 163
Tabel B50 Percentage van de mannelijke bevolking van 15 jaar en ouder met prostaatklachten in de afgelopen 12 maanden, België 164
Tabel B51 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met astma in de afgelopen 12 maanden, België 165
Tabel B52 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met chronisch longlijden in de afgelopen 12 maanden, België 166
Tabel B53 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hartinfarct in de afgelopen 12 maanden, België 167
Tabel B54 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met coronaire hartziekte in de afgelopen 12 maanden, België 168
Tabel B55 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ernstige hartziekte (uitgezonderd hartinfarct of coronaire hartziekte) in de afgelopen 12 maanden, België 169
Tabel B56 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoge bloeddruk in de afgelopen 12 maanden, België 170
Tabel B57 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoge bloeddruk dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet te hebben gevolgd, België 171
Tabel B58 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoge bloeddruk dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden geneesmiddelen te hebben genomen, België 172
Tabel B59 Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoge bloeddruk volgens de behandeling van de aandoening, België 173
Tabel B60 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed in de afgelopen 12 maanden, België 174
Tabel B61 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet te hebben gevolgd, België 175
Tabel B62 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden geneesmiddelen te hebben genomen, België 176
Tabel B63 Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed volgens de behandeling van de aandoening, België 177
Tabel B64 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beroerte in de afgelopen 12 maanden, België 178
Tabel B65 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met vernauwing van de bloedvaten in de buik of de benen in de afgelopen 12 maanden, België 179
Tabel B66 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met reumatoïde artritis in de afgelopen 12 maanden, België 180

Tabel B67 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met artrose in de afgelopen 12 maanden, België 181
Tabel B68 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met een lage rugprobleem in de afgelopen 12 maanden, België 182
Tabel B69 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met een nekprobleem in de afgelopen 12 maanden, België 183
Tabel B70 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes in de afgelopen 12 maanden, België 184
Tabel B71 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet volgde, België 185
Tabel B72 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden medicamenteus behandeld werd, België 186
Tabel B73 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden insuline gebruikte, België....187
Tabel B74 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden orale antidiabetica gebruikte, België 188
Tabel B75 Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes volgens de behandeling van de aandoening, België 189
Tabel B76 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met allergie in de afgelopen 12 maanden, België 190
Tabel B77 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met een maagzweer in de afgelopen 12 maanden, België 191
Tabel B78 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met leverlijden in de afgelopen 12 maanden, België 192
Tabel B79 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met kanker in de afgelopen 12 maanden, België 193
Tabel B80 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ernstige hoofdpijn zoals migraine in de afgelopen 12 maanden, België....194
Tabel B81 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met urinaire incontinentie in de afgelopen 12 maanden, België 195
Tabel B82 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met depressie in de afgelopen 12 maanden, België 196
Tabel B83 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met schildklierlijden in de afgelopen 12 maanden, België 197
Tabel B84 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met cataract in de afgelopen 12 maanden, België 198
Tabel B85 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met glaucoom in de afgelopen 12 maanden, België 199
Tabel B86 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetische retinopathie in de afgelopen 12 maanden, België 200
Tabel B87 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met maculadegeneratie in de afgelopen 12 maanden, België 201
Tabel B88 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ziekte van Parkinson in de afgelopen 12 maanden, België 202
Tabel B89 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met epilepsie in de afgelopen 12 maanden, België 203

Tabel B90 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met langdurige vermoeidheid in de afgelopen 12 maanden, België 204
Tabel B91 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met osteoporose in de afgelopen 12 maanden, België 205
Tabel B92 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met gebroken heup in de afgelopen 12 maanden, België 206
Tabel B93 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met darmziekte, langer dan 3 maanden in de afgelopen 12 maanden, België 207
Tabel B94 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met nierstenen in de afgelopen 12 maanden, België 208
Tabel B95 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ernstige nierziekte behalve nierstenen in de afgelopen 12 maanden, België 209
Tabel B96 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met chronische blaasontsteking in de afgelopen 12 maanden, België 210
Tabel B97 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ernstige of chronische huidaandoening in de afgelopen 12 maanden, België 211
Tabel B98 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met galstenen of galblaasontsteking in de afgelopen 12 maanden, België 212
Tabel B99 Percentage van de mannelijke bevolking van 65 jaar en ouder met prostaatklachten in de afgelopen 12 maanden, België 213
Tabel B100 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens aantal aandoeningen waaraan ze lijden °, België 214
Tabel B101 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met multimorbiditeit *, België....215
Tabel B102 Gemiddeld aantal chronische aandoeningen bij personen van 15 jaar en ouder (op een totaal van 25 aandoeningen°), België....216
Tabel B103 Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder volgens aantal aandoeningen waaraan ze lijden °, België 217
Tabel B104 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met multimorbiditeit *, België....218
Tabel B105 Gemiddeld aantal chronische aandoeningen bij personen van 65 jaar en ouder (op een totaal van 25 aandoeningen°), België....219
Tabel B106 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een zelfgerapporteerde chronische ziekte of aandoening, Vlaams Gewest 220
Tabel B107 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met astma in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 221
Tabel B108 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met chronisch longlijden in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest....222
Tabel B109 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hartinfarct in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 223
Tabel B110 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met coronaire hartziekte in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest....224
Tabel B111 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ernstige hartziekte (uitgezonderd hartinfarct of coronaire hartziekte) in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 225
Tabel B112 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoge bloeddruk in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 226
Tabel B113 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoge bloeddruk dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet te hebben gevolgd, Vlaams Gewest 227

Tabel B114 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoge bloeddruk dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden geneesmiddelen te hebben genomen, Vlaams Gewest 228
Tabel B115 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoge bloeddruk volgens de behandeling van de aandoening, Vlaams Gewest 229
Tabel B116 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 230
Tabel B117 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet te hebben gevolgd, Vlaams Gewest 231
Tabel B118 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden geneesmiddelen te hebben genomen, Vlaams Gewest 232
Tabel B119 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed volgens de behandeling van de aandoening, Vlaams Gewest 233
Tabel B120 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met beroerte in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 234
Tabel B121 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met vernauwing van de bloedvaten in de buik of de benen in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 235
Tabel B122 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met reumatoïde artritis in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 236
Tabel B123 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met artrose in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 237
Tabel B124 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een lage rugprobleem in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 238
Tabel B125 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een nekprobleem in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 239
Tabel B126 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 240
Tabel B127 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet volgde, Vlaams Gewest 241
Tabel B128 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden medicamenteus behandeld werd, Vlaams Gewest 242
Tabel B129 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden insuline gebruikte, Vlaams Gewest 243
Tabel B130 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden orale antidiabetica gebruikte, Vlaams Gewest 244
Tabel B131 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes volgens de behandeling van de aandoening, Vlaams Gewest 245
Tabel B132 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met allergie in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 246
Tabel B133 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een maagzweer in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 247
Tabel B134 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met leverlijden in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 248
Tabel B135 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met kanker in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 249

Tabel B136 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ernstige hoofdpijn zoals migraine in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest....250
Tabel B137 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met urinaire incontinentie in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest....251
Tabel B138 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met depressie in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest....252
Tabel B139 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met schildklierlijden in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest....253
Tabel B140 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met cataract in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest....254
Tabel B141 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met glaucoom in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest....255
Tabel B142 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met maculadegeneratie in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest....256
Tabel B143 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetische retinopathie in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest....257
Tabel B144 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ziekte van Parkinson in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest....258
Tabel B145 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met epilepsie in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest....259
Tabel B146 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met langdurige vermoeidheid in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest....260
Tabel B147 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met osteoporose in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest....261
Tabel B148 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met gebroken heup in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest....262
Tabel B149 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met darmziekte, langer dan 3 maanden in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest....263
Tabel B150 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met nierstenen in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest....264
Tabel B151 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ernstige nierziekte behalve nierstenen in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest....265
Tabel B152 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met chronische blaasontsteking in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest....266
Tabel B153 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ernstige of chronische huidaandoening in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest....267
Tabel B154 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met galstenen of galblaasontsteking in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest....268
Tabel B155 Percentage van de mannelijke bevolking van 15 jaar en ouder met prostaatklachten in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest....269
Tabel B156 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met astma in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest....270
Tabel B157 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met chronisch longlijden in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest....271
Tabel B158 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hartinfarct in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest....272

Tabel B159 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met coronaire hartziekte in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest....273
Tabel B160 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ernstige hartziekte (uitgezonderd hartinfarct of coronaire hartziekte) in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest....274
Tabel B161 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoge bloeddruk in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest....275
Tabel B162 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoge bloeddruk dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet te hebben gevolgd, Vlaams Gewest....276
Tabel B163 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoge bloeddruk dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden geneesmiddelen te hebben genomen, Vlaams Gewest....277
Tabel B164 Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoge bloeddruk volgens de behandeling van de aandoening, Vlaams Gewest....278
Tabel B165 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder methoog cholesterolgehalte in het bloed in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest....279
Tabel B166 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet te hebben gevolgd, Vlaams Gewest....280
Tabel B167 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden geneesmiddelen te hebben genomen, Vlaams Gewest....281
Tabel B168 Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed volgens de behandeling van de aandoening, Vlaams Gewest....282
Tabel B169 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beroerte in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest....283
Tabel B170 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met vernauwing van de bloedvaten in de buik of de benen in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest....284
Tabel B171 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met reumatoïde artritis in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest....285
Tabel B172 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met artrose in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest....286
Tabel B173 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met een lage rugprobleem in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest....287
Tabel B174 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met een nekprobleem in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest....288
Tabel B175 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest....289
Tabel B176 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet volgde, Vlaams Gewest....290
Tabel B177 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden medicamenteus behandeld werd, Vlaams Gewest....291
Tabel B178 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden insuline gebruikte, Vlaams Gewest....292
Tabel B179 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden orale antidiabetica gebruikte, Vlaams Gewest....293
Tabel B180 Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes volgens de behandeling van de aandoening, Vlaams Gewest....294

Tabel B181 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met allergie in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 295
Tabel B182 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met een maagzweer in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 296
Tabel B183 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met leverlijden in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 297
Tabel B184 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met kanker in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 298
Tabel B185 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ernstige hoofdpijn zoals migraine in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 299
Tabel B186 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met urinaire incontinentie in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 300
Tabel B187 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met depressie in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 301
Tabel B188 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met schildklierlijden in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 302
Tabel B189 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met cataract in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 303
Tabel B190 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met glaucoom in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 304
Tabel B191 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetische retinopathie in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 305
Tabel B192 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met maculadegeneratie in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 306
Tabel B193 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ziekte van Parkinson in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 307
Tabel B194 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met epilepsie in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 308
Tabel B195 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met langdurige vermoeidheid in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 309
Tabel B196 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met osteoporose in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 310
Tabel B197 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met gebroken heup in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 311
Tabel B198 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met darmziekte, langer dan 3 maanden in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 312
Tabel B199 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met nierstenen in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 313
Tabel B200 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ernstige nierziekte behalve nierstenen in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 314
Tabel B201 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met chronische blaasontsteking in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 315
Tabel B202 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ernstige of chronische huidaandoening in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 316
Tabel B203 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met galstenen of galblaasontsteking in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 317

Tabel B204 Percentage van de mannelijke bevolking van 65 jaar en ouder met prostaatklachten in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest....318
Tabel B205 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens aantal aandoeningen waaraan ze lijden °, Vlaams Gewest....319
Tabel B206 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met multimorbiditeit *, Vlaams Gewest....320
Tabel B207 Gemiddeld aantal chronische aandoeningen bij personen van 15 jaar en ouder (op een totaal van 25 aandoeningen°), Vlaams Gewest....321
Tabel B208 Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder volgens aantal aandoeningen waaraan ze lijden °, Vlaams Gewest....322
Tabel B209 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met multimorbiditeit *, Vlaams Gewest....323
Tabel B210 Gemiddeld aantal chronische aandoeningen bij personen van 65 jaar en ouder (op een totaal van 25 aandoeningen°), Vlaams Gewest....324
Tabel B211 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een zelfgerapporteerde chronische ziekte of aandoening, Brussels Gewest....325
Tabel B212 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met astma in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest....326
Tabel B213 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met chronisch longlijden in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest....327
Tabel B214 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hartinfarct in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest....328
Tabel B215 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met coronaire hartziekte in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest....329
Tabel B216 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ernstige hartziekte (uitgezonderd hartinfarct of coronaire hartziekte) in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest....330
Tabel B217 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoge bloeddruk in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest....331
Tabel B218 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoge bloeddruk dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet te hebben gevolgd, Brussels Gewest....332
Tabel B219 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoge bloeddruk dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden geneesmiddelen te hebben genomen, Brussels Gewest....333
Tabel B220 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoge bloeddruk volgens de behandeling van de aandoening, Brussels Gewest....334
Tabel B221 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest....335
Tabel B222 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet te hebben gevolgd, Brussels Gewest....336
Tabel B223 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden geneesmiddelen te hebben genomen, Brussels Gewest....337
Tabel B224 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed volgens de behandeling van de aandoening, Brussels Gewest....338
Tabel B225 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met beroerte in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest....339
Tabel B226 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met vernauwing van de bloedvaten in de buik of de benen in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest....340

Tabel B227 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met reumatoïde artritis in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 341
Tabel B228 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met artrose in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 342
Tabel B229 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een lage rugprobleem in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 343
Tabel B230 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een nekprobleem in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 344
Tabel B231 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 345
Tabel B232 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet volgde, Brussels Gewest 346
Tabel B233 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden medicamenteus behandeld werd, Brussels Gewest 347
Tabel B234 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden insuline gebruikte, Brussels Gewest 348
Tabel B235 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden orale antidiabetica gebruikte, Brussels Gewest 349
Tabel B236 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes volgens de behandeling van de aandoening, Brussels Gewest 350
Tabel B237 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met allergie in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 351
Tabel B238 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een maagzweer in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 352
Tabel B239 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met leverlijden in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 353
Tabel B240 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met kanker in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 354
Tabel B241 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ernstige hoofdpijn zoals migraine in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 355
Tabel B242 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met urinaire incontinentie in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 356
Tabel B243 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met depressie in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 357
Tabel B244 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met schildklierlijden in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 358
Tabel B245 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met cataract in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 359
Tabel B246 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met glaucoom in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 360
Tabel B247 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met maculadegeneratie in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 361
Tabel B248 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetische retinopathie in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 362
Tabel B249 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ziekte van Parkinson in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 363

Tabel B250 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met epilepsie in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 364
Tabel B251 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met langdurige vermoeidheid in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 365
Tabel B252 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met osteoporose in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 366
Tabel B253 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met gebroken heup in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 367
Tabel B254 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met darmziekte, langer dan 3 maanden in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 368
Tabel B255 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met nierstenen in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 369
Tabel B256 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ernstige nierziekte behalve nierstenen in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 370
Tabel B257 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met chronische blaasontsteking in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 371
Tabel B258 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ernstige of chronische huidaandoening in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 372
Tabel B259 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met galstenen of galblaasontsteking in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 373
Tabel B260 Percentage van de mannelijke bevolking van 15 jaar en ouder met prostaatklachten in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 374
Tabel B261 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met astma in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 375
Tabel B262 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met chronisch longlijden in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 376
Tabel B263 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hartinfarct in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 377
Tabel B264 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met coronaire hartziekte in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 378
Tabel B265 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ernstige hartziekte (uitgezonderd hartinfarct of coronaire hartziekte) in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 379
Tabel B266 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoge bloeddruk in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 380
Tabel B267 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoge bloeddruk dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet te hebben gevolgd, Brussels Gewest 381
Tabel B268 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoge bloeddruk dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden geneesmiddelen te hebben genomen, Brussels Gewest 382
Tabel B269 Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoge bloeddruk volgens de behandeling van de aandoening, Brussels Gewest 383
Tabel B270 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder methoog cholesterolgehalte in het bloed in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 384
Tabel B271 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet te hebben gevolgd, Brussels Gewest ..385

Tabel B272 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden geneesmiddelen te hebben genomen, Brussels Gewest 386
Tabel B273 Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed volgens de behandeling van de aandoening, Brussels Gewest 387
Tabel B274 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beroerte in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 388
Tabel B275 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met vernauwing van de bloedvaten in de buik of de benen in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 389
Tabel B276 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met reumatoïde artritis in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 390
Tabel B277 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met artrose in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 391
Tabel B278 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met een lage rugprobleem in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 392
Tabel B279 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met een nekprobleem in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 393
Tabel B280 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 394
Tabel B281 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet volgde, Brussels Gewest 395
Tabel B282 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden medicamenteus behandeld werd, Brussels Gewest 396
Tabel B283 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden insuline gebruikte, Brussels Gewest 397
Tabel B284 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden orale antidiabetica gebruikte, Brussels Gewest 398
Tabel B285 Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes volgens de behandeling van de aandoening, Brussels Gewest 399
Tabel B286 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met allergie in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 400
Tabel B287 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met een maagzweer in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 401
Tabel B288 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met leverlijden in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 402
Tabel B289 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met kanker in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 403
Tabel B290 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ernstige hoofdpijn zoals migraine in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 404
Tabel B291 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met urinaire incontinentie in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 405
Tabel B292 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met depressie in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 406
Tabel B293 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met schildklierlijden in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 407

Tabel B294 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met cataract in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 408
Tabel B295 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met glaucoom in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 409
Tabel B296 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetische retinopathie in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 410
Tabel B297 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met maculadegeneratie in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 411
Tabel B298 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ziekte van Parkinson in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 412
Tabel B299 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met epilepsie in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 413
Tabel B300 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met langdurige vermoeidheid in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 414
Tabel B301 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met osteoporose in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 415
Tabel B302 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met gebroken heup in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 416
Tabel B303 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met darmziekte, langer dan 3 maanden in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 417
Tabel B304 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met nierstenen in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 418
Tabel B305 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ernstige nierziekte behalve nierstenen in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 419
Tabel B306 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met chronische blaasontsteking in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 420
Tabel B307 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ernstige of chronische huidaandoening in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 421
Tabel B308 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met galstenen of galblaasontsteking in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 422
Tabel B309 Percentage van de mannelijke bevolking van 65 jaar en ouder met prostaatklachten in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 423
Tabel B310 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens aantal aandoeningen waaraan ze lijden °, Brussels Gewest 424
Tabel B311 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met multimorbiditeit *, Brussels Gewest 425
Tabel B312 Gemiddeld aantal chronische aandoeningen bij personen van 15 jaar en ouder (op een totaal van 25 aandoeningen°), Brussels Gewest 426
Tabel B313 Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder volgens aantal aandoeningen waaraan ze lijden °, Brussels Gewest 427
Tabel B314 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met multimorbiditeit *, Brussels Gewest 428
Tabel B315 Gemiddeld aantal chronische aandoeningen bij personen van 65 jaar en ouder (op een totaal van 25 aandoeningen°), Brussels Gewest 429
Tabel B316 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een zelfgerapporteerde chronische ziekte of aandoening, Waals Gewest 430
Tabel B317 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met astma in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 431

Tabel B318 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met chronisch longlijden in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 432
Tabel B319 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hartinfarct in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 433
Tabel B320 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met coronaire hartziekte in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 434
Tabel B321 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ernstige hartziekte (uitgezonderd hartinfarct of coronaire hartziekte) in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 435
Tabel B322 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoge bloeddruk in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 436
Tabel B323 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoge bloeddruk dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet te hebben gevolgd, Waals Gewest 437
Tabel B324 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoge bloeddruk dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden geneesmiddelen te hebben genomen, Waals Gewest 438
Tabel B325 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoge bloeddruk volgens de behandeling van de aandoening, Waals Gewest 439
Tabel B326 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 440
Tabel B327 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet te hebben gevolgd, Waals Gewest 441
Tabel B328 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden geneesmiddelen te hebben genomen, Waals Gewest 442
Tabel B329 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed volgens de behandeling van de aandoening, Waals Gewest 443
Tabel B330 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met beroerte in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 444
Tabel B331 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met vernauwing van de bloedvaten in de buik of de benen in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 445
Tabel B332 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met reumatoïde artritis in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 446
Tabel B333 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met artrose in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 447
Tabel B334 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een lage rugprobleem in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 448
Tabel B335 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een nekprobleem in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 449
Tabel B336 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 450
Tabel B337 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet volgde, Waals Gewest 451
Tabel B338 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden medicamenteus behandeld werd, Waals Gewest 452
Tabel B339 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden insuline gebruikte, Waals Gewest 453

Tabel B340 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden orale antidiabetica gebruikte, Waals Gewest 454
Tabel B341 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes volgens de behandeling van de aandoening, Waals Gewest 455
Tabel B342 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met allergie in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 456
Tabel B343 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een maagzweer in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 457
Tabel B344 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met leverlijden in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 458
Tabel B345 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met kanker in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 459
Tabel B346 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ernstige hoofdpijn zoals migraine in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 460
Tabel B347 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met urinaire incontinentie in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 461
Tabel B348 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met depressie in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 462
Tabel B349 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met schildklierlijden in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 463
Tabel B350 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met cataract in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 464
Tabel B351 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met glaucoom in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 465
Tabel B352 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met maculadegeneratie in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 466
Tabel B353 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetische retinopathie in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 467
Tabel B354 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ziekte van Parkinson in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 468
Tabel B355 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met epilepsie in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 469
Tabel B356 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met langdurige vermoeidheid in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 470
Tabel B357 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met osteoporose in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 471
Tabel B358 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met gebroken heup in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 472
Tabel B359 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met darmziekte, langer dan 3 maanden in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 473
Tabel B360 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met nierstenen in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 474
Tabel B361 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ernstige nierziekte behalve nierstenen in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 475
Tabel B362 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met chronische blaasontsteking in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 476

Tabel B363 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ernstige of chronische huidaandoening in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest....477
Tabel B364 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met galstenen of galblaasontsteking in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest....478
Tabel B365 Percentage van de mannelijke bevolking van 15 jaar en ouder met prostaatklachten in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest....479
Tabel B366 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met astma in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest....480
Tabel B367 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met chronisch longlijden in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest....481
Tabel B368 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hartinfarct in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest....482
Tabel B369 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met coronaire hartziekte in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest....483
Tabel B370 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ernstige hartziekte (uitgezonderd hartinfarct of coronaire hartziekte) in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest....484
Tabel B371 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoge bloeddruk in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest....485
Tabel B372 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoge bloeddruk dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet te hebben gevolgd, Waals Gewest....486
Tabel B373 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoge bloeddruk dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden geneesmiddelen te hebben genomen, Waals Gewest....487
Tabel B374 Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoge bloeddruk volgens de behandeling van de aandoening, Waals Gewest....488
Tabel B375 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder methoog cholesterolgehalte in het bloed in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest....489
Tabel B376 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet te hebben gevolgd, Waals Gewest....490
Tabel B377 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden geneesmiddelen te hebben genomen, Waals Gewest....491
Tabel B378 Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed volgens de behandeling van de aandoening, Waals Gewest....492
Tabel B379 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beroerte in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest....493
Tabel B380 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met vernauwing van de bloedvaten in de buik of de benen in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest....494
Tabel B381 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met reumatoïde artritis in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest....495
Tabel B382 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met artrose in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest....496
Tabel B383 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met een lage rugprobleem in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest....497
Tabel B384 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met een nekprobleem in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest....498

Tabel B385 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 499
Tabel B386 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet volgde, Waals Gewest 500
Tabel B387 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden medicamenteus behandeld werd, Waals Gewest 501
Tabel B388 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden insuline gebruikte, Waals Gewest 502
Tabel B389 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden orale antidiabetica gebruikte, Waals Gewest 503
Tabel B390 Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes volgens de behandeling van de aandoening, Waals Gewest 504
Tabel B391 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met allergie in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 505
Tabel B392 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met een maagzweer in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 506
Tabel B393 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met leverlijden in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 507
Tabel B394 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met kanker in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 508
Tabel B395 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ernstige hoofdpijn zoals migraine in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 509
Tabel B396 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met urinaire incontinentie in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 510
Tabel B397 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met depressie in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 511
Tabel B398 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met schildklierlijden in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 512
Tabel B399 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met cataract in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 513
Tabel B400 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met glaucoom in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 514
Tabel B401 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetische retinopathie in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 515
Tabel B402 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met maculadegeneratie in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 516
Tabel B403 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ziekte van Parkinson in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 517
Tabel B404 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met epilepsie in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 518
Tabel B405 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met langdurige vermoeidheid in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 519
Tabel B406 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met osteoporose in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 520
Tabel B407 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met gebroken heup in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 521

Tabel B408 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met darmziekte, langer dan 3 maanden in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest....522
Tabel B409 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met nierstenen in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest....523
Tabel B410 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ernstige nierziekte behalve nierstenen in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest....524
Tabel B411 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met chronische blaasontsteking in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest....525
Tabel B412 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ernstige of chronische huidaandoening in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest....526
Tabel B413 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met galstenen of galblaasontsteking in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest....527
Tabel B414 Percentage van de mannelijke bevolking van 65 jaar en ouder met prostaatklachten in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest....528
Tabel B415 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens aantal aandoeningen waaraan ze lijden °, Waals Gewest....529
Tabel B416 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met multimorbiditeit *, Waals Gewest....530
Tabel B417 Gemiddeld aantal chronische aandoeningen bij personen van 15 jaar en ouder (op een totaal van 25 aandoeningen°), Waals Gewest....531
Tabel B418 Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder volgens aantal aandoeningen waaraan ze lijden °, Waals Gewest....532
Tabel B419 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met multimorbiditeit *, Waals Gewest....533
Tabel B420 Gemiddeld aantal chronische aandoeningen bij personen van 65 jaar en ouder (op een totaal van 25 aandoeningen°), Waals Gewest....534

Tabel B1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een zelfgerapporteerde chronische ziekte of aandoening, België

MA_SH02		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	27,2	(25,2-29,1)	26,0	(24,0-28,0)	3762
	Vrouwen	31,3	(29,4-33,2)	29,4	(27,3-31,5)	4183
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	14,1	(10,4-17,8)	14,1	(10,8-18,3)	720
	25 - 34	17,4	(14,2-20,7)	17,4	(14,4-20,8)	1038
	35 - 44	25,0	(21,7-28,3)	25,0	(21,9-28,4)	1292
	45 - 54	30,0	(26,7-33,3)	30,0	(26,8-33,4)	1461
	55 - 64	36,7	(32,9-40,4)	36,6	(32,9-40,5)	1449
	65 - 74	39,7	(36,0-43,4)	39,6	(35,9-43,3)	1118
	75 +	44,1	(39,8-48,3)	43,7	(39,5-48,0)	867
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	45,0	(39,1-50,9)	36,6	(30,6-42,9)	486
	Lager secundair	32,8	(28,7-36,8)	27,1	(23,5-30,9)	989
	Hoger secundair	30,6	(27,9-33,2)	29,3	(26,6-32,2)	2387
	Hoger onderwijs	25,6	(23,6-27,6)	25,4	(23,4-27,5)	3931
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	27,6	(25,6-29,5)	25,5	(23,5-27,6)	3202
	Brussels Gewest	28,7	(26,2-31,1)	28,8	(26,5-31,3)	1831
	Waals Gewest	32,7	(30,0-35,4)	31,4	(28,7-34,1)	2912
JAAR	**2001**	25,1	(23,9-26,3)	24,5	(23,3-25,8)	9069
	2004	25,7	(24,4-27,0)	25,0	(23,7-26,3)	8842
	2008	28,1	(26,6-29,6)	26,7	(25,3-28,2)	7386
	2013	28,6	(27,0-30,2)	26,4	(24,8-28,0)	6299
	2018	29,3	(27,9-30,8)	27,0	(25,6-28,5)	7945

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B2 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met astma in de afgelopen 12 maanden, België

MA01_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	5,0	(4,1-5,8)	4,9	(4,1-5,8)	4673
	Vrouwen	6,5	(5,5-7,5)	6,4	(5,5-7,4)	5079
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	6,4	(4,4-8,4)	6,4	(4,6-8,7)	1059
	25 - 34	4,9	(3,3-6,5)	4,9	(3,5-6,7)	1338
	35 - 44	6,3	(4,4-8,2)	6,3	(4,6-8,4)	1578
	45 - 54	4,0	(2,9-5,1)	4,0	(3,0-5,3)	1725
	55 - 64	7,6	(5,8-9,4)	7,5	(5,9-9,5)	1669
	65 - 74	5,3	(3,9-6,7)	5,2	(4,0-6,8)	1289
	75 +	6,1	(4,1-8,2)	5,9	(4,3-8,2)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	8,4	(5,9-10,8)	8,2	(6,0-11,1)	723
	Lager secundair	6,7	(4,6-8,8)	6,6	(4,8-8,9)	1276
	Hoger secundair	6,2	(4,9-7,5)	6,0	(4,9-7,4)	2892
	Hoger onderwijs	4,8	(4,0-5,6)	4,7	(3,9-5,5)	4680
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	4,6	(3,7-5,4)	4,4	(3,7-5,3)	3639
	Brussels Gewest	7,2	(5,9-8,4)	7,1	(5,9-8,5)	2513
	Waals Gewest	7,3	(6,0-8,6)	7,1	(5,9-8,5)	3600
JAAR	**2001**	4,7	(4,1-5,3)	4,7	(4,2-5,3)	10064
	2004	4,3	(3,8-4,9)	4,3	(3,8-4,9)	11135
	2008	4,2	(3,6-4,8)	4,2	(3,7-4,8)	9589
	2013	4,3	(3,7-4,9)	4,3	(3,7-4,9)	9113
	018	5,8	(5,1-6,4)	5,7	(5,1-6,4)	9752

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B3 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met chronisch longlijden in de afgelopen 12 maanden, België

MA02_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	3,7	(3,0-4,4)	3,2	(2,6-3,9)	4671
	Vrouwen	4,6	(3,8-5,4)	3,6	(2,9-4,5)	5077
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	1,4	(0,4-2,4)	1,4	(0,7-2,8)	1057
	25 - 34	1,7	(0,8-2,6)	1,7	(1,0-2,9)	1338
	35 - 44	2,1	(1,1-3,1)	2,1	(1,3-3,4)	1578
	45 - 54	3,3	(2,3-4,4)	3,3	(2,4-4,5)	1725
	55 - 64	6,4	(4,9-7,9)	6,4	(5,0-8,1)	1669
	65 - 74	6,5	(4,7-8,4)	6,5	(4,9-8,6)	1287
	75 +	9,8	(7,3-12,3)	9,7	(7,5-12,5)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	11,9	(8,4-15,4)	7,6	(5,4-10,7)	723
	Lager secundair	7,3	(5,3-9,3)	5,2	(3,8-7,1)	1276
	Hoger secundair	4,2	(3,2-5,1)	3,7	(2,9-4,8)	2890
	Hoger onderwijs	2,2	(1,6-2,7)	2,1	(1,6-2,7)	4678
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	3,6	(2,9-4,3)	2,8	(2,2-3,6)	3636
	Brussels Gewest	3,7	(2,8-4,6)	3,5	(2,7-4,5)	2512
	Waals Gewest	5,2	(4,2-6,2)	4,3	(3,5-5,4)	3600
JAAR	**2001**	6,0	(5,4-6,6)	5,6	(5,0-6,2)	10041
	2004	5,8	(5,2-6,4)	5,3	(4,8-5,9)	11132
	2008	4,0	(3,5-4,5)	3,6	(3,2-4,1)	9576
	2013	4,0	(3,4-4,5)	3,5	(3,0-4,0)	9113
	2018	4,2	(3,6-4,7)	3,6	(3,1-4,1)	9748

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B4 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hartinfarct in de afgelopen 12 maanden, België

MA03_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,0	(0,6-1,3)	0,8	(0,5-1,2)	4674
	Vrouwen	0,5	(0,3-0,8)	0,4	(0,2-0,7)	5079
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	1059
	25 - 34	0,0	.	.	.	1338
	35 - 44	0,2	(0,0-0,5)	0,2	(0,1-0,8)	1578
	45 - 54	0,2	(0,0-0,6)	0,2	(0,1-0,8)	1725
	55 - 64	1,1	(0,5-1,7)	1,0	(0,6-1,8)	1670
	65 - 74	2,1	(1,2-3,0)	2,0	(1,3-3,2)	1289
	75 +	2,4	(0,9-3,8)	2,4	(1,3-4,3)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	2,9	(0,6-5,2)	1,3	(0,6-2,6)	723
	Lager secundair	1,2	(0,5-1,9)	0,6	(0,3-1,3)	1276
	Hoger secundair	0,7	(0,4-1,1)	0,5	(0,3-0,8)	2892
	Hoger onderwijs	0,4	(0,2-0,6)	0,4	(0,2-0,8)	4681
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	0,6	(0,3-0,9)	0,0	(0,0-0,0)	3639
	Brussels Gewest	0,6	(0,2-1,0)	0,0	(0,0-0,0)	2513
	Waals Gewest	1,0	(0,6-1,4)	0,0	(0,0-0,0)	3601
JAAR	**2008**	0,8	(0,6-0,9)	0,5	(0,4-0,7)	9598
	2013	1,0	(0,7-1,3)	0,7	(0,5-1,0)	9112
	2018	0,7	(0,5-1,0)	0,5	(0,3-0,7)	9753

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B5 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met coronaire hartziekte in de afgelopen 12 maanden, België

MA04_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,5	(1,0-2,0)	0,9	(0,6-1,4)	4673
	Vrouwen	1,1	(0,6-1,5)	0,5	(0,3-0,9)	5078
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	1059
	25 - 34	0,1	(0,0-0,2)	0,2	(0,1-0,7)	1338
	35 - 44	0,1	(0,0-0,2)	0,2	(0,1-0,8)	1578
	45 - 54	0,4	(0,0-0,7)	0,4	(0,1-0,9)	1725
	55 - 64	2,3	(1,0-3,5)	2,2	(1,2-3,9)	1669
	65 - 74	3,0	(1,8-4,1)	2,9	(2,0-4,2)	1288
	75 +	4,7	(2,9-6,6)	4,8	(3,3-7,1)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	2,5	(1,2-3,8)	0,7	(0,4-1,4)	721
	Lager secundair	2,2	(1,2-3,2)	0,8	(0,4-1,4)	1276
	Hoger secundair	1,6	(0,8-2,3)	0,8	(0,5-1,4)	2892
	Hoger onderwijs	0,7	(0,4-1,0)	0,6	(0,4-0,9)	4681
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	1,3	(0,8-1,8)	0,1	(0,0-0,1)	3637
	Brussels Gewest	1,0	(0,6-1,4)	0,1	(0,0-0,1)	2513
	Waals Gewest	1,4	(0,9-1,8)	0,1	(0,0-0,1)	3601
JAAR	**2008**	2,1	(1,7-2,6)	1,2	(0,9-1,5)	9578
	2013	1,5	(1,1-1,8)	0,8	(0,6-1,1)	9112
	2018	1,3	(1,0-1,6)	0,7	(0,5-0,9)	9751

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B6 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ernstige hartziekte (uitgezonderd hartinfarct of coronaire hartziekte) in de afgelopen 12 maanden, België

MA05_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	3,8	(3,0-4,5)	2,0	(1,4-2,7)	4674
	Vrouwen	3,0	(2,4-3,7)	1,3	(0,9-1,9)	5078
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	(0,0-0,0)	0,2	(0,0-0,6)	1059
	25 - 34	0,4	(0,0-0,9)	0,4	(0,1-1,2)	1338
	35 - 44	0,8	(0,3-1,3)	0,8	(0,4-1,5)	1578
	45 - 54	2,2	(1,2-3,1)	2,1	(1,4-3,2)	1725
	55 - 64	5,2	(3,7-6,6)	5,1	(3,8-6,8)	1670
	65 - 74	6,4	(4,4-8,4)	6,3	(4,6-8,6)	1289
	75 +	12,0	(9,2-14,8)	12,2	(9,6-15,4)	1093
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	8,4	(5,3-11,5)	2,1	(1,3-3,6)	723
	Lager secundair	5,7	(3,9-7,6)	1,9	(1,2-2,9)	1276
	Hoger secundair	2,7	(1,9-3,4)	1,3	(0,9-1,9)	2892
	Hoger onderwijs	2,5	(1,8-3,1)	1,5	(1,1-2,1)	4680
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	4,0	(3,2-4,8)	1,2	(0,8-1,7)	3639
	Brussels Gewest	1,6	(1,1-2,1)	0,6	(0,4-1,0)	2513
	Waals Gewest	2,9	(2,1-3,7)	0,9	(0,6-1,4)	3600
JAAR	**2013**	2,2	(1,8-2,6)	1,2	(0,9-1,5)	9111
	2018	3,4	(2,9-3,9)	1,8	(1,4-2,2)	9752

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B7 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoge bloeddruk in de afgelopen 12 maanden, België

MA06_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	17,2	(15,8-18,6)	11,6	(10,2-13,3)	4671
	Vrouwen	17,9	(16,5-19,3)	11,1	(9,7-12,5)	5075
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	1,0	(0,4-1,7)	1,0	(0,5-2,0)	1057
	25 - 34	3,0	(1,7-4,3)	3,0	(1,9-4,6)	1338
	35 - 44	8,6	(6,8-10,4)	8,6	(6,9-10,5)	1577
	45 - 54	16,5	(14,1-18,9)	16,5	(14,2-19,0)	1723
	55 - 64	28,1	(25,0-31,1)	28,0	(25,1-31,2)	1669
	65 - 74	36,2	(32,8-39,7)	36,3	(32,9-39,8)	1289
	75 +	39,0	(35,0-42,9)	39,1	(35,2-43,1)	1093
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	28,6	(23,9-33,3)	12,2	(9,7-15,2)	723
	Lager secundair	25,2	(22,0-28,4)	12,8	(10,7-15,3)	1274
	Hoger secundair	17,4	(15,6-19,2)	11,8	(10,1-13,8)	2890
	Hoger onderwijs	14,0	(12,6-15,4)	10,4	(9,1-11,9)	4678
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	17,9	(16,5-19,4)	11,0	(9,7-12,6)	3636
	Brussels Gewest	13,2	(11,8-14,6)	10,0	(8,7-11,5)	2512
	Waals Gewest	18,4	(16,6-20,2)	12,3	(10,6-14,1)	3598
JAAR	**1997**	10,9	(10,0-11,9)	9,2	(8,3-10,2)	8543
	2001	14,1	(13,0-15,1)	10,2	(9,4-11,1)	10055
	2004	15,0	(14,0-15,9)	10,9	(10,0-11,8)	11123
	2008	15,7	(14,7-16,8)	11,2	(10,4-12,1)	9524
	2013	16,5	(15,3-17,6)	11,5	(10,6-12,5)	9112
	2018	17,6	(16,6-18,6)	12,0	(11,2-12,9)	9746

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B8 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoge bloeddruk dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet te hebben gevolgd, België

MA06_3		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	17,8	(14,4-21,3)	18,7	(14,3-24,0)	855
	Vrouwen	21,3	(17,8-24,8)	22,9	(17,8-28,9)	934
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	7,0	(5,2-8,8)	33,6	(11,6-66,0)	14
	25 - 34	10,9	(2,5-19,4)	13,4	(5,2-30,2)	39
	35 - 44	24,3	(14,3-34,3)	24,8	(16,3-35,9)	134
	45 - 54	18,0	(12,4-23,7)	18,3	(13,3-24,7)	270
	55 - 64	23,5	(17,8-29,2)	23,4	(18,3-29,5)	441
	65 - 74	16,1	(11,8-20,4)	15,8	(12,0-20,6)	462
	75 +	20,3	(14,7-25,8)	19,7	(14,7-25,8)	429
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	21,7	(13,0-30,4)	23,1	(14,3-35,1)	204
	Lager secundair	19,9	(14,3-25,4)	21,2	(14,7-29,4)	314
	Hoger secundair	18,0	(13,8-22,3)	19,4	(14,5-25,4)	543
	Hoger onderwijs	20,4	(16,2-24,7)	21,9	(16,6-28,3)	678
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	18,1	(14,7-21,6)	14,9	(11,1-19,7)	711
	Brussels Gewest	31,2	(25,8-36,6)	26,1	(19,6-33,9)	386
	Waals Gewest	19,6	(15,3-24,0)	16,1	(11,7-21,7)	692
JAAR	**2001**	29,1	(25,2-33,1)	27,9	(23,8-32,3)	1311
	2008	22,9	(19,4-26,4)	21,6	(17,9-25,8)	1160
	2013	21,3	(18,0-24,5)	20,1	(16,6-24,0)	1533
	2018	19,7	(17,1-22,2)	18,7	(15,8-22,1)	1789

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B9 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoge bloeddruk dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden geneesmiddelen te hebben genomen, België

MA06_4		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	Mannen	85,9	(82,5-89,2)	77,8	(71,6-82,9)	855
	Vrouwen	89,0	(86,5-91,4)	78,8	(72,8-83,7)	934
LEEFTIJDSGROEP	15 - 24	41,6	(5,5-77,7)	41,9	(16,4-72,7)	14
	25 - 34	42,7	(19,2-66,1)	42,8	(23,6-64,3)	39
	35 - 44	67,0	(55,9-78,1)	67,1	(55,8-76,8)	134
	45 - 54	82,0	(75,8-88,2)	82,1	(75,2-87,4)	270
	55 - 64	92,9	(90,1-95,6)	92,9	(89,6-95,2)	441
	65 - 74	92,8	(90,0-95,6)	92,7	(89,4-95,1)	462
	75 +	93,3	(90,1-96,4)	93,2	(89,4-95,8)	429
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager/geen diploma	89,7	(84,7-94,7)	69,9	(55,0-81,6)	204
	Lager secundair	88,6	(83,9-93,3)	74,4	(63,2-83,2)	314
	Hoger secundair	85,7	(81,6-89,9)	77,6	(70,4-83,4)	543
	Hoger onderwijs	88,0	(84,8-91,2)	81,7	(75,4-86,7)	678
VERBLIJFPLAATS	Vlaams Gewest	88,7	(86,1-91,4)	79,2	(73,1-84,2)	711
	Brussels Gewest	84,0	(79,8-88,2)	75,7	(68,2-81,9)	386
	Waals Gewest	86,3	(82,4-90,1)	77,6	(70,6-83,3)	692
JAAR	1997	78,7	(75,2-82,2)	73,5	(68,9-77,7)	1108
	2001	78,3	(75,1-81,6)	67,4	(62,2-72,1)	1406
	2008	80,6	(77,4-83,8)	69,9	(64,8-74,5)	1147
	2013	90,8	(88,7-92,8)	84,6	(80,9-87,6)	1532
	2018	87,5	(85,4-89,6)	79,3	(75,7-82,5)	1789

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B10 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoge bloeddruk volgens de behandeling van de aandoening, België

MA06_5		Geen behandeling	Enkel dieet	Medicamenteuze behandeling	N
GESLACHT	**Mannen**	11,9	2,3	85,9	855
	Vrouwen	9,0	2,0	89,0	934
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	55,0	3,4	41,6	14
	25 - 34	50,0	7,4	42,7	39
	35 - 44	30,9	2,1	67,0	134
	45 - 54	12,0	6,0	82,0	270
	55 - 64	5,9	1,2	92,9	441
	65 - 74	6,5	0,7	92,8	462
	75 +	5,4	1,3	93,3	429
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	9,1	1,2	89,7	204
	Lager secundair	8,6	2,8	88,6	314
	Hoger secundair	12,3	1,9	85,7	543
	Hoger onderwijs	9,7	2,3	88,0	678
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	9,2	2,1	88,7	711
	Brussels Gewest	13,3	2,7	84,0	386
	Waals Gewest	11,6	2,1	86,3	692
JAAR	**2001**	12,8	3,7	83,5	1338
	2008	17,8	1,5	80,6	1146
	2013	7,8	1,5	90,8	1532
	2018	10,4	2,1	87,5	1789

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

Tabel B11 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed in de afgelopen 12 maanden, België

MA07_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	18,9	(17,4-20,5)	13,9	(12,1-15,9)	4648
	Vrouwen	17,1	(15,8-18,5)	11,3	(9,8-12,9)	5070
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	1,3	(0,3-2,4)	1,3	(0,6-2,9)	1051
	25 - 34	4,3	(2,8-5,8)	4,3	(3,0-6,0)	1331
	35 - 44	9,3	(7,3-11,4)	9,3	(7,4-11,5)	1575
	45 - 54	17,7	(15,0-20,4)	17,6	(15,1-20,4)	1717
	55 - 64	27,6	(24,7-30,5)	27,6	(24,8-30,6)	1664
	65 - 74	38,2	(34,7-41,8)	38,3	(34,8-41,9)	1288
	75 +	35,9	(31,8-39,9)	36,4	(32,4-40,6)	1092
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	28,1	(23,4-32,9)	13,6	(10,6-17,3)	720
	Lager secundair	25,4	(22,2-28,6)	14,2	(11,8-17,0)	1272
	Hoger secundair	17,6	(15,6-19,6)	12,7	(10,8-14,9)	2881
	Hoger onderwijs	14,7	(13,2-16,2)	11,6	(10,0-13,4)	4665
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	18,9	(17,3-20,5)	12,7	(11,0-14,5)	3625
	Brussels Gewest	13,2	(11,7-14,6)	10,6	(9,1-12,3)	2501
	Waals Gewest	18,0	(16,1-19,8)	12,8	(10,9-14,9)	3592
JAAR	**2013**	16,8	(15,6-17,9)	11,8	(10,7-13,1)	9097
	2018	18,0	(16,9-19,1)	12,5	(11,3-13,7)	9718

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B12 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet te hebben gevolgd, België

MA07_3		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	24,0	(20,3-27,7)	26,8	(20,8-33,7)	885
	Vrouwen	28,0	(24,2-31,8)	31,2	(24,9-38,3)	894
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	44,5	(24,5-64,4)	49,6	(15,6-83,9)	12
	25 - 34	23,0	(6,8-39,3)	23,2	(11,9-40,3)	53
	35 - 44	36,1	(24,9-47,3)	36,8	(26,5-48,4)	128
	45 - 54	22,7	(16,6-28,9)	23,2	(17,5-29,9)	277
	55 - 64	22,8	(18,2-27,4)	22,9	(18,6-27,8)	467
	65 - 74	27,9	(22,7-33,0)	27,7	(22,9-33,1)	481
	75 +	25,8	(19,2-32,4)	25,4	(19,4-32,5)	361
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	22,5	(13,3-31,6)	24,4	(15,1-36,8)	197
	Lager secundair	24,9	(19,1-30,7)	27,8	(20,2-37,1)	315
	Hoger secundair	24,5	(19,7-29,4)	27,2	(20,5-35,2)	522
	Hoger onderwijs	27,8	(23,4-32,3)	30,9	(24,2-38,4)	708
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	26,4	(22,6-30,2)	29,0	(22,7-36,3)	747
	Brussels Gewest	35,2	(29,7-40,7)	38,2	(30,3-46,9)	389
	Waals Gewest	23,1	(18,6-27,6)	25,2	(19,0-32,6)	643
JAAR	**2013**	30,7	(27,2-34,1)	31,7	(26,9-37,0)	1518
	2018	26,0	(23,2-28,7)	27,0	(22,6-31,9)	1779

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B13 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden geneesmiddelen te hebben genomen, België

MA07_4		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	70,8	(66,5-75,1)	60,8	(52,1-68,8)	885
	Vrouwen	68,6	(64,5-72,7)	51,3	(43,5-59,1)	894
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	32,4	(28,3-36,6)	38,9	(10,4-77,8)	12
	25 - 34	24,2	(7,9-40,6)	23,7	(11,9-41,8)	53
	35 - 44	37,1	(25,7-48,6)	35,7	(25,6-47,3)	128
	45 - 54	50,5	(41,9-59,2)	49,4	(40,9-57,9)	277
	55 - 64	74,5	(69,2-79,7)	74,3	(68,6-79,4)	467
	65 - 74	81,4	(76,8-86,0)	81,6	(76,7-85,8)	481
	75 +	87,9	(83,5-92,2)	88,4	(83,4-92,0)	361
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	81,7	(74,6-88,8)	61,0	(47,6-72,9)	197
	Lager secundair	76,3	(70,1-82,6)	56,6	(45,0-67,5)	315
	Hoger secundair	74,3	(69,1-79,6)	63,2	(54,0-71,4)	522
	Hoger onderwijs	60,2	(54,9-65,6)	48,7	(40,9-56,6)	708
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	73,3	(69,4-77,3)	57,8	(49,1-66,1)	747
	Brussels Gewest	64,5	(59,0-70,0)	50,7	(41,5-59,9)	389
	Waals Gewest	64,6	(58,9-70,3)	51,8	(42,1-61,4)	643
JAAR	**2013**	74,6	(71,5-77,7)	60,1	(53,9-66,0)	1518
	2018	69,7	(66,7-72,8)	53,2	(46,7-59,7)	1779

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B14 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed volgens de behandeling van de aandoening, België

MA07_5		Geen behandeling	Enkel dieet	Medicamenteuze behandeling	N
GESLACHT	**Mannen**	23,7	5,5	70,8	885
	Vrouwen	23,6	7,8	68,6	894
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	55,5	12,0	32,4	12
	25 - 34	57,9	17,9	24,2	53
	35 - 44	41,3	21,5	37,1	128
	45 - 54	40,9	8,5	50,5	277
	55 - 64	21,3	4,2	74,5	467
	65 - 74	15,1	3,6	81,4	481
	75 +	8,5	3,7	87,9	361
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	14,8	3,4	81,7	197
	Lager secundair	19,7	4,0	76,3	315
	Hoger secundair	20,8	4,8	74,3	522
	Hoger onderwijs	30,1	9,6	60,2	708
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	19,3	7,4	73,3	747
	Brussels Gewest	26,4	9,1	64,5	389
	Waals Gewest	30,6	4,8	64,6	643
JAAR	**2013**	17,9	7,4	74,6	1518
	2018	23,6	6,6	69,7	1779

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

Tabel B15 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met beroerte in de afgelopen 12 maanden, België

MA08_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,1	(0,6-1,5)	0,9	(0,6-1,4)	4674
	Vrouwen	0,4	(0,2-0,6)	0,3	(0,2-0,6)	5078
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	1059
	25 - 34	0,0	.	.	.	1338
	35 - 44	0,1	(0,0-0,2)	0,2	(0,0-0,7)	1578
	45 - 54	0,5	(0,1-0,9)	0,4	(0,2-1,0)	1725
	55 - 64	1,1	(0,5-1,8)	1,0	(0,5-1,8)	1669
	65 - 74	1,7	(0,9-2,5)	1,5	(0,9-2,4)	1289
	75 +	2,4	(1,0-3,8)	2,3	(1,3-4,1)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	3,1	(0,8-5,5)	1,3	(0,7-2,6)	723
	Lager secundair	1,1	(0,5-1,7)	0,5	(0,3-1,1)	1276
	Hoger secundair	0,5	(0,2-0,7)	0,3	(0,2-0,5)	2892
	Hoger onderwijs	0,5	(0,3-0,8)	0,6	(0,3-1,0)	4680
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	0,6	(0,2-0,9)	0,0	(0,0-0,0)	3638
	Brussels Gewest	0,4	(0,2-0,6)	0,0	(0,0-0,0)	2513
	Waals Gewest	1,1	(0,7-1,5)	0,0	(0,0-0,0)	3601
JAAR	**1997**	0,8	(0,5-1,2)	0,9	(0,6-1,3)	8542
	2001	0,6	(0,5-0,8)	0,5	(0,4-0,7)	10069
	2004	0,7	(0,5-0,9)	0,6	(0,4-0,7)	11112
	2008	1,1	(0,8-1,4)	0,8	(0,6-1,0)	9594
	2013	1,0	(0,7-1,2)	0,7	(0,5-1,0)	9112
	2018	0,7	(0,5-0,9)	0,5	(0,4-0,7)	9752

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B16 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met vernauwing van de bloedvaten in de buik of de benen in de afgelopen 12 maanden, België

MA09_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	2,2	(1,6-2,8)	1,5	(1,1-2,2)	4670
	Vrouwen	2,0	(1,5-2,5)	1,2	(0,8-1,8)	5069
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	1059
	25 - 34	0,3	(0,0-0,8)	0,4	(0,1-1,2)	1337
	35 - 44	0,9	(0,0-1,7)	0,9	(0,3-2,3)	1577
	45 - 54	1,7	(0,9-2,5)	1,6	(1,0-2,7)	1725
	55 - 64	2,7	(1,8-3,7)	2,7	(1,9-3,9)	1670
	65 - 74	3,6	(2,4-4,8)	3,6	(2,6-5,0)	1286
	75 +	7,3	(5,2-9,5)	7,5	(5,5-10,0)	1085
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	6,6	(3,7-9,5)	2,7	(1,6-4,5)	723
	Lager secundair	4,1	(2,6-5,5)	2,1	(1,3-3,4)	1271
	Hoger secundair	1,6	(1,1-2,1)	1,1	(0,8-1,7)	2888
	Hoger onderwijs	1,3	(0,9-1,8)	1,2	(0,8-1,7)	4677
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	2,4	(1,8-2,9)	0,2	(0,2-0,3)	3630
	Brussels Gewest	1,2	(0,8-1,6)	0,1	(0,1-0,2)	2510
	Waals Gewest	1,9	(1,4-2,5)	0,2	(0,1-0,3)	3599
JAAR	**2013**	2,4	(1,9-2,8)	1,4	(1,1-1,8)	9103
	2018	2,1	(1,7-2,5)	1,2	(0,9-1,6)	9739

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B17 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met reumatoïde artritis in de afgelopen 12 maanden, België

MA10_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	5,9	(5,0-6,8)	4,5	(3,7-5,5)	4668
	Vrouwen	9,5	(8,5-10,5)	6,8	(5,8-8,1)	5075
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	1,6	(0,5-2,8)	1,6	(0,8-3,2)	1057
	25 - 34	1,5	(0,5-2,5)	1,5	(0,7-2,8)	1338
	35 - 44	4,3	(3,0-5,7)	4,3	(3,1-5,9)	1578
	45 - 54	7,7	(5,9-9,4)	7,6	(6,0-9,5)	1723
	55 - 64	11,3	(9,3-13,2)	11,1	(9,3-13,2)	1665
	65 - 74	14,5	(11,9-17,0)	14,2	(11,8-16,8)	1289
	75 +	17,4	(14,3-20,4)	16,6	(13,8-19,7)	1093
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	13,7	(10,2-17,2)	6,8	(5,0-9,3)	722
	Lager secundair	11,5	(9,2-13,8)	6,6	(5,0-8,7)	1275
	Hoger secundair	8,0	(6,7-9,3)	6,1	(5,0-7,6)	2888
	Hoger onderwijs	5,7	(4,8-6,6)	4,7	(3,9-5,7)	4677
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	9,6	(8,4-10,7)	6,8	(5,6-8,1)	3635
	Brussels Gewest	4,4	(3,5-5,2)	3,6	(2,9-4,5)	2512
	Waals Gewest	5,8	(4,8-6,8)	4,2	(3,4-5,1)	3596
JAAR	**1997**	6,6	(5,7-7,4)	5,6	(4,9-6,5)	8538
	2001	7,8	(7,0-8,5)	5,6	(5,1-6,3)	10070
	2004	7,1	(6,4-7,8)	5,1	(4,5-5,7)	11091
	2008	7,3	(6,6-8,0)	5,1	(4,6-5,7)	9527
	2013	8,1	(7,3-8,9)	5,5	(4,9-6,2)	9111
	2018	7,8	(7,1-8,5)	5,2	(4,6-5,8)	9743

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B18 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met artrose in de afgelopen 12 maanden, België

MA11_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	14,3	(12,9-15,7)	8,7	(7,5-10,2)	4671
	Vrouwen	22,7	(21,1-24,2)	14,1	(12,2-16,1)	5075
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	1,1	(0,2-2,0)	1,2	(0,5-2,5)	1057
	25 - 34	2,0	(1,0-3,0)	2,0	(1,2-3,2)	1338
	35 - 44	8,1	(5,9-10,2)	7,9	(6,1-10,3)	1578
	45 - 54	17,3	(14,6-20,0)	17,1	(14,6-20,0)	1723
	55 - 64	29,8	(26,6-32,9)	29,5	(26,3-32,8)	1668
	65 - 74	38,5	(35,0-42,0)	38,1	(34,6-41,7)	1289
	75 +	44,1	(40,1-48,0)	42,7	(38,7-46,7)	1093
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	32,8	(27,8-37,8)	13,1	(10,1-16,8)	723
	Lager secundair	26,3	(23,0-29,6)	12,1	(9,8-14,8)	1275
	Hoger secundair	19,3	(17,3-21,3)	12,6	(10,6-14,8)	2889
	Hoger onderwijs	14,1	(12,5-15,6)	9,8	(8,4-11,4)	4678
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	18,4	(16,9-20,0)	10,4	(8,9-12,2)	3633
	Brussels Gewest	12,3	(10,9-13,8)	8,5	(7,2-9,9)	2513
	Waals Gewest	20,8	(18,7-22,9)	13,1	(11,2-15,4)	3600
JAAR	**1997**	12,1	(11,0-13,2)	9,4	(8,3-10,6)	8542
	2001	14,4	(13,4-15,4)	9,3	(8,5-10,2)	10059
	2004	12,6	(11,8-13,5)	7,8	(7,2-8,6)	11097
	2008	15,9	(14,8-17,0)	10,2	(9,3-11,1)	9430
	2013	16,7	(15,6-17,8)	10,3	(9,4-11,3)	9107
	2018	18,6	(17,5-19,7)	11,5	(10,5-12,5)	9746

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B19 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een lage rugprobleem in de afgelopen 12 maanden, België

MA12_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	23,2	(21,5-24,9)	22,3	(20,6-24,2)	4671
	Vrouwen	26,4	(24,6-28,1)	24,8	(23,1-26,6)	5076
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	9,7	(7,1-12,2)	9,7	(7,4-12,6)	1056
	25 - 34	16,3	(13,4-19,2)	16,3	(13,6-19,4)	1338
	35 - 44	23,2	(20,1-26,4)	23,3	(20,2-26,6)	1578
	45 - 54	28,9	(25,9-32,0)	29,0	(26,0-32,1)	1723
	55 - 64	31,7	(28,7-34,7)	31,6	(28,7-34,7)	1669
	65 - 74	31,4	(28,2-34,7)	31,4	(28,2-34,8)	1289
	75 +	35,2	(31,0-39,4)	34,9	(30,9-39,2)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	32,8	(27,3-38,2)	27,1	(22,1-32,7)	723
	Lager secundair	27,3	(24,0-30,6)	23,6	(20,6-26,8)	1275
	Hoger secundair	27,9	(25,5-30,3)	27,2	(24,9-29,7)	2890
	Hoger onderwijs	21,0	(19,4-22,7)	20,7	(19,0-22,5)	4678
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	27,4	(25,6-29,2)	25,7	(23,9-27,6)	3636
	Brussels Gewest	17,5	(15,8-19,2)	17,5	(15,8-19,3)	2513
	Waals Gewest	22,9	(20,7-25,0)	21,8	(19,7-24,1)	3598
JAAR	**2008**	20,5	(19,3-21,7)	19,5	(18,3-20,7)	9408
	2013	20,8	(19,6-22,0)	19,5	(18,4-20,8)	9110
	2018	24,8	(23,6-26,1)	23,4	(22,2-24,7)	9747

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B20 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een nekprobleem in de afgelopen 12 maanden, België

MA13_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	10,6	(9,4-11,9)	9,8	(8,7-11,2)	4670
	Vrouwen	18,9	(17,3-20,4)	17,5	(15,9-19,3)	5078
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	5,4	(3,1-7,7)	5,2	(3,4-8,0)	1056
	25 - 34	8,4	(6,3-10,5)	8,1	(6,3-10,4)	1338
	35 - 44	13,8	(10,9-16,7)	13,5	(10,9-16,6)	1578
	45 - 54	19,4	(16,7-22,2)	19,1	(16,5-22,0)	1725
	55 - 64	19,5	(16,9-22,1)	19,0	(16,5-21,8)	1669
	65 - 74	19,5	(16,4-22,7)	18,8	(15,9-22,1)	1289
	75 +	18,6	(15,5-21,7)	17,1	(14,4-20,3)	1093
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	16,7	(12,7-20,6)	13,3	(10,1-17,3)	723
	Lager secundair	17,3	(14,5-20,1)	14,2	(11,8-17,1)	1276
	Hoger secundair	15,4	(13,6-17,2)	14,2	(12,5-16,2)	2890
	Hoger onderwijs	13,4	(11,8-15,0)	12,3	(10,8-14,1)	4679
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	16,0	(14,5-17,6)	14,2	(12,7-15,9)	3636
	Brussels Gewest	10,2	(8,9-11,5)	9,6	(8,3-11,0)	2513
	Waals Gewest	14,3	(12,6-16,1)	12,9	(11,2-14,8)	3599
JAAR	**2008**	11,5	(10,6-12,3)	10,0	(9,2-10,9)	9496
	2013	11,8	(10,8-12,7)	10,1	(9,3-11,0)	9111
	2018	14,9	(13,8-15,9)	12,9	(11,9-14,1)	9748

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B21 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes in de afgelopen 12 maanden, België

MA14_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	6,1	(5,2-7,0)	4,3	(3,4-5,4)	4671
	Vrouwen	5,6	(4,8-6,5)	3,5	(2,9-4,4)	5079
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	1,0	(0,0-2,1)	1,0	(0,4-2,8)	1059
	25 - 34	1,3	(0,7-2,0)	1,3	(0,8-2,2)	1338
	35 - 44	2,1	(1,1-3,0)	2,0	(1,3-3,2)	1577
	45 - 54	3,7	(2,6-4,8)	3,7	(2,7-5,0)	1724
	55 - 64	9,4	(7,4-11,3)	9,3	(7,6-11,5)	1669
	65 - 74	13,3	(11,1-15,5)	13,3	(11,2-15,7)	1289
	75 +	14,4	(11,8-17,1)	14,6	(12,1-17,5)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	13,4	(10,4-16,4)	5,9	(4,3-8,0)	723
	Lager secundair	9,1	(7,1-11,1)	4,6	(3,5-6,2)	1276
	Hoger secundair	6,2	(5,0-7,4)	4,4	(3,4-5,7)	2889
	Hoger onderwijs	3,6	(2,9-4,3)	2,9	(2,3-3,7)	4681
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	5,5	(4,6-6,3)	3,4	(2,7-4,3)	3638
	Brussels Gewest	5,9	(4,9-6,8)	4,8	(3,9-5,9)	2513
	Waals Gewest	6,6	(5,4-7,7)	4,4	(3,6-5,5)	3599
JAAR	**1997**	2,7	(2,2-3,2)	2,2	(1,8-2,6)	8544
	2001	3,4	(2,9-3,8)	2,2	(1,9-2,6)	9968
	2004	4,1	(3,6-4,7)	2,7	(2,3-3,2)	11127
	2008	4,2	(3,7-4,7)	2,7	(2,3-3,1)	9545
	2013	5,3	(4,7-6,0)	3,4	(2,9-3,9)	9113
	2018	5,9	(5,3-6,5)	3,6	(3,1-4,1)	9750

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B22 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet volgde, België

MA14_3		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	57,0	(49,8-64,3)	57,8	(46,4-68,3)	315
	Vrouwen	61,2	(54,3-68,1)	61,6	(50,8-71,4)	313
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	53,3	(41,9-64,7)	56,4	(14,0-91,1)	9
	25 - 34	57,5	(28,1-86,9)	56,5	(31,2-78,8)	19
	35 - 44	65,3	(40,2-90,4)	64,8	(40,5-83,2)	30
	45 - 54	62,3	(47,5-77,0)	62,3	(46,8-75,6)	66
	55 - 64	62,0	(51,6-72,5)	62,3	(51,5-71,9)	157
	65 - 74	55,7	(46,8-64,6)	56,0	(46,9-64,7)	191
	75 +	57,8	(48,2-67,4)	57,7	(47,5-67,3)	156
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	53,3	(41,8-64,8)	52,5	(36,1-68,4)	107
	Lager secundair	56,2	(45,3-67,1)	55,8	(41,8-69,0)	124
	Hoger secundair	59,1	(50,1-68,0)	59,0	(46,4-70,5)	202
	Hoger onderwijs	63,2	(53,8-72,7)	63,1	(49,9-74,5)	175
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	63,3	(55,9-70,7)	64,3	(52,9-74,3)	222
	Brussels Gewest	57,4	(49,3-65,5)	57,5	(46,9-67,5)	173
	Waals Gewest	53,7	(45,2-62,2)	52,9	(41,0-64,5)	233
JAAR	**2001**	69,3	(63,1-75,6)	72,3	(65,0-78,6)	366
	2008	63,8	(57,6-70,1)	66,6	(59,1-73,4)	469
	2013	57,1	(50,9-63,3)	60,2	(52,6-67,3)	557
	2018	59,1	(54,0-64,2)	61,7	(54,5-68,5)	628

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B23 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden medicamenteus behandeld werd, België

MA14_4		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	94,7	(91,7-97,7)	98,8	(97,9-99,3)	315
	Vrouwen	88,2	(84,0-92,3)	97,8	(96,4-98,6)	313
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	100	(100,0-100,0)	100	(100,0-100,0)	9
	25 - 34	59,1	(47,2-71,0)	63,1	(36,9-83,4)	19
	35 - 44	79,5	(61,7-97,3)	81,5	(62,4-92,1)	30
	45 - 54	95,3	(89,4-100,0)	95,5	(85,3-98,8)	66
	55 - 64	94,5	(90,0-99,0)	94,6	(87,9-97,7)	157
	65 - 74	93,3	(88,3-98,2)	93,3	(86,2-96,9)	191
	75 +	91,3	(86,0-96,5)	91,7	(85,0-95,5)	156
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	92,5	(87,7-97,4)	98,7	(96,2-99,6)	107
	Lager secundair	94,4	(89,7-99,0)	98,8	(97,0-99,6)	124
	Hoger secundair	93,4	(89,4-97,4)	98,7	(97,4-99,4)	202
	Hoger onderwijs	89,5	(83,8-95,3)	98,0	(96,3-98,9)	175
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	91,5	(87,4-95,5)	98,3	(97,2-99,0)	222
	Brussels Gewest	87,3	(81,3-93,3)	97,8	(95,9-98,8)	173
	Waals Gewest	92,7	(88,7-96,6)	98,7	(97,3-99,3)	233
JAAR	**2001**	90,5	(86,7-94,3)	88,4	(82,4-92,5)	370
	2008	91,3	(88,5-94,2)	89,6	(84,2-93,3)	467
	2013	92,8	(89,9-95,8)	91,5	(87,0-94,6)	557
	2018	91,5	(88,8-94,1)	89,8	(85,5-93,0)	628

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B24 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden insuline gebruikte, België

MA14_5		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	32,4	(25,3-39,6)	42,7	(32,8-53,3)	315
	Vrouwen	26,8	(20,2-33,4)	38,5	(28,5-49,7)	313
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	94,2	(83,9-100,0)	93,8	(71,6-98,9)	9
	25 - 34	38,1	(16,9-59,4)	39,1	(18,6-64,4)	19
	35 - 44	25,9	(0,8-51,0)	26,4	(10,2-53,2)	30
	45 - 54	25,1	(10,6-39,6)	25,1	(14,2-40,3)	66
	55 - 64	34,0	(22,1-45,9)	33,7	(23,3-46,0)	157
	65 - 74	27,4	(19,3-35,5)	27,2	(19,7-36,2)	191
	75 +	23,5	(15,2-31,8)	23,5	(16,3-32,7)	156
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	27,2	(16,0-38,3)	42,4	(27,3-59,2)	107
	Lager secundair	25,7	(15,9-35,5)	35,7	(23,1-50,7)	124
	Hoger secundair	35,8	(27,1-44,6)	44,5	(33,1-56,4)	202
	Hoger onderwijs	27,6	(17,6-37,6)	37,0	(25,2-50,7)	175
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	34,4	(26,9-42,0)	45,9	(35,8-56,4)	222
	Brussels Gewest	26,2	(18,7-33,7)	34,2	(23,6-46,6)	173
	Waals Gewest	24,0	(16,6-31,4)	34,7	(24,3-46,8)	233
JAAR	**2001**	40,5	(33,8-47,1)	55,4	(47,2-63,3)	365
	2008	28,8	(23,4-34,1)	42,0	(34,2-50,1)	467
	2013	28,1	(22,9-33,4)	42,0	(34,7-49,7)	557
	2018	29,7	(24,8-34,6)	42,0	(35,3-49,0)	628

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B25 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden orale antidiabetica gebruikte, België

MA14_6		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	82,7	(76,0-89,4)	71,9	(61,3-80,6)	314
	Vrouwen	76,0	(69,9-82,2)	61,3	(49,4-72,0)	313
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	10,8	(0,0-21,8)	16,9	(3,5-53,4)	9
	25 - 34	20,9	(0,0-47,5)	28,8	(10,1-59,2)	19
	35 - 44	70,8	(49,0-92,6)	72,5	(50,2-87,4)	30
	45 - 54	81,3	(69,1-93,5)	81,6	(67,8-90,3)	66
	55 - 64	78,2	(67,4-89,0)	78,0	(65,2-87,0)	157
	65 - 74	88,6	(82,6-94,6)	88,5	(80,8-93,4)	191
	75 +	86,6	(80,2-93,0)	87,0	(79,3-92,1)	155
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	86,0	(78,7-93,4)	68,7	(48,0-83,9)	106
	Lager secundair	81,4	(72,9-90,0)	65,8	(49,7-79,0)	124
	Hoger secundair	79,1	(70,7-87,5)	69,4	(56,2-80,1)	202
	Hoger onderwijs	77,0	(67,4-86,7)	64,0	(48,8-76,8)	175
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	77,6	(70,5-84,6)	59,7	(48,4-70,1)	221
	Brussels Gewest	77,5	(69,9-85,1)	67,3	(51,4-80,0)	173
	Waals Gewest	82,5	(75,7-89,4)	67,8	(53,7-79,3)	233
JAAR	**2001**	69,7	(63,3-76,1)	58,2	(49,5-66,4)	373
	2008	76,7	(72,0-81,4)	66,8	(59,0-73,8)	466
	2013	79,9	(75,0-84,7)	70,7	(63,4-77,1)	556
	2018	79,4	(74,9-84,0)	70,8	(63,8-76,9)	627

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B26 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes volgens de behandeling van de aandoening, België

MA14_7		Geen behandeling	Enkel dieet	Orale antidiabetica	Insuline	N
GESLACHT	**Mannen**	3,5	1,9	62,2	32,4	315
	Vrouwen	6,0	5,9	61,3	26,8	313
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0.0	0.0	5,8	94,2	9
	25 - 34	19,1	21,8	20,9	38,1	19
	35 - 44	14,5	6,0	53,6	25,9	30
	45 - 54	3,8	0,9	70,2	25,1	66
	55 - 64	3,6	1,9	60,5	34,0	157
	65 - 74	1,5	5,2	65,9	27,4	191
	75 +	5,7	3,0	67,8	23,5	156
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	7,5	0.0	65,3	27,2	107
	Lager secundair	3,5	2,2	68,6	25,7	124
	Hoger secundair	3,4	3,2	57,6	35,8	202
	Hoger onderwijs	4,6	5,9	61,9	27,6	175
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	3,9	4,7	57,0	34,4	222
	Brussels Gewest	6,0	6,7	61,1	26,2	173
	Waals Gewest	5,4	1,9	68,7	24,0	233
JAAR	**2001**	2,9	6,9	49,7	40,5	364
	2008	4,5	4,2	62,5	28,8	466
	2013	4,2	2,9	64,7	28,1	557
	2018	4,7	3,8	61,8	29,7	628

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

Tabel B27 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met allergie in de afgelopen 12 maanden, België

MA15_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	17,0	(15,4-18,6)	16,8	(15,3-18,4)	4674
	Vrouwen	20,3	(18,7-21,8)	20,2	(18,7-21,8)	5078
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	21,0	(17,5-24,4)	21,0	(17,7-24,6)	1059
	25 - 34	22,1	(18,8-25,3)	22,0	(18,9-25,5)	1338
	35 - 44	20,1	(17,4-22,8)	20,1	(17,5-22,9)	1578
	45 - 54	18,5	(16,1-21,0)	18,5	(16,2-21,1)	1725
	55 - 64	16,2	(13,9-18,6)	16,2	(13,9-18,7)	1670
	65 - 74	16,5	(13,9-19,2)	16,4	(13,9-19,3)	1289
	75 +	15,1	(12,2-18,1)	14,8	(12,1-17,9)	1093
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	16,4	(12,2-20,6)	17,5	(13,4-22,6)	723
	Lager secundair	14,9	(12,1-17,6)	15,2	(12,6-18,3)	1275
	Hoger secundair	18,7	(16,6-20,9)	18,5	(16,5-20,7)	2892
	Hoger onderwijs	19,9	(18,4-21,5)	19,4	(17,9-21,0)	4681
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	19,5	(17,9-21,1)	19,4	(17,8-21,0)	3639
	Brussels Gewest	17,9	(16,0-19,8)	17,1	(15,3-19,1)	2513
	Waals Gewest	17,6	(15,8-19,4)	17,3	(15,6-19,2)	3600
JAAR	**2001**	13,9	(13,0-14,8)	13,3	(12,4-14,2)	10047
	2004	13,4	(12,4-14,4)	12,8	(11,9-13,8)	11130
	2008	13,3	(12,2-14,3)	12,8	(11,8-13,8)	9517
	2013	14,2	(13,1-15,3)	13,8	(12,7-14,9)	9112
	2018	18,7	(17,6-19,8)	18,3	(17,2-19,4)	9752

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B28 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een maagzweer in de afgelopen 12 maanden, België

MA16_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	3,0	(2,3-3,7)	2,9	(2,2-3,8)	4671
	Vrouwen	4,1	(3,3-5,0)	3,9	(3,2-4,9)	5078
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	1,8	(0,4-3,2)	1,8	(0,9-3,9)	1057
	25 - 34	2,9	(1,3-4,5)	2,9	(1,7-4,9)	1337
	35 - 44	5,0	(3,2-6,7)	4,9	(3,4-7,0)	1578
	45 - 54	3,5	(2,4-4,6)	3,4	(2,5-4,7)	1725
	55 - 64	4,9	(3,3-6,6)	4,9	(3,5-6,8)	1670
	65 - 74	3,5	(2,3-4,6)	3,4	(2,4-4,8)	1289
	75 +	3,3	(1,9-4,6)	3,1	(2,1-4,7)	1093
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	4,0	(2,2-5,7)	4,1	(2,6-6,5)	723
	Lager secundair	5,7	(3,6-7,8)	5,5	(3,7-8,2)	1275
	Hoger secundair	3,8	(2,8-4,9)	3,6	(2,7-4,9)	2891
	Hoger onderwijs	2,8	(2,0-3,5)	2,5	(1,9-3,3)	4680
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	1,8	(1,2-2,3)	1,7	(1,2-2,3)	3636
	Brussels Gewest	3,9	(3,1-4,7)	3,7	(3,0-4,6)	2513
	Waals Gewest	6,5	(5,1-7,9)	6,2	(4,9-7,8)	3600
JAAR	**1997**	3,0	(2,5-3,5)	3,0	(2,5-3,5)	8545
	2001	3,8	(3,4-4,3)	3,5	(3,1-4,0)	10072
	2004	3,3	(2,8-3,7)	3,0	(2,6-3,4)	11112
	2008	3,8	(3,2-4,3)	3,4	(2,9-4,0)	9587
	2013	2,7	(2,3-3,2)	2,4	(2,1-2,9)	9112
	2018	3,6	(3,0-4,2)	3,2	(2,7-3,8)	9749

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B29 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met leverlijden in de afgelopen 12 maanden, België

MA17_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,8	(0,5-1,1)	0,7	(0,5-1,1)	4674
	Vrouwen	1,2	(0,8-1,5)	0,9	(0,7-1,4)	5078
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	1059
	25 - 34	0,2	(0,0-0,4)	0,3	(0,1-0,9)	1338
	35 - 44	0,5	(0,1-1,0)	0,5	(0,2-1,3)	1578
	45 - 54	1,1	(0,5-1,7)	1,1	(0,6-1,9)	1725
	55 - 64	1,8	(1,0-2,6)	1,8	(1,2-2,8)	1670
	65 - 74	1,9	(0,7-3,2)	1,9	(1,0-3,7)	1288
	75 +	1,6	(0,6-2,6)	1,6	(0,9-2,8)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	2,3	(0,4-4,2)	1,6	(0,6-4,2)	723
	Lager secundair	1,7	(0,7-2,8)	1,2	(0,7-2,2)	1276
	Hoger secundair	0,6	(0,3-0,9)	0,5	(0,3-0,9)	2892
	Hoger onderwijs	0,8	(0,5-1,1)	0,8	(0,5-1,2)	4680
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	1,1	(0,7-1,5)	0,1	(0,1-0,2)	3638
	Brussels Gewest	1,1	(0,6-1,5)	0,1	(0,1-0,2)	2513
	Waals Gewest	0,8	(0,4-1,1)	0,1	(0,0-0,1)	3601
JAAR	**2001**	0,9	(0,7-1,2)	0,9	(0,7-1,2)	10056
	2004	0,8	(0,6-1,0)	0,7	(0,6-1,0)	11123
	2008	0,5	(0,4-0,7)	0,5	(0,4-0,7)	9602
	2013	0,6	(0,4-0,8)	0,6	(0,4-0,9)	9111
	2018	1,0	(0,7-1,2)	0,9	(0,7-1,2)	9752

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B30 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met kanker in de afgelopen 12 maanden, België

MA18_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	2,1	(1,5-2,6)	1,4	(1,0-2,0)	4674
	Vrouwen	2,8	(2,1-3,4)	1,7	(1,2-2,3)	5078
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,3	(0,0-0,7)	0,3	(0,1-1,1)	1059
	25 - 34	0,3	(0,0-0,8)	0,4	(0,1-1,2)	1338
	35 - 44	0,9	(0,4-1,4)	0,9	(0,5-1,6)	1578
	45 - 54	2,7	(1,5-3,9)	2,7	(1,7-4,2)	1725
	55 - 64	3,0	(1,9-4,1)	2,9	(2,0-4,2)	1670
	65 - 74	5,1	(3,6-6,5)	5,0	(3,7-6,7)	1289
	75 +	6,3	(4,0-8,6)	6,2	(4,2-9,0)	1093
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	5,9	(3,1-8,7)	2,3	(1,3-4,0)	723
	Lager secundair	2,5	(1,4-3,6)	1,2	(0,7-2,0)	1276
	Hoger secundair	2,5	(1,7-3,3)	1,7	(1,1-2,5)	2891
	Hoger onderwijs	1,9	(1,4-2,4)	1,4	(1,0-2,0)	4681
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	2,6	(2,0-3,3)	1,6	(1,1-2,2)	3638
	Brussels Gewest	1,4	(0,9-1,9)	1,0	(0,7-1,6)	2513
	Waals Gewest	2,5	(1,8-3,1)	1,6	(1,1-2,2)	3601
JAAR	**1997**	1,2	(0,8-1,6)	1,0	(0,7-1,5)	8539
	2001	1,7	(1,3-2,0)	1,1	(0,9-1,4)	10069
	2004	1,2	(0,9-1,4)	0,8	(0,6-1,0)	11086
	2008	2,0	(1,6-2,4)	1,3	(1,1-1,7)	9602
	2013	1,9	(1,5-2,4)	1,3	(1,0-1,6)	9111
	2018	2,4	(2,0-2,9)	1,5	(1,2-1,9)	9752

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B31 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ernstige hoofdpijn zoals migraine in de afgelopen 12 maanden, België

MA19_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	6,9	(5,9-7,9)	6,2	(5,2-7,2)	4674
	Vrouwen	13,4	(12,1-14,8)	12,7	(11,4-14,0)	5077
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	10,0	(7,3-12,7)	9,6	(7,2-12,7)	1059
	25 - 34	12,5	(10,0-15,0)	11,9	(9,7-14,6)	1337
	35 - 44	14,6	(12,0-17,1)	14,1	(11,8-16,7)	1578
	45 - 54	14,1	(11,9-16,4)	13,6	(11,6-15,9)	1724
	55 - 64	7,2	(5,6-8,9)	6,8	(5,4-8,6)	1670
	65 - 74	5,2	(3,4-7,0)	4,8	(3,4-6,8)	1289
	75 +	4,8	(3,2-6,3)	4,2	(3,0-5,8)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	10,4	(7,4-13,5)	13,0	(9,6-17,3)	723
	Lager secundair	9,3	(6,8-11,8)	9,5	(7,2-12,5)	1275
	Hoger secundair	11,8	(10,1-13,5)	10,3	(8,8-12,0)	2892
	Hoger onderwijs	9,4	(8,3-10,6)	7,4	(6,4-8,6)	4680
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	11,2	(9,9-12,4)	9,9	(8,8-11,1)	3638
	Brussels Gewest	9,5	(8,1-11,0)	7,7	(6,5-9,1)	2513
	Waals Gewest	8,9	(7,4-10,4)	7,7	(6,4-9,3)	3600
JAAR	**1997**	11,5	(10,5-12,4)	9,6	(8,7-10,5)	8538
	2001	10,9	(10,1-11,6)	9,3	(8,7-10,1)	10066
	2004	9,3	(8,5-10,1)	7,9	(7,2-8,7)	11117
	2008	9,6	(8,7-10,4)	8,3	(7,5-9,1)	9495
	2013	9,3	(8,4-10,2)	8,1	(7,3-8,9)	9111
	2018	10,2	(9,4-11,1)	9,0	(8,3-9,9)	9751

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B32 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met urinaire incontinentie in de afgelopen 12 maanden, België

MA20_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	3,6	(2,8-4,3)	2,5	(2,0-3,2)	4673
	Vrouwen	6,4	(5,5-7,3)	4,1	(3,3-5,1)	5078
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	1,2	(0,3-2,0)	1,1	(0,6-2,3)	1057
	25 - 34	1,3	(0,3-2,3)	1,3	(0,6-2,8)	1338
	35 - 44	2,7	(1,5-3,9)	2,7	(1,7-4,1)	1578
	45 - 54	3,3	(2,2-4,3)	3,2	(2,3-4,4)	1725
	55 - 64	3,3	(2,4-4,3)	3,2	(2,4-4,3)	1670
	65 - 74	7,5	(5,6-9,3)	7,2	(5,6-9,3)	1289
	75 +	21,4	(18,0-24,8)	20,4	(17,1-24,0)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	17,2	(13,1-21,3)	6,6	(4,5-9,4)	723
	Lager secundair	7,7	(5,6-9,8)	3,7	(2,5-5,4)	1276
	Hoger secundair	4,3	(3,3-5,2)	3,1	(2,4-4,1)	2891
	Hoger onderwijs	3,0	(2,4-3,7)	2,7	(2,1-3,4)	4680
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	5,6	(4,7-6,5)	3,5	(2,8-4,3)	3637
	Brussels Gewest	3,5	(2,7-4,3)	2,6	(2,1-3,4)	2513
	Waals Gewest	4,5	(3,5-5,5)	3,0	(2,2-4,1)	3601
JAAR	**2008**	3,6	(3,1-4,1)	2,1	(1,7-2,5)	9560
	2013	4,2	(3,6-4,8)	2,4	(2,0-2,8)	9112
	2018	5,0	(4,4-5,6)	2,8	(2,3-3,4)	9751

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B33 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met depressie in de afgelopen 12 maanden, België

MA21_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	5,5	(4,6-6,5)	5,2	(4,4-6,3)	4673
	Vrouwen	9,1	(8,0-10,2)	8,6	(7,6-9,7)	5077
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	3,0	(1,7-4,3)	2,9	(1,9-4,5)	1059
	25 - 34	6,6	(4,5-8,7)	6,4	(4,6-8,9)	1338
	35 - 44	8,3	(6,2-10,4)	8,1	(6,3-10,5)	1578
	45 - 54	9,2	(7,5-11,0)	9,1	(7,5-10,9)	1724
	55 - 64	9,2	(7,3-11,2)	9,0	(7,2-11,1)	1669
	65 - 74	5,7	(4,1-7,3)	5,5	(4,1-7,3)	1288
	75 +	8,8	(6,5-11,1)	8,2	(6,2-10,7)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	11,6	(8,2-15,0)	11,3	(8,3-15,2)	723
	Lager secundair	11,3	(8,9-13,6)	10,6	(8,4-13,2)	1276
	Hoger secundair	7,5	(6,1-8,8)	7,0	(5,7-8,5)	2891
	Hoger onderwijs	5,5	(4,5-6,4)	4,9	(4,1-5,7)	4679
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	6,7	(5,7-7,7)	6,1	(5,2-7,1)	3638
	Brussels Gewest	7,7	(6,6-8,9)	7,2	(6,1-8,4)	2513
	Waals Gewest	8,4	(7,0-9,7)	7,7	(6,5-9,2)	3599
JAAR	**1997**	6,5	(5,7-7,2)	6,2	(5,5-7,0)	8545
	2001	6,3	(5,6-6,9)	5,8	(5,2-6,4)	10068
	2004	5,9	(5,2-6,6)	5,4	(4,8-6,1)	11114
	2008	6,0	(5,3-6,7)	5,5	(4,9-6,2)	9527
	2013	6,7	(5,9-7,4)	6,1	(5,4-6,8)	9112
	2018	7,4	(6,6-8,1)	6,8	(6,1-7,5)	9750

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B34 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met schildklierlijden in de afgelopen 12 maanden, België

MA22_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	2,8	(2,1-3,5)	2,6	(1,9-3,5)	4672
	Vrouwen	11,0	(9,9-12,1)	10,1	(9,0-11,3)	5075
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	2,9	(1,2-4,7)	2,4	(1,3-4,6)	1056
	25 - 34	4,0	(2,5-5,6)	3,3	(2,2-5,0)	1337
	35 - 44	5,6	(4,2-7,0)	4,7	(3,5-6,2)	1576
	45 - 54	6,8	(5,3-8,3)	5,7	(4,5-7,2)	1725
	55 - 64	8,4	(6,8-10,0)	6,9	(5,6-8,6)	1670
	65 - 74	12,2	(9,8-14,5)	10,1	(8,1-12,5)	1289
	75 +	11,5	(9,0-14,0)	8,7	(6,8-11,0)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	9,9	(6,9-12,8)	5,7	(3,8-8,5)	723
	Lager secundair	7,9	(5,6-10,3)	4,9	(3,3-7,3)	1274
	Hoger secundair	6,8	(5,7-8,0)	5,4	(4,4-6,5)	2890
	Hoger onderwijs	6,4	(5,5-7,4)	5,2	(4,3-6,3)	4679
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	4,7	(4,0-5,5)	3,3	(2,7-4,1)	3636
	Brussels Gewest	7,0	(5,9-8,1)	5,7	(4,7-6,8)	2513
	Waals Gewest	10,9	(9,4-12,5)	8,4	(6,8-10,4)	3598
JAAR	**1997**	3,1	(2,5-3,7)	2,4	(2,0-3,0)	8539
	2001	4,1	(3,6-4,7)	2,9	(2,5-3,4)	10072
	2004	4,3	(3,8-4,8)	3,0	(2,7-3,5)	11122
	2008	4,4	(3,9-5,0)	3,1	(2,7-3,6)	9581
	2013	5,8	(5,2-6,5)	4,1	(3,6-4,6)	9110
	2018	7,0	(6,3-7,7)	5,0	(4,4-5,6)	9747

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B35 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met cataract in de afgelopen 12 maanden, België

MA2301_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	2,8	(2,2-3,5)	1,1	(0,7-1,6)	4672
	Vrouwen	4,1	(3,3-4,8)	1,2	(0,8-1,8)	5079
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	1059
	25 - 34	0,0	.	.	.	1338
	35 - 44	0,2	(0,0-0,4)	0,2	(0,1-0,7)	1578
	45 - 54	0,6	(0,2-0,9)	0,6	(0,3-1,1)	1725
	55 - 64	3,3	(1,8-4,7)	3,3	(2,1-5,0)	1670
	65 - 74	9,4	(7,1-11,6)	9,3	(7,3-11,8)	1289
	75 +	16,2	(13,3-19,1)	16,0	(13,3-19,1)	1092
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	7,5	(4,9-10,1)	0,9	(0,5-1,7)	721
	Lager secundair	5,2	(3,6-6,9)	0,9	(0,6-1,6)	1276
	Hoger secundair	3,3	(2,4-4,2)	1,1	(0,7-1,7)	2892
	Hoger onderwijs	2,5	(1,9-3,2)	1,2	(0,8-1,9)	4681
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	3,7	(3,0-4,5)	0,0	(0,0-0,0)	3638
	Brussels Gewest	2,4	(1,8-3,0)	0,0	(0,0-0,0)	2512
	Waals Gewest	3,3	(2,4-4,2)	0,0	(0,0-0,0)	3601
JAAR	**1997**	1,3	(1,0-1,6)	0,8	(0,6-1,1)	8542
	2001	2,0	(1,7-2,4)	0,9	(0,7-1,1)	10064
	2004	2,3	(2,0-2,7)	1,0	(0,8-1,2)	11105
	2008	2,8	(2,4-3,2)	1,1	(0,9-1,3)	9564
	2013	3,0	(2,5-3,5)	1,2	(0,9-1,5)	9112
	2018	3,5	(3,0-4,0)	1,3	(1,0-1,6)	9751

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B36 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met glaucoom in de afgelopen 12 maanden, België

MA2302_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,2	(0,8-1,6)	0,9	(0,6-1,5)	4672
	Vrouwen	1,4	(1,0-1,7)	0,9	(0,6-1,3)	5079
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	1059
	25 - 34	0,1	(0,0-0,3)	0,2	(0,1-0,9)	1338
	35 - 44	0,4	(0,0-0,8)	0,4	(0,2-1,1)	1578
	45 - 54	1,0	(0,4-1,6)	1,0	(0,5-1,8)	1725
	55 - 64	1,9	(0,9-2,9)	1,9	(1,1-3,2)	1670
	65 - 74	2,1	(1,1-3,1)	2,1	(1,3-3,3)	1289
	75 +	4,6	(3,0-6,2)	4,6	(3,3-6,4)	1092
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	2,0	(0,8-3,2)	0,6	(0,3-1,4)	721
	Lager secundair	1,5	(0,7-2,3)	0,6	(0,3-1,2)	1276
	Hoger secundair	1,0	(0,6-1,4)	0,7	(0,4-1,0)	2892
	Hoger onderwijs	1,3	(0,9-1,8)	1,2	(0,7-1,9)	4681
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	1,3	(0,9-1,7)	0,1	(0,1-0,1)	3638
	Brussels Gewest	1,4	(0,9-1,9)	0,1	(0,1-0,2)	2512
	Waals Gewest	1,3	(0,8-1,8)	0,1	(0,1-0,2)	3601
JAAR	**1997**	1,3	(1,0-1,7)	1,2	(0,9-1,7)	8542
	2001	2,2	(1,8-2,7)	1,6	(1,3-2,1)	10058
	2004	2,3	(1,9-2,7)	1,6	(1,3-2,0)	11100
	2008	1,8	(1,4-2,1)	1,2	(1,0-1,5)	9567
	2013	1,0	(0,7-1,2)	0,7	(0,5-0,9)	9112
	2018	1,3	(1,0-1,6)	0,9	(0,7-1,1)	9751

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B37 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met maculadegeneratie in de afgelopen 12 maanden, België

MA2303_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,4	(0,2-0,6)	0,4	(0,2-0,7)	4672
	Vrouwen	0,6	(0,3-0,8)	0,4	(0,2-0,7)	5079
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	1059
	25 - 34	0,0	.	.	.	1338
	35 - 44	0,3	(0,0-0,6)	0,3	(0,1-0,9)	1578
	45 - 54	0,1	(0,0-0,3)	0,2	(0,0-0,6)	1725
	55 - 64	0,3	(0,0-0,8)	0,3	(0,1-1,2)	1670
	65 - 74	0,7	(0,2-1,2)	0,7	(0,3-1,5)	1289
	75 +	2,7	(1,6-3,8)	2,7	(1,8-4,0)	1092
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	0,8	(0,1-1,5)	0,2	(0,1-0,6)	721
	Lager secundair	1,1	(0,3-1,8)	0,4	(0,2-1,0)	1276
	Hoger secundair	0,3	(0,1-0,5)	0,2	(0,1-0,4)	2892
	Hoger onderwijs	0,4	(0,2-0,5)	0,4	(0,2-0,8)	4681
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	0,4	(0,2-0,6)	0,0	(0,0-0,0)	3638
	Brussels Gewest	0,7	(0,4-1,1)	0,0	(0,0-0,0)	2512
	Waals Gewest	0,6	(0,3-0,9)	0,0	(0,0-0,0)	3601
JAAR	**2013**	0,6	(0,4-0,8)	0,5	(0,3-0,8)	9112
	2018	0,5	(0,3-0,6)	0,4	(0,3-0,6)	9751

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B38 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetische retinopathie in de afgelopen 12 maanden, België

MA2304_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,0	(0,0-0,1)	0,3	(0,1-0,5)	4672
	Vrouwen	0,2	(0,0-0,5)	0,3	(0,1-0,7)	5079
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	1059
	25 - 34	0,0	.	.	.	1338
	35 - 44	0,0	.	.	.	1578
	45 - 54	0,0	.	.	.	1725
	55 - 64	0,4	(0,0-1,3)	0,5	(0,1-2,6)	1670
	65 - 74	0,1	(0,0-0,3)	0,2	(0,1-0,7)	1289
	75 +	0,2	(0,0-0,5)	0,4	(0,1-1,2)	1092
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	0,0	.	.	.	721
	Lager secundair	0,1	(0,0-0,2)	0,1	(0,0-0,5)	1276
	Hoger secundair	0,3	(0,0-0,7)	0,3	(0,1-1,0)	2892
	Hoger onderwijs	0,0	(0,0-0,0)	0,3	(0,1-0,7)	4681
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	0,0	.	.	.	3638
	Brussels Gewest	0,1	(0,0-0,2)	0,0	(0,0-0,0)	2512
	Waals Gewest	0,3	(0,0-0,7)	0,0	(0,0-0,0)	3601
JAAR	**2013**	0,1	(0,1-0,2)	0,3	(0,2-0,5)	9112
	2018	0,1	(0,0-0,2)	0,3	(0,1-0,5)	9751

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B39 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ziekte van Parkinson in de afgelopen 12 maanden, België

MA24_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,5	(0,3-0,8)	0,4	(0,2-0,7)	4672
	Vrouwen	0,4	(0,2-0,6)	0,2	(0,1-0,5)	5077
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	1059
	25 - 34	0,0	.	.	.	1338
	35 - 44	0,0	.	.	.	1575
	45 - 54	0,0	(0,0-0,0)	0,1	(0,0-0,3)	1725
	55 - 64	0,2	(0,0-0,4)	0,2	(0,1-0,5)	1670
	65 - 74	1,4	(0,6-2,2)	1,3	(0,7-2,5)	1288
	75 +	2,6	(1,4-3,9)	2,7	(1,7-4,2)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	1,7	(0,3-3,0)	0,4	(0,2-1,1)	723
	Lager secundair	0,8	(0,3-1,2)	0,3	(0,1-0,6)	1275
	Hoger secundair	0,4	(0,1-0,7)	0,2	(0,1-0,5)	2889
	Hoger onderwijs	0,3	(0,1-0,4)	0,4	(0,2-0,7)	4681
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	0,6	(0,3-0,8)	0,0	(0,0-0,0)	3635
	Brussels Gewest	0,4	(0,2-0,5)	0,0	(0,0-0,0)	2513
	Waals Gewest	0,4	(0,2-0,6)	0,0	(0,0-0,0)	3601
JAAR	**1997**	0,3	(0,2-0,5)	0,4	(0,3-0,7)	8544
	2001	0,4	(0,2-0,5)	0,4	(0,2-0,6)	10061
	2004	0,3	(0,2-0,4)	0,4	(0,2-0,6)	11109
	2008	0,4	(0,3-0,6)	0,3	(0,2-0,5)	9601
	2013	0,5	(0,3-0,7)	0,4	(0,3-0,7)	9112
	2018	0,5	(0,3-0,6)	0,4	(0,3-0,6)	9749

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B40 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met epilepsie in de afgelopen 12 maanden, België

MA25_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,0	(0,6-1,4)	0,9	(0,6-1,4)	4674
	Vrouwen	0,8	(0,5-1,1)	0,7	(0,5-1,1)	5079
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,4	(0,1-0,8)	0,4	(0,2-1,0)	1059
	25 - 34	0,6	(0,0-1,1)	0,6	(0,2-1,5)	1338
	35 - 44	1,2	(0,5-2,0)	1,2	(0,7-2,3)	1578
	45 - 54	1,0	(0,4-1,6)	1,0	(0,5-1,8)	1725
	55 - 64	0,9	(0,3-1,6)	0,9	(0,5-1,8)	1670
	65 - 74	1,1	(0,3-2,0)	1,1	(0,5-2,5)	1289
	75 +	0,9	(0,3-1,6)	0,9	(0,5-1,9)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	3,1	(0,9-5,3)	3,3	(1,5-7,0)	723
	Lager secundair	0,8	(0,3-1,3)	0,8	(0,4-1,6)	1276
	Hoger secundair	0,7	(0,4-1,0)	0,6	(0,4-1,0)	2892
	Hoger onderwijs	0,7	(0,4-1,0)	0,6	(0,4-1,0)	4681
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	0,8	(0,4-1,1)	0,7	(0,5-1,1)	3639
	Brussels Gewest	0,9	(0,5-1,4)	0,9	(0,5-1,5)	2513
	Waals Gewest	1,0	(0,6-1,5)	1,0	(0,6-1,5)	3601
JAAR	**1997**	0,6	(0,3-0,9)	0,7	(0,4-1,2)	8541
	2001	0,7	(0,5-0,9)	0,7	(0,5-0,9)	10065
	2004	0,8	(0,6-1,0)	0,8	(0,6-1,0)	11120
	2008	0,7	(0,5-1,0)	0,7	(0,5-1,0)	9610
	2013	0,9	(0,6-1,2)	0,9	(0,7-1,2)	9112
	2018	0,9	(0,6-1,1)	0,9	(0,7-1,2)	9753

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B41 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met langdurige vermoeidheid in de afgelopen 12 maanden, België

MA26_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	6,5	(5,4-7,5)	6,2	(5,2-7,4)	4672
	Vrouwen	9,8	(8,6-11,0)	9,4	(8,2-10,7)	5077
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	4,0	(2,3-5,8)	4,0	(2,6-6,1)	1058
	25 - 34	6,7	(4,6-8,9)	6,6	(4,8-9,1)	1338
	35 - 44	8,2	(6,2-10,3)	8,1	(6,3-10,4)	1578
	45 - 54	11,7	(9,4-13,9)	11,5	(9,5-13,9)	1724
	55 - 64	8,7	(6,9-10,4)	8,5	(6,9-10,5)	1669
	65 - 74	7,6	(5,8-9,4)	7,4	(5,8-9,4)	1289
	75 +	9,8	(7,2-12,4)	9,3	(7,0-12,2)	1093
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	10,4	(6,9-13,9)	9,7	(6,8-13,6)	723
	Lager secundair	9,4	(7,3-11,6)	8,8	(6,8-11,2)	1276
	Hoger secundair	8,9	(7,3-10,4)	8,5	(7,0-10,3)	2891
	Hoger onderwijs	6,8	(5,8-7,9)	6,4	(5,5-7,5)	4678
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	8,0	(6,9-9,2)	7,5	(6,5-8,7)	3638
	Brussels Gewest	7,1	(6,0-8,2)	6,8	(5,8-8,0)	2513
	Waals Gewest	8,7	(7,2-10,2)	8,2	(6,8-9,9)	3598
JAAR	**2001**	5,2	(4,6-5,7)	4,7	(4,2-5,3)	10063
	2004	4,8	(4,3-5,4)	4,4	(3,9-4,9)	11113
	2008	4,0	(3,4-4,5)	3,6	(3,1-4,1)	9545
	2013	5,0	(4,4-5,6)	4,4	(3,9-5,0)	9111
	2018	8,2	(7,4-9,0)	7,4	(6,6-8,3)	9749

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B42 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met osteoporose in de afgelopen 12 maanden, België

MA27_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,8	(0,5-1,1)	0,4	(0,2-0,7)	4674
	Vrouwen	5,7	(4,9-6,6)	2,4	(1,7-3,3)	5076
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	1059
	25 - 34	0,0	(0,0-0,1)	0,1	(0,0-0,5)	1338
	35 - 44	0,6	(0,1-1,1)	0,4	(0,2-1,1)	1578
	45 - 54	1,4	(0,6-2,3)	1,0	(0,5-1,9)	1725
	55 - 64	5,1	(3,7-6,5)	3,7	(2,8-5,0)	1668
	65 - 74	8,8	(6,6-10,9)	6,3	(4,9-8,2)	1289
	75 +	10,8	(8,4-13,3)	7,2	(5,4-9,5)	1093
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	6,5	(4,1-8,9)	1,0	(0,5-1,9)	722
	Lager secundair	6,0	(4,3-7,7)	1,2	(0,7-1,9)	1276
	Hoger secundair	2,9	(2,1-3,7)	0,9	(0,6-1,4)	2891
	Hoger onderwijs	2,4	(1,9-3,0)	1,0	(0,6-1,6)	4680
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	3,8	(3,1-4,5)	0,1	(0,1-0,2)	3638
	Brussels Gewest	2,8	(2,1-3,5)	0,1	(0,1-0,2)	2513
	Waals Gewest	2,7	(2,0-3,4)	0,1	(0,1-0,1)	3599
JAAR	**1997**	2,8	(2,3-3,3)	1,4	(1,0-1,8)	8545
	2001	4,3	(3,7-4,9)	1,6	(1,3-2,0)	10071
	2004	3,9	(3,5-4,4)	1,4	(1,2-1,7)	11067
	2008	4,7	(4,2-5,3)	1,7	(1,4-2,1)	9508
	2013	4,1	(3,6-4,7)	1,4	(1,1-1,7)	9099
	2018	3,3	(2,9-3,8)	1,1	(0,9-1,3)	9750

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B43 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met gebroken heup in de afgelopen 12 maanden, België

MA28_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,4	(0,1-0,8)	0,3	(0,2-0,6)	4674
	Vrouwen	0,6	(0,4-0,9)	0,3	(0,2-0,6)	5079
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	1059
	25 - 34	0,1	(0,0-0,3)	0,3	(0,1-0,9)	1338
	35 - 44	0,1	(0,0-0,3)	0,1	(0,0-0,4)	1578
	45 - 54	0,1	(0,0-0,1)	0,1	(0,0-0,3)	1725
	55 - 64	0,1	(0,0-0,2)	0,2	(0,1-0,5)	1670
	65 - 74	1,7	(0,4-3,0)	1,7	(0,8-3,6)	1289
	75 +	2,6	(1,4-3,8)	2,6	(1,6-4,2)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	1,9	(0,5-3,3)	0,5	(0,2-1,1)	723
	Lager secundair	0,9	(0,3-1,6)	0,3	(0,1-0,7)	1276
	Hoger secundair	0,3	(0,0-0,5)	0,1	(0,1-0,4)	2892
	Hoger onderwijs	0,4	(0,1-0,7)	0,4	(0,2-0,8)	4681
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	0,4	(0,2-0,7)	0,0	(0,0-0,0)	3639
	Brussels Gewest	0,3	(0,1-0,5)	0,0	(0,0-0,0)	2513
	Waals Gewest	0,7	(0,2-1,2)	0,0	(0,0-0,1)	3601
JAAR	**2001**	0,5	(0,4-0,7)	0,4	(0,3-0,6)	10070
	2004	0,4	(0,3-0,6)	0,4	(0,2-0,5)	11115
	2008	0,4	(0,3-0,5)	0,3	(0,2-0,4)	9604
	2013	0,6	(0,4-0,8)	0,5	(0,3-0,7)	9112
	2018	0,5	(0,3-0,7)	0,4	(0,3-0,6)	9753

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B44 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met darmziekte, langer dan 3 maanden in de afgelopen 12 maanden, België

MA29_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	3,2	(2,4-3,9)	3,0	(2,4-3,8)	4673
	Vrouwen	6,1	(5,2-7,1)	5,7	(4,8-6,7)	5077
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	3,4	(1,9-5,0)	3,3	(2,1-5,2)	1057
	25 - 34	2,6	(1,2-4,0)	2,5	(1,5-4,2)	1338
	35 - 44	3,0	(2,0-4,0)	2,9	(2,0-4,0)	1578
	45 - 54	4,6	(3,2-6,1)	4,5	(3,3-6,0)	1724
	55 - 64	5,9	(4,2-7,6)	5,6	(4,2-7,5)	1670
	65 - 74	5,8	(4,1-7,6)	5,5	(4,1-7,5)	1289
	75 +	8,8	(6,4-11,3)	8,0	(5,9-10,8)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	10,2	(6,7-13,7)	7,3	(4,9-10,8)	723
	Lager secundair	5,0	(3,2-6,8)	3,9	(2,7-5,6)	1276
	Hoger secundair	4,7	(3,6-5,9)	4,4	(3,4-5,7)	2891
	Hoger onderwijs	3,7	(3,0-4,5)	3,6	(3,0-4,4)	4679
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	5,4	(4,5-6,3)	4,8	(4,0-5,8)	3637
	Brussels Gewest	2,8	(2,2-3,5)	2,7	(2,1-3,5)	2513
	Waals Gewest	4,0	(3,1-5,0)	3,6	(2,8-4,6)	3600
JAAR	**1997**	3,5	(3,0-4,1)	3,6	(3,1-4,2)	8543
	2001	3,5	(2,9-4,0)	3,2	(2,8-3,8)	10054
	2004	3,2	(2,8-3,6)	2,9	(2,6-3,4)	11124
	2008	3,1	(2,6-3,5)	2,8	(2,4-3,2)	9601
	2013	2,8	(2,4-3,3)	2,5	(2,1-3,0)	9112
	2018	4,7	(4,1-5,3)	4,2	(3,7-4,8)	9750

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B45 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met nierstenen in de afgelopen 12 maanden, België

MA30_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,2	(0,8-1,5)	1,0	(0,7-1,5)	4673
	Vrouwen	0,7	(0,4-1,0)	0,6	(0,4-0,9)	5077
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,1	(0,0-0,3)	0,2	(0,1-0,7)	1057
	25 - 34	0,5	(0,0-1,0)	0,5	(0,2-1,3)	1338
	35 - 44	0,8	(0,3-1,3)	0,8	(0,4-1,5)	1578
	45 - 54	1,6	(0,8-2,5)	1,6	(0,9-2,7)	1724
	55 - 64	1,0	(0,4-1,6)	0,9	(0,5-1,7)	1670
	65 - 74	0,8	(0,2-1,4)	0,8	(0,4-1,6)	1289
	75 +	1,5	(0,6-2,4)	1,6	(0,9-2,8)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	0,7	(0,0-1,6)	0,5	(0,1-1,8)	723
	Lager secundair	0,4	(0,0-0,8)	0,3	(0,1-0,8)	1276
	Hoger secundair	1,1	(0,6-1,5)	0,9	(0,5-1,4)	2891
	Hoger onderwijs	0,9	(0,6-1,3)	0,8	(0,6-1,2)	4679
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	0,8	(0,5-1,1)	0,5	(0,3-0,9)	3637
	Brussels Gewest	0,6	(0,3-0,9)	0,5	(0,3-0,9)	2512
	Waals Gewest	1,2	(0,7-1,7)	0,9	(0,6-1,5)	3601
JAAR	**1997**	1,0	(0,7-1,3)	0,9	(0,7-1,2)	8544
	2001	0,9	(0,7-1,2)	0,8	(0,6-1,1)	10049
	2004	1,1	(0,8-1,4)	1,0	(0,8-1,3)	11121
	2008	0,7	(0,5-0,9)	0,6	(0,5-0,8)	9597
	2013	0,8	(0,5-1,0)	0,7	(0,5-0,9)	9112
	2018	0,9	(0,7-1,2)	0,8	(0,6-1,0)	9750

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B46 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ernstige nierziekte behalve nierstenen in de afgelopen 12 maanden, België

MA31_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,6	(0,4-0,9)	0,6	(0,4-0,9)	4674
	Vrouwen	1,3	(0,9-1,6)	1,0	(0,7-1,5)	5078
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,2	(0,0-0,5)	0,4	(0,2-1,3)	1059
	25 - 34	0,8	(0,2-1,4)	0,8	(0,4-1,6)	1338
	35 - 44	0,6	(0,2-1,0)	0,6	(0,3-1,2)	1578
	45 - 54	1,3	(0,6-2,0)	1,3	(0,8-2,1)	1724
	55 - 64	0,3	(0,0-0,6)	0,3	(0,1-0,8)	1670
	65 - 74	1,8	(0,9-2,8)	1,7	(1,0-2,9)	1289
	75 +	2,2	(1,1-3,2)	2,0	(1,1-3,3)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	2,0	(0,8-3,1)	1,2	(0,6-2,2)	723
	Lager secundair	0,8	(0,2-1,3)	0,5	(0,2-1,0)	1276
	Hoger secundair	1,1	(0,6-1,5)	0,9	(0,5-1,4)	2892
	Hoger onderwijs	0,8	(0,5-1,1)	0,8	(0,5-1,1)	4680
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	0,7	(0,4-1,0)	0,5	(0,3-0,8)	3639
	Brussels Gewest	1,1	(0,6-1,5)	0,8	(0,5-1,3)	2512
	Waals Gewest	1,4	(0,9-1,9)	1,1	(0,7-1,5)	3601
JAAR	**1997**	0,8	(0,5-1,1)	0,9	(0,6-1,2)	8540
	2001	0,7	(0,4-0,9)	0,6	(0,4-0,8)	10050
	2004	0,6	(0,4-0,9)	0,6	(0,4-0,8)	11122
	2008	0,7	(0,5-0,9)	0,7	(0,5-0,9)	9603
	2013	1,0	(0,7-1,2)	0,8	(0,6-1,1)	9111
	2018	1,0	(0,7-1,2)	0,9	(0,7-1,1)	9752

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B47 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met chronische blaasontsteking in de afgelopen 12 maanden, België

MA32_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,0	(0,6-1,4)	0,9	(0,6-1,3)	4673
	Vrouwen	3,2	(2,6-3,8)	2,7	(2,1-3,5)	5078
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	1,5	(0,5-2,5)	1,3	(0,7-2,5)	1057
	25 - 34	1,6	(0,5-2,7)	1,4	(0,7-2,8)	1338
	35 - 44	1,0	(0,5-1,6)	0,9	(0,5-1,5)	1578
	45 - 54	1,6	(0,9-2,3)	1,4	(0,9-2,2)	1725
	55 - 64	1,5	(0,9-2,1)	1,3	(0,8-2,0)	1670
	65 - 74	2,7	(1,6-3,9)	2,3	(1,5-3,6)	1289
	75 +	6,3	(4,2-8,4)	5,1	(3,3-7,8)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	3,6	(1,3-5,9)	1,7	(0,8-3,4)	723
	Lager secundair	3,3	(1,9-4,7)	1,9	(1,2-3,1)	1276
	Hoger secundair	2,4	(1,7-3,2)	2,0	(1,4-2,7)	2891
	Hoger onderwijs	1,3	(0,9-1,6)	1,1	(0,8-1,5)	4680
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	2,4	(1,8-2,9)	1,7	(1,3-2,3)	3637
	Brussels Gewest	2,0	(1,4-2,6)	1,6	(1,2-2,2)	2513
	Waals Gewest	1,8	(1,2-2,4)	1,3	(1,0-1,9)	3601
JAAR	**1997**	1,9	(1,5-2,3)	1,8	(1,5-2,2)	8543
	2001	1,9	(1,6-2,2)	1,6	(1,3-1,9)	10049
	2004	2,1	(1,8-2,4)	1,8	(1,5-2,1)	11118
	2008	1,4	(1,1-1,7)	1,1	(0,9-1,4)	9601
	2013	1,7	(1,4-2,1)	1,4	(1,1-1,7)	9112
	2018	2,1	(1,7-2,5)	1,7	(1,4-2,0)	9751

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B48 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ernstige of chronische huidaandoening in de afgelopen 12 maanden, België

MA33_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	3,3	(2,6-4,0)	3,3	(2,7-4,0)	4674
	Vrouwen	4,5	(3,6-5,4)	4,4	(3,6-5,4)	5078
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	3,1	(1,6-4,6)	3,1	(1,9-5,0)	1059
	25 - 34	3,8	(2,2-5,5)	3,8	(2,5-5,8)	1338
	35 - 44	3,5	(2,3-4,6)	3,4	(2,4-4,8)	1578
	45 - 54	4,0	(2,6-5,3)	4,0	(2,8-5,5)	1724
	55 - 64	3,7	(2,3-5,0)	3,6	(2,5-5,2)	1670
	65 - 74	4,8	(3,3-6,2)	4,7	(3,5-6,3)	1289
	75 +	5,1	(3,4-6,7)	4,9	(3,5-6,8)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	3,7	(1,9-5,4)	3,1	(1,9-5,0)	723
	Lager secundair	3,0	(1,8-4,3)	2,7	(1,8-4,0)	1276
	Hoger secundair	3,8	(2,8-4,8)	3,7	(2,9-4,9)	2892
	Hoger onderwijs	4,2	(3,4-5,1)	4,3	(3,5-5,2)	4680
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	4,2	(3,5-5,0)	4,1	(3,4-4,9)	3639
	Brussels Gewest	3,3	(2,6-4,1)	3,3	(2,6-4,2)	2513
	Waals Gewest	3,6	(2,6-4,6)	3,5	(2,6-4,6)	3600
JAAR	**1997**	3,5	(2,9-4,1)	3,6	(3,0-4,2)	8538
	2001	3,5	(3,1-4,0)	3,5	(3,1-4,0)	10059
	2004	3,7	(3,1-4,2)	3,6	(3,1-4,2)	11112
	2008	2,9	(2,3-3,4)	2,8	(2,4-3,4)	9603
	2013	2,8	(2,4-3,3)	2,8	(2,4-3,3)	9112
	2018	3,9	(3,4-4,5)	3,9	(3,4-4,5)	9752

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B49 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met galstenen of galblaasontsteking in de afgelopen 12 maanden, België

MA34_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,6	(0,3-0,9)	0,5	(0,3-0,9)	4673
	Vrouwen	1,5	(1,1-1,9)	1,3	(0,9-1,8)	5078
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,5	(0,0-1,3)	0,7	(0,3-2,1)	1057
	25 - 34	0,3	(0,0-0,6)	0,3	(0,1-0,8)	1338
	35 - 44	0,9	(0,2-1,5)	0,8	(0,4-1,7)	1578
	45 - 54	1,4	(0,8-2,1)	1,3	(0,8-2,1)	1725
	55 - 64	0,5	(0,1-0,9)	0,5	(0,2-1,0)	1670
	65 - 74	2,2	(1,0-3,4)	2,0	(1,1-3,6)	1289
	75 +	2,0	(0,9-3,1)	1,7	(0,9-3,1)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	1,6	(0,0-3,4)	1,0	(0,3-3,3)	723
	Lager secundair	1,2	(0,4-2,0)	0,8	(0,4-1,7)	1276
	Hoger secundair	1,2	(0,7-1,7)	0,9	(0,6-1,5)	2891
	Hoger onderwijs	0,9	(0,5-1,2)	0,8	(0,5-1,2)	4680
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	1,3	(0,8-1,7)	0,9	(0,6-1,4)	3637
	Brussels Gewest	0,7	(0,4-1,1)	0,6	(0,4-1,0)	2513
	Waals Gewest	0,8	(0,4-1,1)	0,6	(0,4-0,9)	3601
JAAR	**1997**	0,8	(0,5-1,0)	0,8	(0,6-1,2)	8543
	2001	0,9	(0,7-1,2)	0,8	(0,6-1,0)	10071
	2004	1,0	(0,8-1,2)	0,8	(0,6-1,0)	11100
	2008	0,6	(0,5-0,8)	0,5	(0,4-0,7)	9586
	2013	0,7	(0,5-1,0)	0,5	(0,4-0,8)	9110
	2018	1,1	(0,8-1,3)	0,8	(0,6-1,1)	9751

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B50 Percentage van de mannelijke bevolking van 15 jaar en ouder met prostaatklachten in de afgelopen 12 maanden, België

MA35_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
LEEFTIJDSGROEP						
	15 - 24	0,0	.	.	.	514
	25 - 34	0,0	.	.	.	618
	35 - 44	0,7	(0,0-1,5)	1,0	(0,4-2,4)	768
	45 - 54	1,4	(0,5-2,3)	1,4	(0,7-2,6)	846
	55 - 64	5,3	(3,4-7,1)	5,3	(3,7-7,4)	830
	65 - 74	12,9	(9,6-16,2)	12,9	(9,9-16,6)	621
	75 +	26,1	(20,7-31,6)	26,1	(21,1-31,9)	469
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	10,9	(5,4-16,3)	2,0	(1,0-3,6)	333
	Lager secundair	7,9	(5,2-10,7)	2,1	(1,3-3,6)	572
	Hoger secundair	4,0	(2,9-5,1)	1,7	(1,1-2,5)	1440
	Hoger onderwijs	4,1	(3,2-5,1)	2,4	(1,7-3,4)	2236
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	5,2	(4,1-6,3)	2,0	(1,4-2,8)	1766
	Brussels Gewest	4,2	(3,1-5,3)	2,5	(1,7-3,6)	1168
	Waals Gewest	4,7	(3,4-5,9)	2,1	(1,4-3,1)	1732
JAAR	**2001**	4,2	(3,6-4,9)	2,0	(1,7-2,5)	4876
	2004	4,4	(3,8-5,1)	2,2	(1,7-2,7)	5066
	2008	3,8	(3,1-4,6)	1,8	(1,4-2,3)	4352
	2013	4,3	(3,5-5,1)	1,9	(1,5-2,4)	4343
	2018	4,9	(4,2-5,7)	2,1	(1,7-2,6)	4666

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B51 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met astma in de afgelopen 12 maanden, België

MA01_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	4,1	(2,7-5,5)	4,1	(2,9-5,7)	1092
	Vrouwen	6,9	(5,0-8,7)	6,8	(5,2-8,9)	1291
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	5,3	(3,9-6,7)	5,2	(3,9-6,8)	1289
	75 +	6,1	(4,1-8,2)	5,8	(4,2-8,0)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	8,1	(5,0-11,2)	7,6	(5,1-11,3)	382
	Lager secundair	5,9	(2,5-9,2)	5,5	(3,2-9,4)	507
	Hoger secundair	5,0	(3,0-7,0)	4,8	(3,2-7,3)	621
	Hoger onderwijs	5,1	(3,3-6,8)	5,0	(3,6-7,1)	818
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	4,5	(2,9-6,1)	4,4	(3,1-6,2)	980
	Brussels Gewest	9,9	(7,1-12,7)	9,5	(7,1-12,7)	503
	Waals Gewest	6,9	(4,8-9,0)	6,6	(4,8-9,0)	900
JAAR	**2001**	7,3	(5,8-8,7)	7,3	(5,9-8,9)	2116
	2004	6,3	(5,1-7,5)	6,3	(5,2-7,7)	3477
	2008	5,6	(4,1-7,1)	5,6	(4,3-7,3)	2838
	2013	3,9	(2,9-5,0)	3,9	(3,0-5,1)	2026
	2018	5,7	(4,5-6,9)	5,7	(4,6-7,0)	2383

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B52 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met chronisch longlijden in de afgelopen 12 maanden, België

MA02_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	7,7	(5,5-9,9)	7,6	(5,7-10,1)	1091
	Vrouwen	8,5	(6,4-10,5)	8,2	(6,4-10,4)	1290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	6,5	(4,7-8,4)	6,6	(4,9-8,6)	1287
	75 +	9,8	(7,3-12,3)	9,8	(7,6-12,6)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	14,1	(9,0-19,2)	13,2	(9,2-18,7)	382
	Lager secundair	10,4	(6,6-14,1)	10,1	(7,0-14,4)	507
	Hoger secundair	5,8	(3,4-8,2)	5,8	(3,8-8,7)	620
	Hoger onderwijs	5,8	(3,7-7,8)	5,9	(4,1-8,4)	817
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	6,7	(4,7-8,7)	6,5	(4,8-8,8)	979
	Brussels Gewest	6,8	(4,5-9,0)	6,5	(4,7-9,1)	502
	Waals Gewest	11,2	(8,3-14,0)	11,0	(8,5-14,1)	900
JAAR	**2001**	12,0	(10,1-13,8)	11,9	(10,2-13,9)	2114
	2004	11,5	(9,9-13,2)	11,6	(10,0-13,3)	3482
	2008	8,7	(7,3-10,2)	8,6	(7,2-10,2)	2825
	2013	8,0	(6,4-9,6)	7,8	(6,4-9,5)	2026
	2018	8,1	(6,6-9,6)	7,9	(6,6-9,6)	2381

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B53 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hartinfarct in de afgelopen 12 maanden, België

MA03_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	3,3	(1,6-5,0)	3,3	(2,0-5,5)	1092
	Vrouwen	1,4	(0,7-2,2)	1,4	(0,8-2,4)	1291
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	2,1	(1,2-3,0)	1,9	(1,1-3,1)	1289
	75 +	2,4	(0,9-3,8)	2,3	(1,3-4,0)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	5,0	(1,0-9,0)	4,9	(2,4-9,5)	382
	Lager secundair	1,7	(0,4-3,0)	1,6	(0,7-3,6)	507
	Hoger secundair	2,2	(0,9-3,5)	2,0	(1,1-3,7)	621
	Hoger onderwijs	1,4	(0,5-2,3)	1,2	(0,6-2,4)	818
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	1,8	(0,7-3,0)	1,7	(0,9-2,9)	980
	Brussels Gewest	3,5	(1,3-5,7)	3,3	(1,7-6,2)	503
	Waals Gewest	2,7	(1,4-4,0)	2,5	(1,4-4,3)	900
JAAR	**2008**	2,3	(1,6-3,0)	2,2	(1,6-3,0)	2829
	2013	3,0	(1,7-4,2)	2,8	(1,8-4,2)	2025
	2018	2,2	(1,4-3,1)	2,1	(1,5-3,0)	2383

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B54 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met coronaire hartziekte in de afgelopen 12 maanden, België

MA04_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	5,8	(3,6-8,0)	5,7	(4,0-8,2)	1091
	Vrouwen	2,3	(1,4-3,2)	2,2	(1,4-3,2)	1291
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	3,0	(1,8-4,1)	2,6	(1,7-3,8)	1288
	75 +	4,7	(2,9-6,6)	4,4	(3,0-6,4)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	3,8	(1,7-6,0)	3,0	(1,6-5,7)	381
	Lager secundair	4,0	(1,9-6,0)	3,6	(2,0-6,3)	507
	Hoger secundair	4,4	(1,8-7,0)	3,8	(2,2-6,5)	621
	Hoger onderwijs	3,0	(1,6-4,3)	2,7	(1,7-4,2)	818
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	3,4	(1,9-4,9)	2,9	(1,9-4,4)	979
	Brussels Gewest	5,2	(2,9-7,4)	4,6	(2,9-7,3)	503
	Waals Gewest	4,3	(2,6-5,9)	3,8	(2,5-5,8)	900
JAAR	**2008**	6,6	(5,2-8,0)	6,0	(4,8-7,5)	2811
	2013	5,0	(3,5-6,6)	4,6	(3,3-6,2)	2025
	2018	3,8	(2,7-4,9)	3,4	(2,6-4,5)	2382

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B55 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ernstige hartziekte (uitgezonderd hartinfarct of coronaire hartziekte) in de afgelopen 12 maanden, België

MA05_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	11,5	(8,5-14,6)	11,3	(8,6-14,6)	1092
	Vrouwen	7,2	(5,2-9,1)	6,6	(4,9-8,7)	1290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	6,4	(4,4-8,4)	6,1	(4,4-8,3)	1289
	75 +	12,0	(9,2-14,8)	11,9	(9,4-15,0)	1093
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	11,8	(7,0-16,6)	9,9	(6,5-14,8)	382
	Lager secundair	10,7	(6,9-14,6)	10,1	(6,8-14,6)	507
	Hoger secundair	7,7	(4,7-10,6)	7,1	(4,9-10,3)	621
	Hoger onderwijs	7,8	(4,8-10,8)	7,7	(5,2-11,2)	817
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	10,5	(8,0-13,0)	9,7	(7,6-12,2)	980
	Brussels Gewest	5,9	(3,7-8,2)	5,5	(3,7-8,0)	503
	Waals Gewest	7,0	(4,5-9,5)	6,6	(4,4-9,6)	899
JAAR	**2013**	6,3	(4,9-7,7)	5,7	(4,5-7,3)	2026
	2018	9,1	(7,3-10,8)	8,4	(6,9-10,2)	2382

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B56 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoge bloeddruk in de afgelopen 12 maanden, België

MA06_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	35,3	(31,6-39,0)	35,4	(31,8-39,2)	1092
	Vrouwen	39,3	(35,8-42,7)	39,2	(35,8-42,7)	1290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	36,2	(32,8-39,7)	36,3	(32,9-39,9)	1289
	75 +	39,0	(35,0-42,9)	38,8	(34,9-42,8)	1093
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	41,8	(34,9-48,7)	41,1	(34,4-48,1)	382
	Lager secundair	38,3	(32,6-43,9)	37,9	(32,4-43,7)	506
	Hoger secundair	35,3	(30,5-40,0)	35,3	(30,7-40,2)	621
	Hoger onderwijs	36,4	(31,9-40,9)	36,8	(32,3-41,4)	818
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	37,2	(33,7-40,8)	37,2	(33,7-40,8)	980
	Brussels Gewest	35,6	(31,0-40,2)	35,4	(31,0-40,1)	503
	Waals Gewest	38,6	(34,1-43,1)	38,5	(34,2-43,1)	899
JAAR	**1997**	27,6	(23,9-31,3)	27,4	(23,9-31,2)	1761
	2001	33,3	(30,0-36,6)	33,1	(29,9-36,5)	2115
	2004	34,0	(31,7-36,4)	33,9	(31,6-36,2)	3474
	2008	36,7	(33,7-39,7)	36,5	(33,5-39,6)	2798
	2013	36,8	(33,8-39,8)	36,6	(33,7-39,7)	2025
	2018	37,6	(35,0-40,2)	37,5	(34,9-40,1)	2382

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B57 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoge bloeddruk dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet te hebben gevolgd, België

MA06_30		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	16,6	(11,2-21,9)	16,5	(11,9-22,6)	392
	Vrouwen	19,2	(14,8-23,7)	18,9	(15,0-23,6)	499
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	16,1	(11,8-20,4)	16,1	(12,2-20,8)	462
	75 +	20,3	(14,7-25,8)	20,0	(15,0-26,2)	429
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	18,6	(8,7-28,5)	16,7	(9,2-28,4)	156
	Lager secundair	14,4	(8,1-20,7)	13,7	(8,7-20,8)	187
	Hoger secundair	16,6	(10,0-23,2)	16,4	(11,1-23,7)	229
	Hoger onderwijs	22,0	(15,6-28,5)	22,4	(16,6-29,6)	293
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	18,3	(13,3-23,3)	18,0	(13,7-23,4)	371
	Brussels Gewest	22,4	(15,5-29,4)	21,9	(15,7-29,6)	176
	Waals Gewest	16,9	(11,5-22,4)	16,6	(11,9-22,7)	344
JAAR	**2001**	32,6	(26,3-39,0)	31,6	(25,9-38,0)	605
	2008	23,2	(17,8-28,7)	22,6	(17,8-28,3)	666
	2013	21,1	(16,4-25,9)	20,8	(16,5-25,8)	715
	2018	18,2	(14,6-21,7)	17,8	(14,6-21,6)	891

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B58 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoge bloeddruk dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden geneesmiddelen te hebben genomen, België

MA06_40		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	95,1	(92,6-97,6)	95,1	(92,0-97,1)	392
	Vrouwen	91,6	(88,5-94,7)	91,6	(88,0-94,2)	499
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	92,8	(90,0-95,6)	93,0	(89,6-95,3)	462
	75 +	93,3	(90,1-96,4)	93,7	(90,2-96,0)	429
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	91,4	(85,7-97,2)	91,7	(84,5-95,8)	156
	Lager secundair	94,3	(89,8-98,7)	94,6	(88,7-97,5)	187
	Hoger secundair	91,4	(86,9-96,0)	91,7	(85,9-95,3)	229
	Hoger onderwijs	94,7	(91,9-97,5)	94,8	(91,3-97,0)	293
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	93,1	(90,3-95,9)	93,3	(90,0-95,6)	371
	Brussels Gewest	93,1	(88,6-97,7)	93,5	(87,4-96,8)	176
	Waals Gewest	92,9	(89,2-96,5)	93,3	(89,0-96,0)	344
JAAR	**1997**	90,6	(86,5-94,8)	91,3	(86,8-94,4)	490
	2001	85,6	(81,5-89,8)	86,1	(81,7-89,6)	654
	2008	86,2	(82,4-90,0)	86,6	(82,3-89,9)	657
	2013	96,1	(94,3-97,9)	96,1	(93,9-97,6)	715
	2018	93,0	(90,9-95,1)	93,1	(90,8-94,9)	891

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B59 Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoge bloeddruk volgens de behandeling van de aandoening, België

MA06_50		Geen behandeling	Enkel dieet	Medicamenteuze behandeling	N
GESLACHT	**Mannen**	4,3	0,6	95,1	392
	Vrouwen	7,1	1,3	91,6	499
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	6,5	0,7	92,8	462
	75 +	5,4	1,3	93,3	429
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	8,6	0.0	91,4	156
	Lager secundair	4,7	1,0	94,3	187
	Hoger secundair	6,6	2,0	91,4	229
	Hoger onderwijs	4,6	0,7	94,7	293
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	5,8	1,1	93,1	371
	Brussels Gewest	6,5	0,4	93,1	176
	Waals Gewest	6,2	1,0	92,9	344
JAAR	**2001**	6,9	1,3	91,8	622
	2008	13,2	0,5	86,3	656
	2013	3,4	0,5	96,1	715
	2018	6,0	1,0	93,0	891

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

Tabel B60 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder methoog cholesterolgehalte in het bloed in de afgelopen 12 maanden, België

MA07_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	38,1	(34,1-42,0)	38,0	(34,1-42,0)	1089
	Vrouwen	36,3	(32,9-39,8)	36,4	(33,1-39,9)	1291
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	38,2	(34,7-41,8)	38,2	(34,7-41,8)	1288
	75 +	35,9	(31,8-39,9)	35,9	(32,0-40,1)	1092
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	35,8	(29,0-42,6)	36,5	(29,8-43,7)	381
	Lager secundair	38,3	(32,8-43,7)	38,6	(33,2-44,1)	507
	Hoger secundair	38,3	(33,0-43,7)	38,3	(33,0-43,8)	620
	Hoger onderwijs	35,4	(30,9-39,9)	35,0	(30,6-39,7)	818
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	39,3	(35,6-43,1)	39,4	(35,7-43,2)	978
	Brussels Gewest	33,0	(28,2-37,8)	33,1	(28,5-38,1)	503
	Waals Gewest	33,7	(29,3-38,1)	33,7	(29,5-38,3)	899
JAAR	**2013**	35,5	(32,5-38,6)	35,6	(32,6-38,7)	2023
	2018	37,1	(34,4-39,8)	37,1	(34,4-39,8)	2380

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B61 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet te hebben gevolgd, België

MA07_30		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	26,9	(20,9-32,9)	26,8	(21,2-33,3)	381
	Vrouwen	26,9	(21,7-32,1)	26,9	(22,1-32,4)	461
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	27,9	(22,7-33,0)	27,9	(23,1-33,3)	481
	75 +	25,8	(19,2-32,4)	25,8	(19,8-32,9)	361
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	24,9	(12,8-37,0)	24,8	(14,9-38,4)	126
	Lager secundair	23,5	(16,0-31,0)	23,5	(16,9-31,7)	191
	Hoger secundair	21,8	(14,9-28,7)	21,8	(15,7-29,4)	229
	Hoger onderwijs	35,0	(27,1-43,0)	35,1	(27,4-43,5)	278
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	27,8	(22,4-33,3)	27,9	(22,8-33,6)	387
	Brussels Gewest	36,5	(27,2-45,8)	36,5	(27,7-46,2)	166
	Waals Gewest	22,6	(15,7-29,5)	22,5	(16,3-30,2)	289
JAAR	**2013**	26,4	(21,1-31,7)	26,2	(21,5-31,6)	664
	2018	26,9	(22,8-31,0)	26,8	(22,9-31,1)	842

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B62 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden geneesmiddelen te hebben genomen, België

MA07_40		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	88,3	(84,2-92,5)	88,8	(84,0-92,4)	381
	Vrouwen	81,3	(76,7-85,9)	81,4	(76,3-85,6)	461
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	81,4	(76,8-86,0)	81,5	(76,4-85,7)	481
	75 +	87,9	(83,5-92,2)	88,4	(83,4-92,1)	361
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	88,2	(80,5-95,9)	88,1	(78,2-93,8)	126
	Lager secundair	82,9	(75,9-89,9)	83,3	(74,8-89,3)	191
	Hoger secundair	86,5	(80,8-92,2)	87,4	(80,9-91,9)	229
	Hoger onderwijs	82,0	(76,3-87,7)	83,3	(76,8-88,2)	278
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	88,9	(85,3-92,5)	89,3	(85,4-92,2)	387
	Brussels Gewest	81,2	(74,4-88,0)	82,3	(74,7-88,0)	166
	Waals Gewest	75,2	(67,8-82,6)	76,3	(67,9-83,1)	289
JAAR	**2013**	88,7	(85,6-91,9)	89,3	(85,6-92,2)	664
	2018	84,4	(81,2-87,6)	84,9	(81,4-87,9)	842

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B63 Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed volgens de behandeling van de aandoening, België

MA07_50		Geen behandeling	Enkel dieet	Medicamenteuze behandeling	N
GESLACHT	**Mannen**	9,2	2,4	88,3	381
	Vrouwen	14,2	4,6	81,3	461
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	15,1	3,6	81,4	481
	75 +	8,5	3,7	87,9	361
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	8,6	3,1	88,2	126
	Lager secundair	13,7	3,4	82,9	191
	Hoger secundair	11,5	2,0	86,5	229
	Hoger onderwijs	13,0	4,9	82,0	278
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	7,2	3,9	88,9	387
	Brussels Gewest	15,3	3,5	81,2	166
	Waals Gewest	21,8	3,0	75,2	289
JAAR	**2013**	8,5	2,8	88,7	664
	2018	12,0	3,6	84,4	842

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

Tabel B64 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beroerte in de afgelopen 12 maanden, België

MA08_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	3,4	(1,7-5,1)	3,4	(2,1-5,5)	1092
	Vrouwen	1,0	(0,4-1,5)	0,9	(0,5-1,6)	1291
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	1,7	(0,9-2,5)	1,3	(0,8-2,2)	1289
	75 +	2,4	(1,0-3,8)	2,1	(1,2-3,6)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	5,2	(1,1-9,3)	4,4	(2,2-8,4)	382
	Lager secundair	2,2	(0,9-3,5)	1,9	(1,0-3,7)	507
	Hoger secundair	0,9	(0,1-1,7)	0,7	(0,3-1,7)	621
	Hoger onderwijs	1,4	(0,5-2,4)	1,1	(0,6-2,1)	818
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	1,7	(0,5-2,8)	1,3	(0,8-2,3)	980
	Brussels Gewest	2,0	(0,9-3,0)	1,6	(0,9-3,0)	503
	Waals Gewest	2,7	(1,4-4,0)	2,3	(1,3-3,9)	900
JAAR	**1997**	4,4	(2,3-6,5)	4,5	(2,8-7,1)	1762
	2001	2,2	(1,5-3,0)	2,1	(1,5-2,9)	2120
	2004	2,3	(1,6-3,1)	2,2	(1,6-3,0)	3466
	2008	3,0	(2,2-3,8)	2,7	(2,0-3,6)	2829
	2013	2,5	(1,6-3,4)	2,2	(1,6-3,1)	2026
	2018	2,0	(1,2-2,8)	1,8	(1,2-2,7)	2383

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B65 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met vernauwing van de bloedvaten in de buik of de benen in de afgelopen 12 maanden, België

MA09_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	5,5	(3,5-7,5)	5,3	(3,8-7,5)	1090
	Vrouwen	5,3	(3,8-6,8)	4,8	(3,5-6,6)	1281
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	3,6	(2,4-4,8)	3,6	(2,6-5,0)	1286
	75 +	7,3	(5,2-9,5)	7,4	(5,4-9,9)	1085
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	10,4	(5,6-15,2)	8,9	(5,5-14,1)	382
	Lager secundair	5,7	(3,0-8,3)	5,3	(3,3-8,4)	503
	Hoger secundair	3,9	(2,2-5,5)	3,7	(2,4-5,9)	618
	Hoger onderwijs	4,3	(2,5-6,1)	4,4	(2,9-6,6)	814
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	6,1	(4,3-7,9)	5,7	(4,3-7,6)	972
	Brussels Gewest	4,5	(2,6-6,5)	4,2	(2,7-6,5)	500
	Waals Gewest	4,3	(2,7-5,8)	4,0	(2,7-5,9)	899
JAAR	**2013**	7,3	(5,4-9,1)	7,0	(5,3-9,2)	2017
	2018	5,4	(4,2-6,6)	5,3	(4,2-6,6)	2371

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B66 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met reumatoïde artritis in de afgelopen 12 maanden, België

MA10_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	10,9	(8,6-13,2)	10,9	(8,8-13,4)	1091
	Vrouwen	19,7	(16,9-22,5)	19,5	(16,9-22,5)	1291
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	14,5	(11,9-17,0)	14,2	(11,9-17,0)	1289
	75 +	17,4	(14,3-20,4)	16,4	(13,7-19,6)	1093
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	19,0	(13,5-24,5)	17,5	(12,8-23,5)	382
	Lager secundair	16,5	(12,4-20,6)	15,3	(11,7-19,6)	506
	Hoger secundair	14,2	(10,6-17,8)	13,8	(10,6-17,7)	621
	Hoger onderwijs	15,1	(11,7-18,4)	15,1	(12,0-18,8)	818
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	18,1	(15,3-21,0)	17,5	(14,9-20,5)	980
	Brussels Gewest	12,0	(8,7-15,3)	11,3	(8,5-14,8)	503
	Waals Gewest	12,5	(9,6-15,3)	11,8	(9,3-14,8)	899
JAAR	**1997**	18,5	(14,9-22,2)	17,9	(14,6-21,8)	1758
	2001	19,6	(17,0-22,3)	18,8	(16,4-21,4)	2119
	2004	17,9	(15,8-19,9)	17,2	(15,3-19,3)	3455
	2008	20,4	(18,1-22,6)	19,4	(17,2-21,7)	2784
	2013	18,7	(16,2-21,2)	17,8	(15,5-20,4)	2025
	2018	15,9	(13,9-17,9)	15,2	(13,4-17,2)	2382

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B67 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met artrose in de afgelopen 12 maanden, België

MA11_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	32,4	(28,6-36,1)	32,5	(28,8-36,4)	1092
	Vrouwen	47,9	(44,4-51,5)	47,7	(44,2-51,3)	1290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	38,5	(35,0-42,0)	38,7	(35,2-42,3)	1289
	75 +	44,1	(40,1-48,0)	43,2	(39,2-47,2)	1093
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	42,7	(35,8-49,6)	40,6	(33,8-47,7)	382
	Lager secundair	40,2	(34,5-45,8)	38,5	(33,0-44,3)	507
	Hoger secundair	41,2	(36,6-45,8)	41,2	(36,6-46,0)	621
	Hoger onderwijs	40,6	(36,0-45,3)	41,5	(36,8-46,5)	817
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	39,0	(35,5-42,5)	38,7	(35,2-42,2)	979
	Brussels Gewest	39,7	(34,6-44,8)	38,9	(34,0-44,0)	503
	Waals Gewest	45,7	(41,0-50,4)	45,3	(40,4-50,2)	900
JAAR	**1997**	31,9	(28,1-35,6)	31,0	(27,3-34,9)	1760
	2001	39,2	(36,1-42,3)	38,3	(35,2-41,4)	2120
	2004	33,0	(30,7-35,3)	32,1	(29,8-34,5)	3458
	2008	40,7	(37,7-43,7)	39,7	(36,6-43,0)	2716
	2013	40,8	(37,7-43,9)	39,8	(36,8-43,0)	2022
	2018	41,2	(38,6-43,8)	40,6	(37,9-43,3)	2382

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B68 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met een lage rugprobleem in de afgelopen 12 maanden, België

MA12_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	29,4	(25,7-33,2)	29,5	(25,9-33,4)	1092
	Vrouwen	36,2	(32,7-39,7)	36,0	(32,6-39,6)	1291
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	31,4	(28,2-34,7)	31,6	(28,3-35,0)	1289
	75 +	35,2	(31,0-39,4)	34,9	(30,8-39,2)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	34,5	(27,4-41,6)	33,3	(26,7-40,6)	382
	Lager secundair	32,1	(26,7-37,5)	31,3	(26,2-36,9)	507
	Hoger secundair	36,0	(30,7-41,3)	36,0	(30,9-41,5)	621
	Hoger onderwijs	30,9	(26,6-35,3)	31,5	(27,2-36,0)	818
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	34,5	(30,9-38,2)	34,4	(30,8-38,1)	980
	Brussels Gewest	28,6	(24,0-33,2)	28,3	(23,9-33,1)	503
	Waals Gewest	31,9	(27,6-36,3)	31,7	(27,5-36,2)	900
JAAR	**2008**	31,4	(28,3-34,4)	31,0	(27,9-34,2)	2749
	2013	31,4	(28,5-34,3)	31,1	(28,3-34,1)	2025
	2018	33,3	(30,6-35,9)	33,1	(30,5-35,8)	2383

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B69 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met een nekprobleem in de afgelopen 12 maanden, België

MA13_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	12,9	(10,1-15,7)	12,9	(10,3-15,9)	1091
	Vrouwen	23,8	(20,7-26,9)	23,9	(20,9-27,1)	1291
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	19,5	(16,4-22,7)	19,2	(16,2-22,6)	1289
	75 +	18,6	(15,5-21,7)	17,4	(14,6-20,7)	1093
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	16,3	(11,3-21,3)	15,5	(11,2-21,2)	382
	Lager secundair	20,2	(15,7-24,8)	18,9	(15,0-23,5)	507
	Hoger secundair	21,0	(16,8-25,2)	20,5	(16,5-25,1)	621
	Hoger onderwijs	17,3	(13,2-21,4)	16,9	(13,2-21,4)	818
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	19,0	(16,1-21,9)	18,4	(15,7-21,4)	979
	Brussels Gewest	12,8	(9,9-15,7)	12,0	(9,5-15,2)	503
	Waals Gewest	20,7	(16,6-24,8)	19,8	(15,9-24,4)	900
JAAR	**2008**	18,4	(16,1-20,6)	17,9	(15,7-20,2)	2799
	2013	18,4	(16,0-20,8)	17,9	(15,6-20,5)	2025
	2018	19,1	(16,9-21,3)	18,7	(16,6-21,0)	2382

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B70 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes in de afgelopen 12 maanden, België

MA14_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	16,4	(13,6-19,2)	16,4	(13,8-19,4)	1092
	Vrouwen	11,9	(9,7-14,1)	11,8	(9,8-14,2)	1291
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	13,3	(11,1-15,5)	13,0	(11,0-15,4)	1289
	75 +	14,4	(11,8-17,1)	14,5	(12,0-17,3)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	20,0	(15,1-24,9)	19,9	(15,2-25,7)	382
	Lager secundair	13,5	(9,8-17,2)	13,6	(10,3-17,8)	507
	Hoger secundair	12,8	(9,7-15,8)	12,6	(9,9-15,9)	621
	Hoger onderwijs	12,0	(9,2-14,9)	11,8	(9,2-15,0)	818
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	13,2	(10,9-15,4)	13,0	(10,9-15,4)	980
	Brussels Gewest	17,5	(13,8-21,3)	17,5	(14,0-21,6)	503
	Waals Gewest	14,3	(11,3-17,3)	14,2	(11,4-17,5)	900
JAAR	**1997**	7,6	(5,7-9,5)	7,7	(6,0-9,8)	1761
	2001	9,8	(8,2-11,4)	9,8	(8,3-11,6)	2087
	2004	10,6	(9,2-12,1)	10,7	(9,3-12,2)	3479
	2008	10,7	(9,0-12,5)	10,7	(9,1-12,6)	2801
	2013	13,4	(11,1-15,6)	13,3	(11,2-15,7)	2026
	2018	13,8	(12,1-15,6)	13,8	(12,2-15,6)	2383

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B71 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet volgde, België

MA14_30		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	55,2	(46,1-64,2)	55,2	(46,0-64,0)	173
	Vrouwen	58,4	(49,3-67,4)	58,3	(48,7-67,2)	174
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	55,7	(46,8-64,6)	56,1	(47,0-64,8)	191
	75 +	57,8	(48,2-67,4)	57,9	(47,8-67,3)	156
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	54,3	(41,1-67,4)	53,0	(38,9-66,6)	79
	Lager secundair	51,8	(36,3-67,3)	51,8	(37,0-66,3)	70
	Hoger secundair	57,8	(45,9-69,8)	59,0	(46,3-70,6)	93
	Hoger onderwijs	60,6	(48,2-72,9)	61,3	(47,7-73,4)	97
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	63,1	(54,4-71,9)	63,6	(54,5-71,9)	133
	Brussels Gewest	52,5	(41,0-63,9)	52,5	(41,2-63,5)	87
	Waals Gewest	46,7	(35,1-58,3)	46,9	(35,6-58,5)	127
JAAR	**2001**	71,7	(63,7-79,8)	71,9	(63,6-79,0)	207
	2008	58,1	(49,2-66,9)	58,4	(49,5-66,8)	284
	2013	54,6	(45,7-63,4)	54,8	(45,7-63,5)	297
	2018	56,7	(50,3-63,2)	57,2	(50,4-63,8)	347

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B72 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden medicamenteus behandeld werd, België

MA14_40		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	93,9	(89,5-98,2)	93,9	(87,7-97,1)	173
	Vrouwen	90,6	(84,8-96,3)	90,8	(83,3-95,1)	174
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	93,3	(88,3-98,2)	93,1	(86,0-96,7)	191
	75 +	91,3	(86,0-96,5)	91,3	(84,6-95,3)	156
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	93,6	(89,3-97,9)	95,4	(87,6-98,4)	79
	Lager secundair	100	(100,0-100,0)	100	(100,0-100,0)	70
	Hoger secundair	93,2	(87,1-99,3)	92,8	(82,0-97,3)	93
	Hoger onderwijs	86,5	(76,8-96,3)	86,4	(74,7-93,2)	97
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	92,3	(86,9-97,7)	92,3	(84,4-96,4)	133
	Brussels Gewest	86,5	(77,7-95,3)	86,8	(75,2-93,5)	87
	Waals Gewest	93,8	(88,9-98,8)	93,9	(86,8-97,2)	127
JAAR	**2001**	94,7	(90,8-98,5)	94,8	(89,3-97,5)	212
	2008	94,6	(91,8-97,4)	94,7	(91,1-96,9)	284
	2013	94,9	(92,1-97,7)	95,0	(91,3-97,1)	297
	2018	92,3	(88,7-95,9)	92,3	(87,8-95,2)	347

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B73 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden insuline gebruikte, België

MA14_50		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	27,1	(19,3-35,0)	27,1	(19,7-36,0)	173
	Vrouwen	23,7	(15,5-31,8)	23,9	(16,7-32,9)	174
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	27,4	(19,3-35,5)	27,0	(19,4-36,2)	191
	75 +	23,5	(15,2-31,8)	23,4	(16,2-32,5)	156
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	27,2	(14,6-39,8)	28,3	(17,4-42,6)	79
	Lager secundair	20,3	(8,8-31,7)	20,2	(11,2-33,9)	70
	Hoger secundair	31,3	(19,4-43,3)	30,4	(19,9-43,4)	93
	Hoger onderwijs	22,4	(11,4-33,4)	21,8	(12,5-35,4)	97
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	29,4	(20,9-37,9)	29,4	(21,5-38,8)	133
	Brussels Gewest	21,3	(11,5-31,0)	21,3	(13,2-32,4)	87
	Waals Gewest	19,7	(10,9-28,5)	19,4	(12,1-29,5)	127
JAAR	**2001**	39,2	(30,2-48,2)	39,1	(30,7-48,2)	207
	2008	25,9	(19,2-32,5)	25,6	(19,6-32,8)	283
	2013	23,2	(17,0-29,3)	23,1	(17,5-29,7)	297
	2018	25,5	(19,7-31,2)	25,3	(19,9-31,5)	347

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B74 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden orale antidiabetica gebruikte, België

MA14_60		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	90,1	(84,6-95,6)	90,1	(83,1-94,4)	172
	Vrouwen	85,0	(78,3-91,7)	85,2	(77,0-90,8)	174
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	88,6	(82,6-94,6)	88,3	(80,5-93,2)	191
	75 +	86,6	(80,2-93,0)	86,7	(78,9-91,9)	155
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	88,5	(80,4-96,5)	90,5	(78,5-96,1)	78
	Lager secundair	94,1	(86,9-100,0)	94,5	(82,5-98,4)	70
	Hoger secundair	87,6	(79,6-95,7)	86,6	(75,0-93,3)	93
	Hoger onderwijs	84,5	(74,7-94,4)	84,0	(71,8-91,6)	97
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	88,3	(82,1-94,5)	88,1	(80,0-93,3)	132
	Brussels Gewest	78,9	(68,2-89,6)	79,2	(66,3-88,1)	87
	Waals Gewest	88,9	(81,6-96,2)	88,9	(79,3-94,4)	127
JAAR	**2001**	74,3	(65,8-82,7)	74,7	(65,7-82,0)	212
	2008	79,7	(73,9-85,6)	80,2	(73,7-85,4)	284
	2013	86,3	(81,6-91,1)	86,5	(81,1-90,6)	297
	2018	87,6	(83,2-92,0)	87,6	(82,5-91,4)	346

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B75 Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes volgens de behandeling van de aandoening, België

MA14_70		Geen behandeling	Enkel dieet	Orale antidiabetica	Insuline	N
GESLACHT	**Mannen**	3,6	2,6	66,7	27,1	173
	Vrouwen	3,7	5,7	66,9	23,7	174
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	1,5	5,2	65,9	27,4	191
	75 +	5,7	3,0	67,8	23,5	156
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	6,4	0.0	66,4	27,2	79
	Lager secundair	0.0	0.0	79,7	20,3	70
	Hoger secundair	2,5	4,3	61,9	31,3	93
	Hoger onderwijs	5,7	7,8	64,1	22,4	97
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	3,6	4,1	62,9	29,4	133
	Brussels Gewest	5,6	7,9	65,2	21,3	87
	Waals Gewest	3,1	3,1	74,1	19,7	127
JAAR	**2001**	1,3	4,3	55,2	39,2	207
	2008	3,0	2,5	68,7	25,9	283
	2013	2,6	2,5	71,7	23,2	297
	2018	3,6	4,1	66,8	25,5	347

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

Tabel B76 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met allergie in de afgelopen 12 maanden, België

MA15_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	11,9	(9,3-14,5)	11,8	(9,4-14,8)	1092
	Vrouwen	18,9	(16,1-21,7)	19,0	(16,3-21,9)	1290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	16,5	(13,9-19,2)	16,4	(13,9-19,3)	1289
	75 +	15,1	(12,2-18,1)	14,5	(11,8-17,7)	1093
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	15,9	(10,4-21,5)	15,5	(10,7-22,0)	382
	Lager secundair	15,7	(11,1-20,2)	14,9	(11,1-19,8)	506
	Hoger secundair	12,5	(9,4-15,6)	12,2	(9,5-15,6)	621
	Hoger onderwijs	19,2	(15,6-22,8)	18,9	(15,6-22,8)	818
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	16,0	(13,2-18,7)	15,7	(13,1-18,7)	980
	Brussels Gewest	17,6	(13,3-22,0)	17,1	(13,3-21,8)	503
	Waals Gewest	15,2	(12,0-18,4)	14,7	(11,9-18,1)	899
JAAR	**2001**	10,5	(8,6-12,3)	10,1	(8,5-12,1)	2117
	2004	11,7	(10,1-13,2)	11,3	(9,9-12,9)	3475
	2008	10,1	(8,1-12,2)	9,9	(8,0-12,2)	2818
	2013	10,3	(8,5-12,1)	10,1	(8,4-12,1)	2025
	2018	15,9	(13,9-17,8)	15,6	(13,7-17,7)	2382

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B77 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met een maagzweer in de afgelopen 12 maanden, België

MA16_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	2,1	(1,2-3,1)	2,1	(1,4-3,3)	1091
	Vrouwen	4,3	(3,0-5,7)	4,3	(3,2-5,9)	1291
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	3,5	(2,3-4,6)	3,4	(2,4-4,7)	1289
	75 +	3,3	(1,9-4,6)	3,0	(2,0-4,5)	1093
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	3,4	(1,0-5,7)	3,2	(1,6-6,3)	382
	Lager secundair	4,9	(2,3-7,4)	4,5	(2,6-7,7)	507
	Hoger secundair	3,5	(2,0-5,0)	3,4	(2,1-5,2)	621
	Hoger onderwijs	2,1	(1,1-3,0)	2,0	(1,2-3,1)	818
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	1,4	(0,7-2,2)	1,4	(0,8-2,3)	979
	Brussels Gewest	5,5	(3,2-7,8)	5,1	(3,4-7,8)	503
	Waals Gewest	6,6	(4,3-8,9)	6,2	(4,3-8,8)	900
JAAR	**1997**	5,2	(3,7-6,8)	5,0	(3,7-6,8)	1762
	2001	6,8	(5,2-8,3)	6,7	(5,3-8,4)	2123
	2004	4,8	(3,7-5,8)	4,7	(3,8-5,8)	3466
	2008	5,7	(4,0-7,5)	5,7	(4,2-7,7)	2832
	2013	4,9	(3,4-6,4)	4,9	(3,6-6,6)	2026
	2018	3,4	(2,5-4,3)	3,4	(2,6-4,4)	2382

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B78 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met leverlijden in de afgelopen 12 maanden, België

MA17_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,5	(0,3-2,6)	1,4	(0,7-3,0)	1092
	Vrouwen	2,0	(0,9-3,2)	2,0	(1,2-3,5)	1290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	1,9	(0,7-3,2)	1,9	(1,0-3,7)	1288
	75 +	1,6	(0,6-2,6)	1,6	(0,9-2,8)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	1,5	(0,0-4,0)	1,6	(0,2-9,1)	382
	Lager secundair	3,4	(1,0-5,8)	3,3	(1,7-6,4)	507
	Hoger secundair	1,1	(0,2-2,1)	1,1	(0,5-2,6)	621
	Hoger onderwijs	1,4	(0,3-2,4)	1,3	(0,6-3,0)	817
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	2,3	(1,0-3,5)	2,2	(1,3-3,9)	979
	Brussels Gewest	1,3	(0,4-2,2)	1,2	(0,6-2,5)	503
	Waals Gewest	1,0	(0,3-1,7)	1,0	(0,5-1,9)	900
JAAR	**2001**	1,9	(0,9-2,9)	1,8	(1,1-3,1)	2122
	2004	1,7	(1,0-2,3)	1,6	(1,1-2,3)	3473
	2008	0,8	(0,4-1,1)	0,7	(0,5-1,2)	2837
	2013	0,8	(0,4-1,3)	0,8	(0,5-1,4)	2024
	2018	1,8	(1,0-2,6)	1,7	(1,1-2,7)	2382

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B79 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met kanker in de afgelopen 12 maanden, België

MA18_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	7,0	(4,7-9,2)	7,0	(5,0-9,6)	1092
	Vrouwen	4,7	(3,0-6,3)	4,6	(3,2-6,5)	1290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	5,1	(3,6-6,5)	4,9	(3,6-6,6)	1289
	75 +	6,3	(4,0-8,6)	6,3	(4,4-9,1)	1093
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	8,8	(4,1-13,6)	8,5	(5,0-14,1)	382
	Lager secundair	5,0	(2,4-7,6)	5,0	(2,9-8,3)	507
	Hoger secundair	5,8	(3,3-8,4)	5,7	(3,6-8,9)	620
	Hoger onderwijs	4,6	(2,7-6,5)	4,5	(3,0-6,7)	818
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	5,8	(3,9-7,7)	5,6	(4,1-7,7)	979
	Brussels Gewest	2,6	(1,3-4,0)	2,6	(1,5-4,3)	503
	Waals Gewest	6,1	(3,9-8,2)	6,0	(4,2-8,5)	900
JAAR	**1997**	4,5	(2,2-6,7)	4,4	(2,7-7,2)	1761
	2001	4,5	(3,0-6,0)	4,5	(3,2-6,3)	2121
	2004	2,4	(1,7-3,2)	2,4	(1,8-3,3)	3453
	2008	5,9	(4,4-7,4)	5,9	(4,6-7,6)	2835
	2013	5,0	(3,5-6,5)	5,0	(3,7-6,7)	2025
	2018	5,7	(4,3-7,0)	5,7	(4,5-7,2)	2382

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B80 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ernstige hoofdpijn zoals migraine in de afgelopen 12 maanden, België

MA19_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	3,0	(1,3-4,7)	3,0	(1,7-5,2)	1092
	Vrouwen	6,5	(4,8-8,2)	6,6	(5,0-8,5)	1291
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	5,2	(3,4-7,0)	5,0	(3,4-7,2)	1289
	75 +	4,8	(3,2-6,3)	4,3	(3,0-6,1)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	7,8	(4,2-11,4)	7,6	(4,7-12,0)	382
	Lager secundair	5,1	(2,6-7,6)	4,6	(2,8-7,5)	507
	Hoger secundair	4,7	(2,9-6,6)	4,4	(3,0-6,5)	621
	Hoger onderwijs	4,0	(1,7-6,2)	3,6	(1,9-6,7)	818
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	4,7	(3,2-6,2)	4,4	(3,1-6,0)	980
	Brussels Gewest	3,8	(2,1-5,4)	3,4	(2,2-5,4)	503
	Waals Gewest	5,9	(3,6-8,3)	5,5	(3,4-8,6)	900
JAAR	**1997**	7,8	(5,3-10,3)	6,6	(4,7-9,3)	1757
	2001	7,3	(5,9-8,8)	6,5	(5,3-7,9)	2119
	2004	6,3	(5,2-7,4)	5,5	(4,6-6,6)	3472
	2008	7,0	(5,5-8,5)	6,3	(5,0-7,8)	2806
	2013	8,6	(6,5-10,8)	7,8	(6,1-10,0)	2024
	2018	5,0	(3,8-6,2)	4,5	(3,5-5,8)	2383

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B81 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met urinaire incontinentie in de afgelopen 12 maanden, België

MA20_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	13,5	(10,7-16,4)	12,5	(10,0-15,5)	1092
	Vrouwen	14,6	(12,1-17,2)	12,5	(10,3-15,1)	1291
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	7,5	(5,6-9,3)	7,5	(5,8-9,6)	1289
	75 +	21,4	(18,0-24,8)	21,4	(18,2-25,0)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	26,7	(20,3-33,0)	21,0	(15,4-28,1)	382
	Lager secundair	14,3	(10,5-18,1)	12,4	(9,3-16,3)	507
	Hoger secundair	11,9	(8,5-15,3)	11,0	(8,2-14,5)	621
	Hoger onderwijs	9,6	(6,9-12,3)	9,8	(7,3-13,0)	818
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	15,2	(12,5-17,9)	13,4	(11,0-16,2)	980
	Brussels Gewest	12,0	(8,7-15,2)	10,3	(7,7-13,7)	503
	Waals Gewest	12,7	(9,7-15,7)	11,3	(8,7-14,5)	900
JAAR	**2008**	11,8	(10,1-13,6)	10,6	(8,9-12,5)	2802
	2013	13,7	(11,5-15,9)	12,2	(10,3-14,5)	2025
	2018	14,2	(12,2-16,1)	12,9	(11,2-14,9)	2383

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B82 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met depressie in de afgelopen 12 maanden, België

MA21_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	4,6	(2,8-6,5)	4,6	(3,1-6,8)	1092
	Vrouwen	9,2	(7,1-11,2)	8,9	(7,0-11,1)	1290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	5,7	(4,1-7,3)	5,5	(4,2-7,3)	1288
	75 +	8,8	(6,5-11,1)	8,2	(6,1-10,9)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	12,5	(7,3-17,7)	11,1	(6,9-17,4)	382
	Lager secundair	9,0	(5,7-12,3)	8,1	(5,5-11,7)	507
	Hoger secundair	6,0	(3,8-8,1)	5,7	(4,0-8,1)	621
	Hoger onderwijs	4,4	(2,8-6,0)	4,4	(3,0-6,3)	817
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	7,6	(5,6-9,6)	7,1	(5,4-9,3)	979
	Brussels Gewest	7,8	(5,4-10,3)	7,1	(5,2-9,8)	503
	Waals Gewest	6,3	(4,1-8,5)	5,8	(4,1-8,1)	900
JAAR	**1997**	8,5	(6,5-10,6)	8,1	(6,3-10,2)	1762
	2001	7,6	(5,9-9,3)	7,2	(5,7-9,1)	2119
	2004	6,1	(5,0-7,3)	5,8	(4,8-7,0)	3470
	2008	6,8	(4,9-8,6)	6,4	(4,7-8,5)	2813
	2013	8,6	(6,4-10,7)	8,1	(6,3-10,4)	2025
	2018	7,2	(5,8-8,6)	6,9	(5,6-8,3)	2382

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B83 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met schildklierlijden in de afgelopen 12 maanden, België

MA22_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	4,4	(2,8-6,1)	4,4	(3,0-6,3)	1092
	Vrouwen	17,5	(14,9-20,2)	17,6	(15,1-20,4)	1291
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	12,2	(9,8-14,5)	10,5	(8,3-13,2)	1289
	75 +	11,5	(9,0-14,0)	9,0	(7,1-11,5)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	11,7	(7,6-15,8)	9,5	(6,3-14,0)	382
	Lager secundair	10,8	(7,2-14,3)	8,3	(5,8-11,8)	507
	Hoger secundair	12,5	(9,3-15,8)	10,6	(7,8-14,2)	621
	Hoger onderwijs	11,9	(8,9-14,8)	10,2	(7,6-13,4)	818
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	8,6	(6,6-10,6)	7,1	(5,5-9,1)	980
	Brussels Gewest	16,9	(13,4-20,5)	14,1	(11,0-17,9)	503
	Waals Gewest	16,8	(13,2-20,3)	14,1	(10,8-18,0)	900
JAAR	**1997**	4,5	(2,6-6,3)	3,4	(2,2-5,3)	1758
	2001	8,3	(6,3-10,3)	6,7	(5,2-8,7)	2120
	2004	7,7	(6,4-9,0)	6,3	(5,2-7,5)	3467
	2008	7,4	(6,1-8,8)	6,1	(5,0-7,4)	2828
	2013	8,9	(7,2-10,7)	7,4	(6,1-9,1)	2025
	2018	11,8	(10,1-13,5)	10,1	(8,6-11,8)	2383

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B84 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met cataract in de afgelopen 12 maanden, België

MA2301_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	11,4	(8,7-14,1)	11,2	(8,8-14,2)	1090
	Vrouwen	13,6	(11,1-16,1)	12,9	(10,6-15,5)	1291
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	9,4	(7,1-11,6)	9,4	(7,4-11,9)	1289
	75 +	16,2	(13,3-19,1)	16,1	(13,4-19,2)	1092
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	11,8	(7,6-16,1)	9,7	(6,5-14,3)	380
	Lager secundair	11,0	(7,3-14,8)	10,0	(7,0-14,2)	507
	Hoger secundair	13,5	(10,0-17,0)	13,0	(10,0-16,9)	621
	Hoger onderwijs	13,3	(9,9-16,7)	13,8	(10,7-17,7)	818
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	12,9	(10,4-15,4)	12,4	(10,2-15,0)	979
	Brussels Gewest	11,9	(8,7-15,1)	11,3	(8,6-14,9)	502
	Waals Gewest	12,3	(9,0-15,6)	11,9	(8,9-15,7)	900
JAAR	**1997**	8,5	(6,3-10,7)	8,4	(6,5-10,9)	1760
	2001	9,1	(7,6-10,7)	8,5	(7,1-10,1)	2119
	2004	9,7	(8,3-11,1)	9,2	(7,9-10,6)	3464
	2008	11,2	(9,5-12,8)	10,1	(8,7-11,8)	2797
	2013	11,4	(9,4-13,3)	10,3	(8,6-12,3)	2025
	2018	12,6	(10,8-14,5)	11,7	(10,0-13,6)	2381

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B85 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met glaucoom in de afgelopen 12 maanden, België

MA2302_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	2,8	(1,6-4,0)	2,7	(1,7-4,3)	1090
	Vrouwen	3,7	(2,3-5,0)	3,3	(2,3-4,6)	1291
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	2,1	(1,1-3,1)	2,1	(1,3-3,3)	1289
	75 +	4,6	(3,0-6,2)	4,5	(3,2-6,3)	1092
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	2,5	(0,9-4,2)	1,9	(0,9-3,8)	380
	Lager secundair	2,9	(1,0-4,8)	2,4	(1,3-4,5)	507
	Hoger secundair	3,3	(1,6-5,0)	3,0	(1,7-5,4)	621
	Hoger onderwijs	4,0	(2,2-5,9)	4,1	(2,7-6,4)	818
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	3,0	(1,8-4,1)	2,7	(1,8-4,1)	979
	Brussels Gewest	5,7	(3,3-8,1)	5,2	(3,4-7,9)	502
	Waals Gewest	3,4	(1,6-5,1)	3,1	(1,9-5,1)	900
JAAR	**1997**	3,4	(2,3-4,5)	3,3	(2,4-4,7)	1759
	2001	6,1	(4,8-7,4)	6,0	(4,8-7,4)	2112
	2004	6,2	(4,9-7,4)	6,0	(4,9-7,4)	3460
	2008	5,9	(4,5-7,3)	5,7	(4,5-7,3)	2811
	2013	2,9	(1,9-3,8)	2,8	(2,0-3,8)	2025
	2018	3,3	(2,4-4,2)	3,2	(2,4-4,2)	2381

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B86 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetische retinopathie in de afgelopen 12 maanden, België

MA2303_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,4	(0,7-2,1)	1,2	(0,7-2,0)	1090
	Vrouwen	1,9	(1,0-2,7)	1,4	(0,8-2,5)	1291
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	0,7	(0,2-1,2)	0,7	(0,3-1,5)	1289
	75 +	2,7	(1,6-3,8)	2,7	(1,8-3,9)	1092
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	1,4	(0,2-2,6)	0,8	(0,3-2,3)	380
	Lager secundair	1,8	(0,5-3,0)	1,2	(0,6-2,6)	507
	Hoger secundair	1,4	(0,5-2,4)	1,1	(0,6-2,3)	621
	Hoger onderwijs	2,0	(0,8-3,2)	1,9	(1,0-3,4)	818
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	1,1	(0,4-1,8)	0,9	(0,5-1,6)	979
	Brussels Gewest	3,7	(1,8-5,5)	2,9	(1,6-5,0)	502
	Waals Gewest	2,2	(1,0-3,4)	1,8	(1,0-3,3)	900
JAAR	**2013**	0,5	(0,1-0,8)	0,4	(0,2-0,9)	2025
	2018	1,7	(1,1-2,2)	1,4	(1,0-2,1)	2381

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B87 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met maculadegeneratie in de afgelopen 12 maanden, België

MA2304_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,1	(0,0-0,3)	0,2	(0,1-0,9)	1090
	Vrouwen	0,2	(0,0-0,4)	0,3	(0,1-0,9)	1291
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	0,1	(0,0-0,3)	0,2	(0,1-0,8)	1289
	75 +	0,2	(0,0-0,5)	0,4	(0,1-1,1)	1092
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	0,0	.	.	.	380
	Lager secundair	0,2	(0,0-0,6)	0,2	(0,0-1,7)	507
	Hoger secundair	0,3	(0,0-0,9)	0,3	(0,1-1,5)	621
	Hoger onderwijs	0,0	(0,0-0,1)	0,1	(0,0-0,4)	818
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	0,0	.	.	.	979
	Brussels Gewest	0,4	(0,0-0,9)	0,3	(0,1-1,5)	502
	Waals Gewest	0,4	(0,0-0,9)	0,3	(0,1-1,5)	900
JAAR	**2013**	2,1	(1,3-2,9)	1,9	(1,2-3,1)	2025
	2018	0,2	(0,0-0,3)	0,3	(0,1-0,7)	2381

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B88 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ziekte van Parkinson in de afgelopen 12 maanden, België

MA24_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	2,5	(1,3-3,8)	2,5	(1,5-3,9)	1092
	Vrouwen	1,6	(0,7-2,4)	1,4	(0,8-2,6)	1290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	1,4	(0,6-2,2)	1,3	(0,7-2,5)	1288
	75 +	2,6	(1,4-3,9)	2,6	(1,6-4,1)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	3,0	(0,6-5,4)	2,5	(1,1-5,6)	382
	Lager secundair	1,8	(0,7-3,0)	1,7	(0,9-3,4)	506
	Hoger secundair	1,9	(0,4-3,4)	1,7	(0,8-3,9)	621
	Hoger onderwijs	1,7	(0,5-2,9)	1,7	(0,8-3,4)	818
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	2,2	(1,1-3,2)	2,0	(1,2-3,3)	979
	Brussels Gewest	2,0	(0,8-3,2)	1,8	(1,0-3,4)	503
	Waals Gewest	1,6	(0,6-2,7)	1,5	(0,8-2,9)	900
JAAR	**1997**	1,9	(0,8-3,1)	2,0	(1,1-3,5)	1762
	2001	1,4	(0,9-1,9)	1,3	(0,9-1,9)	2116
	2004	1,3	(0,9-1,8)	1,3	(0,9-1,8)	3464
	2008	1,6	(0,9-2,2)	1,4	(0,9-2,2)	2832
	2013	2,1	(1,2-3,1)	1,9	(1,2-3,0)	2025
	2018	2,0	(1,3-2,7)	1,8	(1,2-2,6)	2382

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B89 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met epilepsie in de afgelopen 12 maanden, België

MA25_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,6	(0,4-2,7)	1,6	(0,8-3,2)	1092
	Vrouwen	0,6	(0,2-1,1)	0,6	(0,3-1,3)	1291
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	1,1	(0,3-2,0)	1,0	(0,5-2,1)	1289
	75 +	0,9	(0,3-1,6)	0,9	(0,4-1,7)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	2,2	(0,0-5,0)	2,3	(0,7-7,6)	382
	Lager secundair	0,8	(0,0-1,5)	0,7	(0,3-2,0)	507
	Hoger secundair	0,5	(0,0-1,1)	0,4	(0,1-1,4)	621
	Hoger onderwijs	1,0	(0,2-1,8)	0,8	(0,3-2,0)	818
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	1,0	(0,2-1,8)	0,9	(0,4-1,8)	980
	Brussels Gewest	1,2	(0,0-2,4)	1,1	(0,4-3,0)	503
	Waals Gewest	1,0	(0,2-1,9)	0,9	(0,4-2,3)	900
JAAR	**1997**	1,2	(0,0-2,7)	1,1	(0,3-3,8)	1761
	2001	0,8	(0,3-1,2)	0,7	(0,4-1,3)	2120
	2004	0,5	(0,2-0,8)	0,5	(0,3-0,9)	3476
	2008	0,4	(0,1-0,6)	0,5	(0,2-1,1)	2842
	2013	1,1	(0,5-1,7)	1,0	(0,6-1,8)	2025
	2018	1,0	(0,5-1,6)	1,0	(0,6-1,6)	2383

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B90 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met langdurige vermoeidheid in de afgelopen 12 maanden, België

MA26_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	7,0	(4,7-9,2)	7,0	(5,1-9,5)	1092
	Vrouwen	10,0	(7,8-12,2)	9,8	(7,8-12,2)	1290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	7,6	(5,8-9,4)	7,6	(5,9-9,6)	1289
	75 +	9,8	(7,2-12,4)	9,6	(7,2-12,6)	1093
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	11,0	(6,0-16,0)	10,3	(6,5-16,0)	382
	Lager secundair	9,3	(5,9-12,6)	8,8	(6,2-12,5)	507
	Hoger secundair	8,6	(5,5-11,6)	8,5	(5,9-11,9)	621
	Hoger onderwijs	7,0	(4,7-9,3)	7,1	(5,1-9,8)	817
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	9,1	(6,9-11,3)	8,9	(6,9-11,4)	979
	Brussels Gewest	9,6	(6,6-12,7)	9,3	(6,7-12,8)	503
	Waals Gewest	7,6	(5,2-10,0)	7,4	(5,4-10,1)	900
JAAR	**2001**	8,3	(6,7-9,9)	8,0	(6,6-9,7)	2117
	2004	7,2	(5,9-8,4)	6,9	(5,8-8,2)	3467
	2008	5,0	(3,9-6,1)	4,7	(3,8-5,9)	2810
	2013	5,4	(4,2-6,7)	5,2	(4,1-6,5)	2024
	2018	8,7	(7,1-10,2)	8,4	(7,0-10,1)	2382

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B91 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met osteoporose in de afgelopen 12 maanden, België

MA27_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	2,4	(1,2-3,5)	2,4	(1,4-3,9)	1092
	Vrouwen	15,4	(12,8-18,0)	15,3	(12,8-18,2)	1290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	8,8	(6,6-10,9)	6,6	(5,0-8,6)	1289
	75 +	10,8	(8,4-13,3)	7,4	(5,4-10,0)	1093
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	8,7	(5,1-12,3)	5,7	(3,5-9,3)	381
	Lager secundair	12,4	(8,6-16,2)	8,3	(5,7-11,9)	507
	Hoger secundair	8,8	(6,0-11,6)	6,5	(4,4-9,4)	621
	Hoger onderwijs	9,0	(6,3-11,7)	7,0	(5,0-9,8)	818
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	10,9	(8,6-13,3)	8,0	(6,0-10,4)	980
	Brussels Gewest	9,8	(7,0-12,7)	6,8	(4,7-9,7)	503
	Waals Gewest	7,5	(5,2-9,7)	5,1	(3,6-7,2)	899
JAAR	**1997**	10,5	(8,2-12,8)	7,8	(6,1-10,0)	1761
	2001	13,9	(11,4-16,4)	10,5	(8,6-12,8)	2123
	2004	12,2	(10,6-13,7)	9,2	(8,0-10,7)	3439
	2008	15,5	(13,5-17,4)	11,8	(10,1-13,7)	2756
	2013	13,1	(11,1-15,1)	9,8	(8,2-11,7)	2016
	2018	9,7	(8,1-11,4)	7,3	(6,1-8,7)	2382

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B92 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met gebroken heup in de afgelopen 12 maanden, België

MA28_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,9	(0,3-3,5)	1,9	(0,8-4,5)	1092
	Vrouwen	2,3	(1,3-3,2)	2,2	(1,4-3,4)	1291
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	1,7	(0,4-3,0)	1,7	(0,8-3,6)	1289
	75 +	2,6	(1,4-3,8)	2,6	(1,6-4,2)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	3,4	(0,9-5,8)	3,1	(1,4-6,4)	382
	Lager secundair	2,4	(0,8-3,9)	2,2	(1,1-4,4)	507
	Hoger secundair	0,9	(0,0-1,9)	0,8	(0,2-2,8)	621
	Hoger onderwijs	2,5	(0,4-4,6)	2,6	(1,1-5,7)	818
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	1,7	(0,8-2,6)	1,6	(1,0-2,7)	980
	Brussels Gewest	1,6	(0,5-2,7)	1,6	(0,8-3,1)	503
	Waals Gewest	3,1	(0,9-5,3)	3,0	(1,3-6,5)	900
JAAR	**2001**	2,1	(1,3-2,8)	2,0	(1,4-2,8)	2122
	2004	1,5	(0,9-2,2)	1,5	(1,0-2,2)	3469
	2008	1,4	(0,9-1,9)	1,3	(0,9-1,9)	2832
	2013	2,2	(1,3-3,1)	2,1	(1,3-3,2)	2025
	2018	2,1	(1,2-3,0)	2,0	(1,3-3,1)	2383

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B93 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met darmziekte, langer dan 3 maanden in de afgelopen 12 maanden, België

MA29_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	5,7	(3,5-7,8)	5,6	(3,9-8,2)	1092
	Vrouwen	8,5	(6,5-10,5)	8,2	(6,4-10,5)	1291
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	5,8	(4,1-7,6)	5,8	(4,3-7,8)	1289
	75 +	8,8	(6,4-11,3)	8,6	(6,3-11,5)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	12,2	(6,8-17,6)	11,1	(6,8-17,7)	382
	Lager secundair	8,1	(4,4-11,8)	7,6	(4,8-12,0)	507
	Hoger secundair	6,2	(3,9-8,5)	6,1	(4,2-8,8)	621
	Hoger onderwijs	5,4	(3,5-7,3)	5,5	(3,9-7,8)	818
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	8,6	(6,4-10,8)	8,3	(6,3-10,8)	980
	Brussels Gewest	5,4	(3,3-7,6)	5,1	(3,4-7,6)	503
	Waals Gewest	5,2	(3,3-7,2)	5,0	(3,5-7,2)	900
JAAR	**1997**	5,2	(3,7-6,8)	5,2	(3,8-7,0)	1759
	2001	6,8	(4,8-8,9)	6,7	(5,0-8,9)	2120
	2004	5,2	(4,2-6,3)	5,1	(4,2-6,2)	3472
	2008	5,6	(4,4-6,9)	5,4	(4,3-6,8)	2833
	2013	6,1	(4,6-7,5)	5,8	(4,6-7,4)	2025
	2018	7,3	(5,8-8,8)	7,1	(5,7-8,7)	2383

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B94 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met nierstenen in de afgelopen 12 maanden, België

MA30_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,8	(0,8-2,8)	1,7	(1,0-3,1)	1092
	Vrouwen	0,7	(0,0-1,3)	0,6	(0,2-1,4)	1291
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	0,8	(0,2-1,4)	0,7	(0,3-1,4)	1289
	75 +	1,5	(0,6-2,4)	1,4	(0,7-2,9)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	0,5	(0,0-1,1)	0,4	(0,1-1,2)	382
	Lager secundair	0,7	(0,0-1,6)	0,5	(0,1-2,6)	507
	Hoger secundair	1,8	(0,3-3,2)	1,4	(0,6-3,5)	621
	Hoger onderwijs	1,3	(0,5-2,1)	1,1	(0,6-2,2)	818
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	1,2	(0,4-1,9)	0,9	(0,4-1,9)	980
	Brussels Gewest	1,2	(0,0-2,4)	1,0	(0,4-2,7)	503
	Waals Gewest	1,1	(0,2-2,0)	1,0	(0,4-2,2)	900
JAAR	**1997**	1,9	(0,9-2,8)	1,9	(1,1-3,1)	1760
	2001	1,5	(0,8-2,1)	1,4	(0,9-2,2)	2121
	2004	1,3	(0,7-1,9)	1,3	(0,8-2,0)	3473
	2008	1,3	(0,7-1,9)	1,2	(0,8-2,0)	2833
	2013	1,1	(0,6-1,7)	1,1	(0,7-1,8)	2025
	2018	1,1	(0,6-1,7)	1,1	(0,7-1,8)	2383

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B95 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ernstige nierziekte behalve nierstenen in de afgelopen 12 maanden, België

MA31_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	2,2	(1,0-3,4)	2,2	(1,3-3,7)	1092
	Vrouwen	1,8	(1,0-2,7)	1,8	(1,1-2,9)	1291
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	1,8	(0,9-2,8)	1,8	(1,1-3,0)	1289
	75 +	2,2	(1,1-3,2)	2,2	(1,3-3,5)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	3,0	(1,1-5,0)	3,0	(1,5-5,8)	382
	Lager secundair	1,4	(0,2-2,7)	1,4	(0,6-3,5)	507
	Hoger secundair	2,4	(0,7-4,1)	2,4	(1,2-4,7)	621
	Hoger onderwijs	1,6	(0,7-2,5)	1,6	(0,9-2,8)	818
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	1,8	(0,8-2,7)	1,7	(1,0-2,9)	980
	Brussels Gewest	3,4	(1,6-5,3)	3,4	(2,0-5,8)	503
	Waals Gewest	2,1	(0,9-3,3)	2,1	(1,1-3,8)	900
JAAR	**1997**	2,3	(0,9-3,7)	2,3	(1,3-4,2)	1759
	2001	1,5	(0,6-2,3)	1,5	(0,8-2,6)	2119
	2004	1,1	(0,6-1,6)	1,1	(0,7-1,7)	3475
	2008	1,1	(0,7-1,6)	1,1	(0,7-1,7)	2836
	2013	2,2	(1,3-3,1)	2,2	(1,4-3,3)	2024
	2018	2,0	(1,3-2,7)	2,0	(1,4-2,8)	2383

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B96 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met chronische blaasontsteking in de afgelopen 12 maanden, België

MA32_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	3,3	(1,5-5,2)	3,2	(1,9-5,3)	1092
	Vrouwen	5,3	(3,7-6,9)	4,7	(3,4-6,6)	1291
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	2,7	(1,6-3,9)	2,7	(1,8-4,1)	1289
	75 +	6,3	(4,2-8,4)	6,1	(4,1-8,9)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	5,8	(1,7-9,9)	4,5	(2,1-9,3)	382
	Lager secundair	5,5	(2,8-8,3)	4,8	(2,8-7,9)	507
	Hoger secundair	4,9	(2,6-7,1)	4,5	(2,9-7,1)	621
	Hoger onderwijs	2,6	(1,2-4,1)	2,7	(1,5-4,7)	818
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	5,4	(3,6-7,1)	4,8	(3,4-6,8)	980
	Brussels Gewest	2,8	(1,1-4,4)	2,4	(1,3-4,3)	503
	Waals Gewest	3,1	(1,5-4,7)	2,7	(1,6-4,6)	900
JAAR	**1997**	4,0	(2,4-5,7)	4,1	(2,7-6,1)	1760
	2001	4,0	(2,9-5,1)	3,9	(2,9-5,0)	2121
	2004	4,4	(3,5-5,4)	4,3	(3,4-5,4)	3468
	2008	2,9	(2,1-3,7)	2,7	(2,0-3,6)	2831
	2013	3,9	(2,8-5,0)	3,6	(2,7-4,9)	2025
	2018	4,4	(3,2-5,6)	4,2	(3,2-5,5)	2383

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B97 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ernstige of chronische huidaandoening in de afgelopen 12 maanden, België

MA33_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	4,3	(2,7-5,9)	4,3	(3,0-6,3)	1092
	Vrouwen	5,4	(3,9-6,9)	5,4	(4,0-7,1)	1291
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	4,8	(3,3-6,2)	4,8	(3,5-6,4)	1289
	75 +	5,1	(3,4-6,7)	5,0	(3,6-6,9)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	4,0	(1,6-6,4)	3,9	(2,1-7,0)	382
	Lager secundair	4,6	(2,2-7,0)	4,4	(2,6-7,5)	507
	Hoger secundair	4,5	(2,7-6,3)	4,5	(3,0-6,7)	621
	Hoger onderwijs	6,0	(3,8-8,3)	6,1	(4,2-8,8)	818
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	5,3	(3,8-6,9)	5,3	(3,9-7,1)	980
	Brussels Gewest	6,6	(4,0-9,3)	6,6	(4,3-9,8)	503
	Waals Gewest	3,8	(2,1-5,4)	3,7	(2,4-5,8)	900
JAAR	**1997**	4,0	(2,5-5,5)	4,0	(2,8-5,8)	1760
	2001	3,8	(2,8-4,8)	3,8	(2,9-5,0)	2119
	2004	4,0	(3,0-5,0)	4,0	(3,2-5,2)	3469
	2008	3,3	(1,6-4,9)	3,3	(2,0-5,4)	2837
	2013	4,1	(2,9-5,3)	4,1	(3,1-5,5)	2025
	2018	4,9	(3,8-6,0)	4,9	(3,9-6,1)	2383

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B98 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met galstenen of galblaasontsteking in de afgelopen 12 maanden, België

MA34_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,5	(0,3-2,7)	1,5	(0,7-3,3)	1092
	Vrouwen	2,6	(1,5-3,7)	2,6	(1,7-3,9)	1291
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	2,2	(1,0-3,4)	2,2	(1,2-3,8)	1289
	75 +	2,0	(0,9-3,1)	1,9	(1,1-3,4)	1094
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	1,9	(0,0-4,5)	1,8	(0,3-8,8)	382
	Lager secundair	1,6	(0,3-2,9)	1,5	(0,7-3,2)	507
	Hoger secundair	2,1	(0,7-3,6)	2,1	(1,0-4,2)	621
	Hoger onderwijs	2,7	(1,1-4,2)	2,6	(1,4-4,7)	818
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	2,6	(1,4-3,9)	2,6	(1,5-4,2)	980
	Brussels Gewest	0,9	(0,2-1,6)	0,8	(0,4-1,9)	503
	Waals Gewest	1,4	(0,4-2,3)	1,3	(0,6-2,6)	900
JAAR	**1997**	2,5	(1,4-3,5)	2,4	(1,6-3,7)	1759
	2001	2,7	(1,8-3,7)	2,6	(1,8-3,7)	2123
	2004	2,4	(1,7-3,1)	2,3	(1,7-3,1)	3464
	2008	1,6	(1,0-2,2)	1,5	(1,0-2,3)	2828
	2013	1,4	(0,7-2,2)	1,4	(0,8-2,3)	2023
	2018	2,1	(1,3-2,9)	2,0	(1,3-3,0)	2383

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B99 Percentage van de mannelijke bevolking van 65 jaar en ouder met prostaatklachten in de afgelopen 12 maanden, België

MA35_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
LEEFTIJDSGROEP						
	65 - 74	12,9	(9,6-16,2)	12,9	(9,9-16,6)	621
	75 +	26,1	(20,7-31,6)	26,1	(21,1-31,9)	469
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	23,0	(12,5-33,5)	18,7	(11,4-29,1)	151
	Lager secundair	18,2	(11,8-24,6)	16,8	(11,8-23,3)	210
	Hoger secundair	15,7	(10,7-20,7)	15,1	(10,8-20,7)	291
	Hoger onderwijs	20,6	(15,3-25,9)	21,0	(16,0-27,1)	412
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	18,2	(14,0-22,3)	17,0	(13,4-21,3)	467
	Brussels Gewest	20,3	(14,3-26,4)	19,3	(14,1-25,9)	213
	Waals Gewest	19,4	(14,0-24,7)	18,8	(14,0-24,7)	410
JAAR	**1997**	13,6	(9,9-17,3)	14,2	(10,8-18,5)	752
	2001	17,3	(14,2-20,4)	17,4	(14,5-20,7)	932
	2004	16,7	(14,0-19,4)	16,7	(14,2-19,7)	1380
	2008	14,9	(11,7-18,1)	14,7	(11,7-18,2)	1027
	2013	16,8	(13,4-20,2)	16,5	(13,4-20,1)	891
	2018	18,7	(15,6-21,8)	18,4	(15,6-21,6)	1090

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B100 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens aantal aandoeningen waaraan ze lijden °, België

MA_1		Geen	1	2	3 of meer	N
GESLACHT	**Mannen**	63,5	22,7	9,9	3,9	4662
	Vrouwen	57,6	25,8	11,3	5,4	5070
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	88,8	10,4	0,8	0,0	1057
	25 - 34	87,4	11,4	1,0	0,2	1338
	35 - 44	75,6	19,7	4,1	0,6	1576
	45 - 54	59,9	29,4	8,2	2,5	1720
	55 - 64	40,4	35,0	17,2	7,4	1664
	65 - 74	30,5	35,1	23,9	10,4	1286
	75 +	26,2	32,0	26,0	15,7	1091
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	42,0	26,9	16,4	14,6	721
	Lager secundair	47,8	27,5	17,3	7,5	1274
	Hoger secundair	58,9	25,7	11,5	3,8	2883
	Hoger onderwijs	67,7	22,2	7,1	3,0	4673
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	60,3	24,5	10,7	4,5	3628
	Brussels Gewest	68,7	20,4	7,7	3,2	2511
	Waals Gewest	58,2	25,2	11,2	5,3	3593
JAAR	**1997**	69,9	21,2	6,7	2,2	8521
	2001	66,3	22,3	8,3	3,1	9857
	2004	66,4	22,2	8,3	3,1	10908
	2013	64,4	22,1	9,4	4,1	9103
	2018	60,5	24,3	10,6	4,6	9732

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

° op een totaal van 6 chronische aandoeningen: chronisch longlijden, hartlijden, diabetes, artritis/artrose, hypertensie, kanker

Tabel B101 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met multimorbiditeit *, België

MA_2		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	13,7	(12,4-15,0)	7,7	(6,4-9,1)	4662
	Vrouwen	16,6	(15,3-18,0)	8,5	(7,1-10,1)	5070
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,8	(0,0-1,6)	0,8	(0,3-2,1)	1057
	25 - 34	1,3	(0,6-1,9)	1,3	(0,7-2,1)	1338
	35 - 44	4,7	(3,4-6,1)	4,7	(3,6-6,3)	1576
	45 - 54	10,7	(8,7-12,7)	10,7	(8,9-12,8)	1720
	55 - 64	24,6	(21,7-27,5)	24,6	(21,8-27,6)	1664
	65 - 74	34,3	(30,8-37,9)	34,3	(30,8-37,9)	1286
	75 +	41,8	(37,8-45,7)	41,5	(37,6-45,5)	1091
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	31,1	(26,2-36,0)	10,6	(7,9-14,0)	721
	Lager secundair	24,7	(21,5-28,0)	10,1	(8,1-12,6)	1274
	Hoger secundair	15,4	(13,7-17,1)	9,0	(7,4-10,8)	2883
	Hoger onderwijs	10,1	(8,8-11,4)	6,5	(5,4-7,8)	4673
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	15,2	(13,8-16,6)	7,6	(6,3-9,0)	3628
	Brussels Gewest	10,9	(9,5-12,2)	7,0	(5,8-8,4)	2511
	Waals Gewest	16,6	(14,7-18,4)	9,3	(7,7-11,1)	3593
JAAR	**1997**	8,9	(7,9-9,8)	6,1	(5,4-7,0)	8521
	2001	11,4	(10,5-12,4)	6,5	(5,8-7,2)	9857
	2004	11,5	(10,7-12,3)	6,4	(5,8-7,1)	10908
	2013	13,5	(12,4-14,5)	7,2	(6,5-8,0)	9103
	2018	15,2	(14,2-16,2)	8,1	(7,3-8,9)	9732

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Meer dan één van de volgende aandoeningen: chronisch longlijden, hartlijden, diabetes, artritis/artrose, hypertensie, kanker

Tabel B102 Gemiddeld aantal chronische aandoeningen bij personen van 15 jaar en ouder (op een totaal van 25 aandoeningen°), België

MA_3		Gemiddelde (Ruw)	95% BI gemid	Gemiddelde (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,2	(1,1-1,2)	1,2	(1,1-1,3)	4655
	Vrouwen	1,7	(1,6-1,7)	1,6	(1,6-1,7)	5059
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,6	(0,5-0,8)	0,7	(0,5-0,8)	1055
	25 - 34	0,8	(0,7-0,9)	0,8	(0,7-0,9)	1336
	35 - 44	1,1	(1,0-1,2)	1,1	(1,0-1,2)	1572
	45 - 54	1,4	(1,3-1,5)	1,4	(1,3-1,5)	1719
	55 - 64	1,8	(1,6-1,9)	1,8	(1,6-1,9)	1662
	65 - 74	2,1	(2,0-2,3)	2,1	(2,0-2,3)	1284
	75 +	2,6	(2,4-2,8)	2,5	(2,3-2,7)	1086
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	2,2	(1,9-2,5)	1,8	(1,5-2,1)	718
	Lager secundair	1,8	(1,6-1,9)	1,5	(1,4-1,7)	1270
	Hoger secundair	1,4	(1,3-1,5)	1,5	(1,4-1,6)	2879
	Hoger onderwijs	1,2	(1,1-1,2)	1,3	(1,2-1,3)	4667
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	1,4	(1,3-1,5)	1,4	(1,3-1,4)	3618
	Brussels Gewest	1,2	(1,1-1,3)	1,3	(1,3-1,4)	2509
	Waals Gewest	1,5	(1,4-1,6)	1,5	(1,4-1,6)	3587
JAAR	**2001**	1,1	(1,1-1,2)	1,2	(1,2-1,3)	9764
	2004	1,1	(1,1-1,2)	1,2	(1,1-1,2)	10529
	2013	1,2	(1,1-1,2)	1,2	(1,2-1,3)	9084
	2018	1,4	(1,4-1,5)	1,4	(1,4-1,5)	9714

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

° Astma, chronisch longlijden, hartlijden, hoge bloeddruk, beroerte, artritis/artrose, diabetes, allergie, maagzweer, chronische darmproblemen, leverlijden, galstenen/ontsteking van de galblaas, kanker, ernstige hoofdpijn, depressie, schildklierlijden, glaucoom, cataract, ziekte van Parkinson, epilepsie, ernstig nierlijden/nierstenen, chronische blaasontsteking, chronische vermoeidheid, osteoporose, ernstige huidziekte

Tabel B103 Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder volgens aantal aandoeningen waaraan ze lijden °, België

MA_10		Geen	1	2	3 of meer	N
GESLACHT	**Mannen**	31,8	31,7	24,0	12,4	1090
	Vrouwen	25,8	35,1	25,6	13,4	1287
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	30,5	35,1	23,9	10,4	1286
	75 +	26,2	32,0	26,0	15,7	1091
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	25,4	32,7	19,0	22,8	381
	Lager secundair	28,5	30,4	28,5	12,6	506
	Hoger secundair	30,5	34,0	25,2	10,4	619
	Hoger onderwijs	28,6	36,3	23,9	11,2	816
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	29,5	34,3	23,4	12,7	976
	Brussels Gewest	28,7	34,5	24,8	12,0	502
	Waals Gewest	26,3	32,1	27,8	13,7	899
JAAR	**1997**	31,9	37,5	21,2	9,3	1757
	2001	29,1	36,8	23,1	11,0	2053
	2004	31,3	35,4	22,6	10,8	3376
	2013	31,0	32,9	23,3	12,8	2021
	2018	28,4	33,7	24,9	13,0	2377

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

° op een totaal van 6 chronische aandoeningen: chronisch longlijden, hartlijden, diabetes, artritis/artrose, hypertensie, kanker

Tabel B104 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met multimorbiditeit *, België

MA_20		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	36,4	(32,5-40,3)	36,6	(32,8-40,5)	1090
	Vrouwen	39,1	(35,6-42,6)	38,7	(35,3-42,2)	1287
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	34,3	(30,8-37,9)	34,4	(31,0-38,0)	1286
	75 +	41,8	(37,8-45,7)	41,7	(37,8-45,7)	1091
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	41,9	(35,0-48,8)	40,0	(33,4-47,0)	381
	Lager secundair	41,1	(35,3-46,8)	40,5	(34,9-46,3)	506
	Hoger secundair	35,6	(31,0-40,2)	35,6	(31,2-40,3)	619
	Hoger onderwijs	35,1	(30,2-39,9)	35,9	(31,1-41,0)	816
VERBLIJFPLAATS	**Vlaams Gewest**	36,2	(32,6-39,7)	36,0	(32,5-39,6)	976
	Brussels Gewest	36,8	(31,9-41,6)	36,4	(31,8-41,4)	502
	Waals Gewest	41,5	(36,8-46,2)	41,5	(36,8-46,3)	899
JAAR	**1997**	30,6	(26,4-34,7)	30,9	(26,9-35,2)	1757
	2001	34,1	(31,1-37,1)	34,0	(31,1-36,9)	2053
	2004	33,4	(30,9-35,8)	33,3	(31,0-35,8)	3376
	2013	36,1	(33,1-39,1)	35,7	(32,8-38,7)	2021
	2018	37,9	(35,3-40,6)	37,7	(35,1-40,4)	2377

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)
Meer dan één van de volgende aandoeningen: chronisch longlijden, hartlijden, diabetes, artritis/artrose, hypertensie, kanker

Tabel B105 Gemiddeld aantal chronische aandoeningen bij personen van 65 jaar en ouder (op een totaal van 25 aandoeningen°), België

MA_30		Gemiddelde (Ruw)	95% BI gemid	Gemiddelde (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	Mannen	2,0	(1,8-2,2)	2,0	(1,8-2,2)	1087
	Vrouwen	2,6	(2,5-2,8)	2,6	(2,4-2,7)	1283
LEEFTIJDSGROEP	65 - 74	2,1	(2,0-2,3)	2,1	(2,0-2,3)	1284
	75 +	2,6	(2,4-2,8)	2,5	(2,3-2,7)	1086
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager/geen diploma	2,8	(2,4-3,2)	2,7	(2,2-3,1)	378
	Lager secundair	2,4	(2,2-2,7)	2,4	(2,1-2,6)	505
	Hoger secundair	2,2	(2,0-2,4)	2,2	(2,0-2,4)	619
	Hoger onderwijs	2,2	(2,0-2,4)	2,3	(2,1-2,4)	814
VERBLIJFPLAATS	Vlaams Gewest	2,3	(2,1-2,5)	2,3	(2,1-2,5)	971
	Brussels Gewest	2,4	(2,2-2,6)	2,4	(2,2-2,6)	501
	Waals Gewest	2,4	(2,2-2,6)	2,4	(2,2-2,6)	898
JAAR	2001	2,2	(2,1-2,4)	2,2	(2,1-2,3)	2020
	2004	2,1	(2,0-2,2)	2,1	(2,0-2,2)	3194
	2013	2,2	(2,1-2,4)	2,2	(2,1-2,3)	2009
	2018	2,3	(2,2-2,5)	2,3	(2,2-2,5)	2370

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

° Astma, chronisch longlijden, hartlijden, hoge bloeddruk, beroerte, artritis/artrose, diabetes, allergie, maagzweer, chronische darmproblemen, leverlijden, galstenen/ontsteking van de galblaas, kanker, ernstige hoofdpijn, depressie, schildklierlijden, glaucoom, cataract, ziekte van Parkinson, epilepsie, ernstig nierlijden/nierstenen, chronische blaasontsteking, chronische vermoeidheid, osteoporose, ernstige huidziekte

Tabel B106 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een zelfgerapporteerde chronische ziekte of aandoening, Vlaams Gewest

MA_SH02		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	26,5	(23,9-29,1)	25,0	(22,4-27,8)	1540
	Vrouwen	28,6	(25,9-31,2)	26,4	(23,7-29,3)	1662
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	14,6	(8,9-20,3)	14,6	(9,7-21,3)	287
	25 - 34	15,1	(10,9-19,2)	15,0	(11,4-19,7)	385
	35 - 44	22,7	(18,3-27,1)	22,7	(18,6-27,4)	478
	45 - 54	28,5	(24,0-33,0)	28,5	(24,3-33,2)	589
	55 - 64	34,0	(28,9-39,1)	34,0	(29,1-39,3)	606
	65 - 74	36,4	(31,5-41,3)	36,4	(31,6-41,4)	469
	75 +	40,9	(35,3-46,6)	40,8	(35,3-46,5)	388
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	46,7	(37,9-55,6)	38,0	(29,5-47,3)	159
	Lager secundair	32,3	(26,7-37,9)	25,9	(21,0-31,5)	392
	Hoger secundair	29,5	(26,1-32,9)	27,7	(24,4-31,4)	1090
	Hoger onderwijs	23,3	(20,7-26,0)	23,3	(20,6-26,2)	1536
JAAR	**2001**	20,6	(18,9-22,3)	19,9	(18,3-21,7)	3240
	2004	22,1	(20,4-23,9)	21,1	(19,4-23,0)	3394
	2008	25,7	(23,6-27,7)	24,1	(22,1-26,1)	2897
	2013	26,3	(24,1-28,5)	23,7	(21,6-25,9)	2456
	2018	27,6	(25,6-29,5)	24,8	(22,9-26,9)	3202

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B107 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met astma in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA01_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	4,1	(3,1-5,1)	4,0	(3,1-5,1)	1769
	Vrouwen	5,0	(3,7-6,3)	4,7	(3,7-6,1)	1870
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	6,9	(3,7-10,2)	6,9	(4,3-10,9)	380
	25 - 34	3,1	(1,5-4,6)	3,1	(1,8-5,1)	452
	35 - 44	4,2	(2,0-6,5)	4,2	(2,5-7,1)	534
	45 - 54	3,1	(1,6-4,6)	3,1	(1,9-5,0)	639
	55 - 64	6,0	(4,0-8,0)	6,0	(4,3-8,4)	654
	65 - 74	3,3	(1,7-4,9)	3,3	(2,0-5,3)	519
	75 +	5,8	(2,9-8,7)	5,7	(3,5-9,2)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	6,3	(3,0-9,7)	5,8	(3,2-10,2)	205
	Lager secundair	5,9	(3,1-8,8)	5,6	(3,6-8,7)	459
	Hoger secundair	5,1	(3,6-6,6)	4,9	(3,6-6,6)	1223
	Hoger onderwijs	3,7	(2,7-4,8)	3,6	(2,7-4,8)	1723
JAAR	**2001**	3,6	(2,9-4,4)	3,6	(2,9-4,4)	3476
	2004	3,1	(2,4-3,8)	3,1	(2,4-3,8)	3937
	2008	3,0	(2,2-3,8)	2,9	(2,3-3,8)	3397
	2013	3,3	(2,5-4,1)	3,2	(2,5-4,1)	2991
	2018	4,6	(3,7-5,4)	4,4	(3,7-5,3)	3639

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B108 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met chronisch longlijden in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA02_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	3,8	(2,7-4,9)	3,1	(2,2-4,3)	1768
	Vrouwen	3,5	(2,5-4,4)	2,6	(1,9-3,6)	1868
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	1,4	(0,0-2,8)	1,4	(0,5-3,7)	378
	25 - 34	1,5	(0,1-2,9)	1,5	(0,6-3,8)	452
	35 - 44	1,5	(0,4-2,6)	1,5	(0,7-3,1)	534
	45 - 54	3,1	(1,6-4,6)	3,1	(1,9-5,0)	639
	55 - 64	5,2	(3,2-7,3)	5,2	(3,5-7,7)	654
	65 - 74	4,9	(2,5-7,3)	4,9	(3,0-8,0)	518
	75 +	8,6	(5,3-11,8)	8,7	(5,9-12,5)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	11,0	(5,3-16,7)	6,9	(3,9-12,1)	205
	Lager secundair	7,2	(4,3-10,2)	5,0	(3,1-8,1)	459
	Hoger secundair	3,5	(2,3-4,6)	3,0	(2,1-4,3)	1221
	Hoger onderwijs	1,9	(1,2-2,6)	1,8	(1,2-2,8)	1722
JAAR	**2001**	4,7	(3,8-5,5)	4,2	(3,5-5,0)	3474
	2004	4,6	(3,8-5,3)	4,0	(3,4-4,8)	3941
	2008	3,3	(2,7-4,0)	2,8	(2,3-3,5)	3388
	2013	3,3	(2,6-4,1)	2,7	(2,1-3,4)	2991
	2018	3,6	(2,9-4,3)	2,9	(2,3-3,5)	3636

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B109 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hartinfarct in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA03_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,9	(0,3-1,5)	0,6	(0,3-1,2)	1769
	Vrouwen	0,3	(0,1-0,5)	0,2	(0,1-0,4)	1870
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	380
	25 - 34	0,0	.	.	.	452
	35 - 44	0,2	(0,0-0,5)	0,1	(0,0-1,0)	534
	45 - 54	0,2	(0,0-0,6)	0,2	(0,0-1,1)	639
	55 - 64	0,6	(0,0-1,2)	0,5	(0,2-1,3)	654
	65 - 74	1,4	(0,3-2,5)	1,1	(0,5-2,7)	519
	75 +	2,3	(0,2-4,5)	2,1	(0,9-4,7)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	2,8	(0,0-7,2)	0,8	(0,2-3,1)	205
	Lager secundair	1,1	(0,1-2,1)	0,4	(0,1-1,5)	459
	Hoger secundair	0,8	(0,3-1,2)	0,4	(0,2-0,9)	1223
	Hoger onderwijs	0,1	(0,0-0,3)	0,2	(0,1-0,5)	1723
JAAR	**2008**	0,6	(0,3-0,8)	0,4	(0,3-0,7)	3393
	2013	0,9	(0,4-1,3)	0,6	(0,4-1,2)	2991
	2018	0,6	(0,3-0,9)	0,4	(0,2-0,7)	3639

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B110 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met coronaire hartziekte in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA04_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,7	(0,9-2,5)	1,0	(0,5-1,8)	1768
	Vrouwen	0,9	(0,3-1,6)	0,4	(0,2-1,0)	1869
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	380
	25 - 34	0,0	.	.	.	452
	35 - 44	0,0	.	.	.	534
	45 - 54	0,5	(0,0-1,1)	0,5	(0,2-1,4)	639
	55 - 64	2,4	(0,4-4,3)	2,1	(0,8-5,6)	653
	65 - 74	2,3	(0,9-3,7)	2,2	(1,2-4,0)	518
	75 +	4,5	(1,8-7,2)	4,5	(2,5-7,9)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	0,4	(0,0-1,2)	0,1	(0,0-0,7)	203
	Lager secundair	2,8	(1,1-4,5)	0,8	(0,3-1,9)	459
	Hoger secundair	2,0	(0,8-3,2)	0,9	(0,5-1,8)	1223
	Hoger onderwijs	0,6	(0,2-1,0)	0,5	(0,2-1,0)	1723
JAAR	**2008**	2,0	(1,4-2,6)	1,1	(0,7-1,7)	3386
	2013	1,3	(0,7-1,9)	0,7	(0,4-1,2)	2990
	2018	1,3	(0,8-1,8)	0,7	(0,4-1,0)	3637

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B111 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ernstige hartziekte (uitgezonderd hartinfarct of coronaire hartziekte) in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA05_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	4,3	(3,1-5,5)	2,0	(1,3-3,1)	1769
	Vrouwen	3,7	(2,7-4,8)	1,5	(0,9-2,3)	1870
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	380
	25 - 34	0,6	(0,0-1,4)	0,6	(0,1-2,3)	452
	35 - 44	0,6	(0,0-1,1)	0,6	(0,2-1,5)	534
	45 - 54	2,1	(0,9-3,3)	2,1	(1,1-3,7)	639
	55 - 64	5,8	(3,6-7,9)	5,7	(3,9-8,2)	654
	65 - 74	5,8	(3,3-8,3)	5,8	(3,7-8,8)	519
	75 +	15,5	(11,2-19,7)	15,7	(11,9-20,5)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	12,0	(6,0-17,9)	2,6	(1,2-5,2)	205
	Lager secundair	7,8	(4,6-11,1)	2,1	(1,2-3,9)	459
	Hoger secundair	3,0	(1,9-4,1)	1,3	(0,8-2,2)	1223
	Hoger onderwijs	2,9	(2,0-3,8)	1,8	(1,2-2,8)	1723
JAAR	**2013**	2,4	(1,8-3,1)	1,2	(0,8-1,7)	2991
	2018	4,0	(3,2-4,8)	1,9	(1,4-2,6)	3639

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B112 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoge bloeddruk in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA06_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	18,3	(16,2-20,4)	11,4	(9,4-13,8)	1767
	Vrouwen	17,6	(15,7-19,6)	10,0	(8,3-12,1)	1869
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	1,4	(0,2-2,5)	1,4	(0,6-3,1)	378
	25 - 34	1,7	(0,4-3,0)	1,7	(0,8-3,7)	452
	35 - 44	7,9	(5,4-10,4)	7,9	(5,7-10,8)	533
	45 - 54	17,1	(13,6-20,7)	17,0	(13,8-20,9)	639
	55 - 64	27,1	(22,9-31,2)	27,0	(23,1-31,3)	654
	65 - 74	35,8	(31,0-40,6)	35,8	(31,2-40,8)	519
	75 +	38,7	(33,5-44,0)	39,0	(33,9-44,4)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	34,1	(26,0-42,2)	13,7	(9,7-19,0)	205
	Lager secundair	26,6	(21,8-31,4)	11,6	(8,8-15,1)	459
	Hoger secundair	18,1	(15,7-20,6)	11,1	(8,9-13,7)	1222
	Hoger onderwijs	13,8	(11,8-15,8)	9,9	(8,1-12,1)	1721
JAAR	**1997**	9,7	(8,4-11,0)	8,0	(6,8-9,4)	2981
	2001	13,9	(12,3-15,5)	9,8	(8,6-11,2)	3468
	2004	14,8	(13,5-16,1)	10,2	(9,1-11,5)	3939
	2008	15,5	(13,9-17,1)	10,3	(9,1-11,6)	3363
	2013	17,3	(15,5-19,1)	11,3	(9,9-12,8)	2990
	2018	17,9	(16,5-19,4)	11,4	(10,2-12,7)	3636

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B113 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoge bloeddruk dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet te hebben gevolgd, Vlaams Gewest

MA06_3		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	18,3	(13,2-23,3)	16,9	(10,8-25,5)	351
	Vrouwen	18,0	(13,5-22,4)	17,2	(10,8-26,4)	360
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	6
	25 - 34	0,0	.	.	.	8
	35 - 44	25,8	(9,3-42,4)	25,9	(13,4-44,0)	43
	45 - 54	15,0	(7,1-22,9)	15,0	(8,9-24,4)	106
	55 - 64	19,5	(12,5-26,4)	19,5	(13,5-27,3)	177
	65 - 74	14,4	(8,5-20,3)	14,4	(9,5-21,2)	179
	75 +	22,2	(14,2-30,1)	22,1	(15,2-31,0)	192
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	20,8	(7,2-34,4)	16,8	(7,2-34,3)	73
	Lager secundair	12,8	(6,3-19,3)	11,2	(5,6-21,3)	134
	Hoger secundair	18,4	(12,7-24,1)	17,7	(10,9-27,4)	256
	Hoger onderwijs	18,9	(13,0-24,7)	17,6	(10,9-27,1)	239
JAAR	**2001**	32,7	(26,6-38,8)	30,7	(24,1-38,2)	445
	2008	20,6	(15,3-25,9)	18,8	(13,6-25,4)	425
	2013	19,0	(14,2-23,7)	17,2	(12,4-23,2)	530
	2018	18,1	(14,7-21,6)	16,7	(12,7-21,5)	711

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B114 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoge bloeddruk dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden geneesmiddelen te hebben genomen, Vlaams Gewest

MA06_4		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	87,0	(82,8-91,2)	79,4	(70,4-86,1)	351
	Vrouwen	90,5	(87,1-93,8)	82,6	(74,6-88,4)	360
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	50,5	(0,0-100,0)	51,5	(16,4-85,1)	6
	25 - 34	57,8	(0,0-100,0)	57,1	(20,8-87,1)	8
	35 - 44	68,3	(51,6-85,0)	68,9	(51,5-82,2)	43
	45 - 54	81,0	(71,8-90,1)	81,4	(71,3-88,5)	106
	55 - 64	93,7	(89,9-97,5)	93,8	(88,9-96,6)	177
	65 - 74	92,3	(88,3-96,2)	92,2	(87,2-95,4)	179
	75 +	93,9	(89,9-97,9)	93,8	(88,4-96,8)	192
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	89,4	(81,5-97,3)	70,0	(46,1-86,4)	73
	Lager secundair	90,2	(83,9-96,4)	77,5	(60,6-88,5)	134
	Hoger secundair	87,8	(83,2-92,4)	80,9	(71,7-87,6)	256
	Hoger onderwijs	88,7	(84,1-93,3)	83,7	(74,5-90,0)	239
JAAR	**1997**	78,0	(72,7-83,4)	74,5	(67,2-80,6)	358
	2001	78,2	(73,5-83,0)	67,0	(59,2-73,9)	495
	2008	81,7	(77,1-86,3)	69,2	(61,4-76,1)	416
	2013	90,1	(87,1-93,0)	83,4	(77,7-87,9)	530
	2018	88,7	(86,1-91,4)	80,7	(75,6-85,0)	711

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B115 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoge bloeddruk volgens de behandeling van de aandoening, Vlaams Gewest

MA06_5		Geen behandeling	Enkel dieet	Medicamenteuze behandeling	N
GESLACHT	**Mannen**	10,2	2,8	87,0	351
	Vrouwen	8,2	1,4	90,5	360
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	49,5	0.0	50,5	6
	25 - 34	42,2	0.0	57,8	8
	35 - 44	29,3	2,4	68,3	43
	45 - 54	12,5	6,6	81,0	106
	55 - 64	5,1	1,2	93,7	177
	65 - 74	7,1	0,7	92,3	179
	75 +	4,6	1,5	93,9	192
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	9,6	1,0	89,4	73
	Lager secundair	7,6	2,2	90,2	134
	Hoger secundair	10,0	2,2	87,8	256
	Hoger onderwijs	9,0	2,3	88,7	239
JAAR	**2001**	11,4	4,5	84,1	458
	2008	16,6	1,7	81,7	416
	2013	8,7	1,2	90,1	530
	2018	9,2	2,1	88,7	711

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

Tabel B116 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA07_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	20,2	(18,0-22,4)	14,3	(11,7-17,3)	1758
	Vrouwen	17,7	(15,7-19,6)	11,2	(9,2-13,5)	1867
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	1,6	(0,0-3,4)	1,6	(0,5-4,7)	377
	25 - 34	4,3	(2,1-6,6)	4,3	(2,5-7,2)	450
	35 - 44	8,5	(5,6-11,5)	8,4	(6,0-11,8)	533
	45 - 54	16,0	(12,7-19,3)	15,8	(12,8-19,4)	635
	55 - 64	27,9	(23,7-32,0)	27,8	(23,8-32,1)	652
	65 - 74	39,8	(34,9-44,7)	39,9	(35,0-44,9)	518
	75 +	38,9	(33,3-44,5)	39,4	(33,9-45,1)	460
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	29,9	(22,0-37,8)	13,0	(8,8-18,6)	203
	Lager secundair	31,1	(26,0-36,2)	15,8	(12,2-20,2)	456
	Hoger secundair	19,1	(16,4-21,9)	13,1	(10,4-16,3)	1218
	Hoger onderwijs	14,4	(12,4-16,4)	11,5	(9,4-14,0)	1720
JAAR	**2013**	17,4	(15,7-19,2)	12,0	(10,4-13,8)	2987
	2018	18,9	(17,3-20,5)	12,7	(11,2-14,5)	3625

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B117 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet te hebben gevolgd, Vlaams Gewest

MA07_3		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	25,3	(20,1-30,4)	29,7	(21,7-39,1)	379
	Vrouwen	27,7	(22,4-32,9)	32,8	(24,1-42,8)	368
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	64,3	(24,9-100,0)	64,8	(18,9-93,6)	5
	25 - 34	21,3	(0,0-46,0)	21,2	(7,6-47,1)	17
	35 - 44	42,4	(24,0-60,9)	43,0	(26,6-61,1)	45
	45 - 54	25,6	(16,5-34,7)	25,9	(17,8-36,2)	97
	55 - 64	18,5	(12,6-24,4)	18,6	(13,5-25,2)	196
	65 - 74	29,1	(22,3-36,0)	29,1	(22,8-36,3)	210
	75 +	26,4	(17,7-35,1)	26,3	(18,5-35,8)	177
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	21,8	(6,4-37,1)	24,2	(11,0-45,0)	63
	Lager secundair	22,1	(14,9-29,4)	26,6	(16,8-39,5)	152
	Hoger secundair	24,8	(18,6-31,0)	28,5	(20,0-38,7)	265
	Hoger onderwijs	31,0	(24,5-37,6)	35,7	(25,8-46,9)	258
JAAR	**2013**	28,3	(23,2-33,4)	29,3	(22,9-36,6)	534
	2018	26,4	(22,6-30,2)	27,0	(21,1-34,0)	747

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B118 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden geneesmiddelen te hebben genomen, Vlaams Gewest

MA07_4		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	74,5	(69,1-79,9)	64,5	(53,5-74,2)	379
	Vrouwen	72,1	(66,5-77,6)	53,1	(42,5-63,4)	368
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	52,0	(20,1-83,8)	50,3	(11,7-88,6)	5
	25 - 34	21,8	(0,0-46,3)	21,7	(7,2-49,7)	17
	35 - 44	34,5	(16,4-52,7)	32,6	(18,2-51,2)	45
	45 - 54	49,9	(38,6-61,3)	48,4	(37,3-59,7)	97
	55 - 64	73,9	(66,4-81,4)	73,4	(65,1-80,4)	196
	65 - 74	84,8	(79,2-90,4)	85,1	(78,9-89,8)	210
	75 +	93,3	(89,3-97,3)	93,6	(88,5-96,5)	177
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	88,8	(80,8-96,9)	68,8	(46,2-85,0)	63
	Lager secundair	83,9	(76,8-91,1)	61,2	(45,0-75,2)	152
	Hoger secundair	76,3	(69,8-82,9)	64,4	(52,9-74,5)	265
	Hoger onderwijs	62,4	(55,1-69,6)	52,1	(41,2-62,8)	258
JAAR	**2013**	77,7	(73,3-82,1)	62,5	(53,8-70,4)	534
	2018	73,3	(69,4-77,3)	55,7	(47,0-64,0)	747

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B119 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed volgens de behandeling van de aandoening, Vlaams Gewest

MA07_5		Geen behandeling	Enkel dieet	Medicamenteuze behandeling	N
GESLACHT	**Mannen**	18,9	6,7	74,5	379
	Vrouwen	19,8	8,2	72,1	368
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	35,7	12,3	52,0	5
	25 - 34	56,8	21,3	21,8	17
	35 - 44	33,6	31,8	34,5	45
	45 - 54	38,4	11,6	49,9	97
	55 - 64	23,0	3,1	73,9	196
	65 - 74	11,3	3,9	84,8	210
	75 +	2,8	3,9	93,3	177
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	6,3	4,8	88,8	63
	Lager secundair	13,1	3,0	83,9	152
	Hoger secundair	18,0	5,6	76,3	265
	Hoger onderwijs	26,2	11,4	62,4	258
JAAR	**2013**	16,4	6,0	77,7	534
	2018	19,3	7,4	73,3	747

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

Tabel B120 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met beroerte in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA08_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,0	(0,4-1,6)	0,7	(0,4-1,4)	1769
	Vrouwen	0,1	(0,0-0,3)	0,1	(0,0-0,2)	1869
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	380
	25 - 34	0,0	.	.	.	452
	35 - 44	0,0	.	.	.	534
	45 - 54	0,1	(0,0-0,4)	0,1	(0,0-0,6)	639
	55 - 64	0,8	(0,0-1,5)	0,4	(0,1-1,4)	653
	65 - 74	1,9	(0,7-3,1)	1,1	(0,6-2,3)	519
	75 +	1,5	(0,0-3,5)	1,0	(0,3-3,4)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	3,0	(0,0-7,3)	0,8	(0,2-2,5)	205
	Lager secundair	1,1	(0,2-2,0)	0,3	(0,1-1,0)	459
	Hoger secundair	0,4	(0,1-0,7)	0,1	(0,0-0,4)	1223
	Hoger onderwijs	0,3	(0,0-0,6)	0,2	(0,1-0,5)	1722
JAAR	**1997**	0,6	(0,3-0,9)	0,7	(0,4-1,3)	2981
	2001	0,4	(0,2-0,7)	0,3	(0,2-0,6)	3479
	2004	0,6	(0,3-0,8)	0,5	(0,3-0,7)	3934
	2008	0,8	(0,4-1,1)	0,5	(0,3-0,9)	3397
	2013	0,8	(0,5-1,2)	0,6	(0,4-1,0)	2991
	2018	0,6	(0,2-0,9)	0,4	(0,2-0,7)	3638

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B121 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met vernauwing van de bloedvaten in de buik of de benen in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA09_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	2,5	(1,6-3,4)	1,5	(0,9-2,5)	1767
	Vrouwen	2,3	(1,5-3,0)	1,2	(0,8-2,0)	1863
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	380
	25 - 34	0,6	(0,0-1,4)	0,6	(0,1-2,4)	452
	35 - 44	1,0	(0,0-2,5)	1,0	(0,3-4,0)	533
	45 - 54	1,3	(0,5-2,1)	1,3	(0,7-2,4)	639
	55 - 64	2,7	(1,3-4,1)	2,7	(1,6-4,5)	654
	65 - 74	3,9	(2,2-5,6)	3,9	(2,5-6,0)	518
	75 +	8,5	(5,1-11,8)	8,6	(5,8-12,6)	454
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	8,1	(2,8-13,4)	2,7	(1,3-5,8)	205
	Lager secundair	5,4	(2,9-7,8)	2,3	(1,2-4,3)	455
	Hoger secundair	2,0	(1,2-2,7)	1,2	(0,7-2,1)	1221
	Hoger onderwijs	1,3	(0,7-2,0)	1,1	(0,6-2,0)	1721
JAAR	**2013**	2,7	(2,0-3,5)	1,4	(1,0-2,1)	2990
	2018	2,4	(1,8-2,9)	1,2	(0,8-1,8)	3630

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B122 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met reumatoïde artritis in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA10_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	7,4	(6,0-8,8)	5,7	(4,5-7,3)	1767
	Vrouwen	11,6	(10,0-13,2)	8,8	(7,2-10,7)	1868
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	2,7	(0,5-4,9)	2,7	(1,2-5,8)	378
	25 - 34	2,2	(0,5-3,9)	2,1	(1,0-4,7)	452
	35 - 44	5,2	(3,0-7,4)	5,1	(3,4-7,8)	534
	45 - 54	8,7	(6,1-11,3)	8,6	(6,4-11,5)	639
	55 - 64	13,7	(10,8-16,7)	13,6	(10,9-16,8)	652
	65 - 74	17,7	(14,0-21,5)	17,4	(14,0-21,4)	519
	75 +	18,6	(14,2-23,0)	17,8	(14,0-22,4)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	16,4	(10,2-22,7)	8,6	(5,4-13,4)	204
	Lager secundair	15,5	(11,5-19,4)	8,9	(6,3-12,5)	459
	Hoger secundair	9,5	(7,6-11,4)	7,4	(5,7-9,4)	1221
	Hoger onderwijs	7,2	(5,8-8,5)	6,3	(4,9-7,9)	1722
JAAR	**1997**	5,1	(4,1-6,1)	4,6	(3,7-5,7)	2980
	2001	7,3	(6,2-8,4)	5,5	(4,7-6,5)	3478
	2004	6,7	(5,8-7,7)	5,0	(4,2-5,8)	3934
	2008	7,0	(6,0-8,0)	5,0	(4,3-5,8)	3364
	2013	8,9	(7,7-10,2)	6,2	(5,3-7,4)	2991
	2018	9,6	(8,4-10,7)	6,6	(5,7-7,6)	3635

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B123 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met artrose in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA11_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	14,6	(12,6-16,6)	8,9	(7,2-10,9)	1767
	Vrouwen	22,1	(20,0-24,3)	13,8	(11,3-16,7)	1866
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	1,5	(0,0-3,0)	1,4	(0,5-3,9)	378
	25 - 34	2,3	(0,7-3,9)	2,2	(1,1-4,4)	452
	35 - 44	8,1	(5,4-10,9)	8,0	(5,7-11,2)	534
	45 - 54	15,3	(11,8-18,9)	15,2	(12,0-19,2)	637
	55 - 64	28,6	(24,3-32,9)	28,4	(24,2-33,0)	653
	65 - 74	36,7	(32,2-41,3)	36,3	(32,0-40,9)	519
	75 +	41,4	(36,0-46,8)	40,3	(35,0-45,8)	460
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	31,5	(23,5-39,5)	12,0	(8,1-17,4)	205
	Lager secundair	31,4	(26,3-36,6)	14,3	(10,8-18,7)	458
	Hoger secundair	19,5	(16,8-22,2)	12,4	(9,8-15,6)	1221
	Hoger onderwijs	13,1	(11,1-15,0)	9,5	(7,7-11,6)	1720
JAAR	**1997**	13,2	(11,5-14,9)	11,0	(9,3-13,0)	2983
	2001	14,5	(13,0-16,0)	9,6	(8,5-10,9)	3472
	2004	12,6	(11,4-13,9)	7,9	(6,9-9,0)	3927
	2008	15,1	(13,5-16,7)	9,5	(8,3-10,8)	3315
	2013	17,0	(15,3-18,6)	10,3	(9,0-11,7)	2991
	2018	18,4	(16,9-20,0)	11,0	(9,8-12,4)	3633

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B124 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een lage rugprobleem in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA12_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	26,1	(23,7-28,6)	24,7	(22,2-27,2)	1768
	Vrouwen	28,6	(26,1-31,0)	26,7	(24,2-29,4)	1868
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	10,3	(6,8-13,8)	10,3	(7,3-14,5)	378
	25 - 34	18,8	(14,4-23,3)	18,8	(14,8-23,7)	452
	35 - 44	24,4	(20,0-28,8)	24,4	(20,3-29,1)	534
	45 - 54	31,4	(27,1-35,8)	31,5	(27,3-36,0)	638
	55 - 64	36,2	(32,1-40,4)	36,2	(32,2-40,5)	654
	65 - 74	33,7	(29,3-38,2)	33,7	(29,3-38,3)	519
	75 +	35,4	(29,5-41,3)	35,2	(29,6-41,3)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	35,4	(26,7-44,2)	29,5	(21,9-38,5)	205
	Lager secundair	30,2	(25,2-35,3)	25,5	(21,0-30,6)	458
	Hoger secundair	31,3	(27,9-34,6)	29,8	(26,6-33,3)	1222
	Hoger onderwijs	23,0	(20,7-25,4)	22,5	(20,1-25,1)	1722
JAAR	**2008**	21,6	(19,8-23,4)	20,5	(18,8-22,3)	3302
	2013	23,1	(21,2-24,9)	21,6	(19,8-23,5)	2990
	2018	27,4	(25,6-29,2)	25,7	(23,9-27,5)	3636

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B125 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een nekprobleem in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA13_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	12,0	(10,2-13,8)	10,8	(9,1-12,7)	1767
	Vrouwen	19,9	(17,7-22,2)	18,3	(16,0-20,8)	1869
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	5,2	(2,2-8,3)	5,1	(2,8-9,0)	378
	25 - 34	9,8	(6,4-13,3)	9,5	(6,6-13,4)	452
	35 - 44	14,4	(10,1-18,8)	14,1	(10,3-19,0)	534
	45 - 54	21,8	(17,7-25,9)	21,7	(17,8-26,1)	639
	55 - 64	21,0	(17,1-24,9)	20,7	(17,0-24,9)	654
	65 - 74	20,2	(16,2-24,3)	19,6	(16,0-23,8)	519
	75 +	17,7	(13,5-21,9)	16,6	(12,9-21,0)	460
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	17,9	(11,3-24,5)	14,7	(9,6-22,0)	205
	Lager secundair	20,4	(16,0-24,8)	16,9	(13,1-21,6)	459
	Hoger secundair	16,1	(13,6-18,6)	14,4	(12,2-17,1)	1222
	Hoger onderwijs	14,6	(12,3-16,9)	13,2	(11,0-15,7)	1722
JAAR	**2008**	11,4	(10,1-12,7)	9,9	(8,8-11,2)	3344
	2013	12,2	(10,9-13,6)	10,5	(9,3-11,9)	2990
	2018	16,0	(14,5-17,6)	14,0	(12,5-15,6)	3636

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B126 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA14_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	6,3	(4,9-7,6)	4,3	(3,1-5,9)	1768
	Vrouwen	4,7	(3,7-5,7)	2,9	(2,1-3,8)	1870
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	1,6	(0,0-3,6)	1,5	(0,4-5,2)	380
	25 - 34	1,0	(0,2-1,8)	1,0	(0,4-2,2)	452
	35 - 44	2,1	(0,7-3,6)	2,1	(1,0-4,1)	534
	45 - 54	2,7	(1,5-3,9)	2,6	(1,7-4,1)	638
	55 - 64	7,2	(4,8-9,5)	7,0	(5,0-9,7)	654
	65 - 74	11,7	(8,8-14,5)	11,6	(9,0-14,7)	519
	75 +	14,7	(11,1-18,3)	14,9	(11,6-19,0)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	14,6	(9,7-19,4)	5,8	(3,6-9,3)	205
	Lager secundair	9,0	(6,2-11,8)	4,1	(2,7-6,3)	459
	Hoger secundair	5,4	(3,9-6,9)	3,6	(2,5-5,3)	1222
	Hoger onderwijs	3,5	(2,5-4,5)	2,9	(2,1-4,0)	1723
JAAR	**1997**	2,1	(1,5-2,8)	1,8	(1,3-2,4)	2982
	2001	2,6	(2,0-3,2)	1,7	(1,3-2,2)	3461
	2004	3,6	(2,8-4,4)	2,3	(1,7-3,1)	3935
	2008	3,8	(3,1-4,6)	2,3	(1,8-2,9)	3382
	2013	5,0	(4,0-6,0)	3,0	(2,3-3,8)	2991
	2018	5,5	(4,6-6,3)	3,1	(2,5-3,9)	3638

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B127 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet volgde, Vlaams Gewest

MA14_3		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	63,1	(52,6-73,5)	66,0	(49,3-79,5)	115
	Vrouwen	63,6	(53,7-73,4)	64,6	(49,1-77,5)	107
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	52,2	.	51,4	(7,5-93,2)	3
	25 - 34	79,6	(16,3-100,0)	79,9	(29,2-97,5)	6
	35 - 44	63,2	(21,4-100,0)	63,4	(29,5-87,7)	11
	45 - 54	70,0	(51,1-88,9)	70,1	(47,5-85,8)	21
	55 - 64	60,9	(43,2-78,5)	60,6	(43,2-75,7)	48
	65 - 74	61,7	(48,9-74,4)	61,5	(48,2-73,3)	65
	75 +	64,4	(51,9-76,9)	64,4	(50,7-76,0)	68
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	53,7	(36,4-71,0)	53,6	(29,4-76,3)	35
	Lager secundair	62,4	(48,4-76,4)	62,9	(42,0-79,9)	48
	Hoger secundair	69,2	(57,7-80,7)	70,4	(53,0-83,4)	73
	Hoger onderwijs	64,0	(49,1-78,9)	65,3	(46,9-80,0)	62
JAAR	**2001**	72,1	(61,5-82,6)	77,3	(64,7-86,3)	98
	2008	63,1	(53,0-73,2)	67,7	(54,2-78,8)	160
	2013	57,1	(47,1-67,1)	62,0	(48,4-74,0)	164
	2018	63,3	(55,9-70,7)	67,6	(55,8-77,5)	222

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B128 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden medicamenteus behandeld werd, Vlaams Gewest

MA14_4		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	96,6	(93,0-100,0)	99,4	(98,4-99,8)	115
	Vrouwen	84,8	(77,4-92,3)	97,5	(94,7-98,8)	107
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	100	.	.	.	3
	25 - 34	55,7	(43,7-67,7)	66,1	(27,8-90,8)	6
	35 - 44	71,3	(36,0-100,0)	76,6	(46,1-92,6)	11
	45 - 54	97,8	(93,1-100,0)	98,3	(87,9-99,8)	21
	55 - 64	95,1	(88,1-100,0)	95,1	(82,7-98,7)	48
	65 - 74	91,5	(83,2-99,8)	91,9	(76,5-97,5)	65
	75 +	93,0	(85,8-100,0)	94,1	(83,7-98,0)	68
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	91,7	(82,3-100,0)	99,2	(95,2-99,9)	35
	Lager secundair	95,3	(88,7-100,0)	99,2	(95,9-99,8)	48
	Hoger secundair	96,5	(92,3-100,0)	99,5	(97,6-99,9)	73
	Hoger onderwijs	87,7	(78,4-97,0)	98,0	(95,9-99,1)	62
JAAR	**2001**	92,4	(86,4-98,4)	97,9	(95,2-99,1)	100
	2008	96,7	(94,1-99,3)	99,2	(98,2-99,7)	160
	2013	93,0	(88,3-97,7)	98,3	(96,5-99,2)	164
	2018	91,5	(87,4-95,5)	98,0	(96,7-98,8)	222

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B129 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden insuline gebruikte, Vlaams Gewest

MA14_5		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	38,1	(27,4-48,8)	86,0	(78,4-91,2)	115
	Vrouwen	29,7	(19,9-39,5)	83,7	(74,3-90,2)	107
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	100	.	.	.	3
	25 - 34	55,7	(43,7-67,7)	56,9	(20,9-86,9)	6
	35 - 44	27,8	(0,0-69,3)	28,2	(6,8-67,7)	11
	45 - 54	29,5	(5,0-53,9)	29,5	(13,3-53,1)	21
	55 - 64	37,8	(17,9-57,8)	37,1	(21,3-56,3)	48
	65 - 74	34,7	(21,7-47,7)	34,3	(22,4-48,5)	65
	75 +	25,0	(13,4-36,5)	24,9	(15,2-37,9)	68
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	27,8	(10,3-45,2)	83,9	(67,0-93,0)	35
	Lager secundair	25,0	(11,2-38,9)	79,7	(62,7-90,2)	48
	Hoger secundair	47,1	(34,6-59,6)	89,3	(82,6-93,7)	73
	Hoger onderwijs	32,1	(16,3-48,0)	81,2	(66,7-90,3)	62
JAAR	**2001**	37,9	(26,6-49,2)	89,8	(83,5-93,9)	97
	2008	26,6	(18,6-34,6)	83,7	(75,6-89,5)	159
	2013	28,1	(20,0-36,2)	85,3	(78,4-90,3)	164
	2018	34,4	(26,9-42,0)	87,1	(82,0-90,9)	222

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B130 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden orale antidiabetica gebruikte, Vlaams Gewest

MA14_6		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	82,2	(71,8-92,6)	69,6	(50,9-83,5)	114
	Vrouwen	71,7	(62,6-80,8)	46,6	(30,0-63,9)	107
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	3
	25 - 34	0,0	.	.	.	6
	35 - 44	55,6	(12,7-98,4)	58,9	(29,4-83,2)	11
	45 - 54	78,2	(56,7-99,8)	79,5	(56,1-92,2)	21
	55 - 64	77,6	(59,8-95,4)	75,8	(52,3-89,9)	48
	65 - 74	86,2	(76,7-95,8)	85,9	(72,3-93,4)	65
	75 +	90,0	(82,0-98,1)	90,8	(80,2-96,0)	67
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	86,3	(76,2-96,4)	64,9	(32,4-87,7)	34
	Lager secundair	85,7	(74,8-96,6)	61,6	(35,4-82,4)	48
	Hoger secundair	78,3	(65,9-90,6)	66,5	(47,9-81,1)	73
	Hoger onderwijs	71,1	(55,4-86,8)	48,2	(24,2-73,0)	62
JAAR	**2001**	70,1	(59,6-80,6)	52,1	(36,8-67,0)	101
	2008	83,9	(77,8-90,0)	71,3	(57,6-82,0)	160
	2013	79,6	(72,2-86,9)	64,1	(51,2-75,2)	164
	2018	77,6	(70,5-84,6)	64,5	(53,7-74,1)	221

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B131 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes volgens de behandeling van de aandoening, Vlaams Gewest

MA14_7		Geen behandeling	Enkel dieet	Orale antidiabetica	Insuline	N
GESLACHT	**Mannen**	2,0	1,4	58,5	38,1	115
	Vrouwen	6,3	8,9	55,1	29,7	107
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0.0	0.0	0.0	100,0	3
	25 - 34	0.0	44,3	0.0	55,7	6
	35 - 44	21,2	7,6	43,5	27,8	11
	45 - 54	0.0	2,2	68,4	29,5	21
	55 - 64	2,7	2,1	57,3	37,8	48
	65 - 74	2,0	6,5	56,8	34,7	65
	75 +	4,9	2,1	68,0	25,0	68
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	8,3	0.0	63,9	27,8	35
	Lager secundair	2,3	2,4	70,3	25,0	48
	Hoger secundair	1,6	1,8	49,4	47,1	73
	Hoger onderwijs	3,2	9,2	55,5	32,1	62
JAAR	**2001**	0,6	7,4	54,2	37,9	97
	2008	1,8	1,4	70,1	26,6	159
	2013	4,9	2,1	64,9	28,1	164
	2018	3,9	4,7	57,0	34,4	222

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

Tabel B132 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met allergie in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA15_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	18,1	(15,8-20,3)	17,9	(15,8-20,2)	1769
	Vrouwen	20,8	(18,6-23,1)	20,8	(18,7-23,1)	1870
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	21,0	(16,0-25,9)	21,0	(16,4-26,4)	380
	25 - 34	25,9	(20,7-31,0)	25,8	(21,1-31,3)	452
	35 - 44	20,8	(17,0-24,7)	20,8	(17,2-25,0)	534
	45 - 54	19,1	(15,7-22,6)	19,2	(16,0-22,9)	639
	55 - 64	16,9	(13,5-20,3)	16,8	(13,7-20,5)	654
	65 - 74	15,5	(11,9-19,1)	15,4	(12,2-19,3)	519
	75 +	16,5	(12,3-20,7)	16,3	(12,5-20,8)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	17,6	(10,6-24,5)	19,4	(12,8-28,2)	205
	Lager secundair	17,3	(13,0-21,7)	18,4	(14,3-23,5)	459
	Hoger secundair	18,3	(15,5-21,2)	18,2	(15,6-21,2)	1223
	Hoger onderwijs	21,0	(18,7-23,3)	20,2	(18,0-22,7)	1723
JAAR	**2001**	13,3	(11,9-14,7)	12,4	(11,2-13,8)	3471
	2004	12,5	(11,1-13,9)	11,8	(10,5-13,2)	3938
	2008	13,5	(11,9-15,1)	12,9	(11,4-14,5)	3365
	2013	14,9	(13,3-16,6)	14,4	(12,9-16,1)	2991
	2018	19,5	(17,9-21,1)	19,1	(17,6-20,8)	3639

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B133 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een maagzweer in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA16_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,9	(1,0-2,8)	1,7	(1,1-2,6)	1767
	Vrouwen	1,7	(1,0-2,3)	1,5	(1,0-2,3)	1869
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,7	(0,0-1,4)	0,7	(0,2-1,9)	378
	25 - 34	3,2	(0,6-5,8)	3,2	(1,4-7,0)	452
	35 - 44	2,2	(0,8-3,5)	2,1	(1,1-4,1)	534
	45 - 54	2,0	(0,8-3,3)	2,0	(1,1-3,7)	639
	55 - 64	1,2	(0,4-2,1)	1,2	(0,6-2,5)	654
	65 - 74	1,7	(0,6-2,8)	1,7	(0,9-3,2)	519
	75 +	1,2	(0,1-2,2)	1,2	(0,5-2,8)	460
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	1,8	(0,0-3,6)	2,4	(0,8-6,6)	205
	Lager secundair	4,6	(1,3-7,8)	5,0	(2,5-9,6)	459
	Hoger secundair	1,4	(0,7-2,1)	1,2	(0,7-2,1)	1222
	Hoger onderwijs	1,3	(0,7-1,9)	1,0	(0,6-1,7)	1722
JAAR	**1997**	1,8	(1,2-2,4)	1,8	(1,3-2,4)	2983
	2001	2,5	(1,9-3,1)	2,3	(1,8-3,0)	3478
	2004	1,6	(1,1-2,1)	1,5	(1,0-2,0)	3932
	2008	2,1	(1,4-2,9)	1,9	(1,3-2,7)	3398
	2013	1,3	(0,9-1,8)	1,2	(0,9-1,7)	2991
	2018	1,8	(1,2-2,3)	1,6	(1,1-2,2)	3636

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B134 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met leverlijden in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA17_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,8	(0,3-1,3)	0,7	(0,3-1,3)	1769
	Vrouwen	1,4	(0,8-2,0)	0,9	(0,6-1,5)	1869
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	380
	25 - 34	0,0	.	.	.	452
	35 - 44	0,7	(0,0-1,5)	0,7	(0,2-2,3)	534
	45 - 54	1,3	(0,4-2,2)	1,3	(0,6-2,6)	639
	55 - 64	1,4	(0,3-2,5)	1,4	(0,6-2,9)	654
	65 - 74	2,6	(0,5-4,6)	2,5	(1,1-5,5)	518
	75 +	2,0	(0,5-3,5)	1,9	(0,9-3,9)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	3,6	(0,0-7,4)	2,0	(0,5-7,7)	205
	Lager secundair	2,2	(0,4-4,0)	1,3	(0,5-3,0)	459
	Hoger secundair	0,7	(0,2-1,2)	0,5	(0,3-1,1)	1223
	Hoger onderwijs	0,7	(0,3-1,2)	0,7	(0,3-1,4)	1722
JAAR	**2001**	0,8	(0,4-1,1)	0,7	(0,4-1,0)	3474
	2004	0,5	(0,3-0,7)	0,4	(0,3-0,7)	3932
	2008	0,4	(0,2-0,6)	0,4	(0,2-0,6)	3395
	2013	0,7	(0,4-1,0)	0,6	(0,4-1,1)	2990
	2018	1,1	(0,7-1,5)	0,9	(0,6-1,3)	3638

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B135 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met kanker in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA18_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	2,3	(1,5-3,1)	1,5	(0,9-2,4)	1769
	Vrouwen	2,9	(1,9-3,9)	1,7	(1,1-2,8)	1869
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,3	(0,0-0,9)	0,3	(0,0-2,1)	380
	25 - 34	0,6	(0,0-1,4)	0,6	(0,1-2,4)	452
	35 - 44	0,9	(0,1-1,7)	0,9	(0,3-2,2)	534
	45 - 54	3,2	(1,3-5,1)	3,2	(1,8-5,8)	639
	55 - 64	2,5	(1,0-3,9)	2,4	(1,4-4,4)	654
	65 - 74	4,9	(2,9-6,9)	4,8	(3,2-7,3)	519
	75 +	6,8	(3,6-10,1)	6,7	(4,1-10,9)	460
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	6,6	(1,7-11,6)	2,5	(1,1-5,7)	205
	Lager secundair	3,2	(1,5-4,8)	1,4	(0,7-2,7)	459
	Hoger secundair	3,0	(1,7-4,2)	1,9	(1,1-3,2)	1222
	Hoger onderwijs	1,8	(1,0-2,5)	1,4	(0,8-2,2)	1723
JAAR	**1997**	1,1	(0,5-1,6)	1,0	(0,6-1,8)	2981
	2001	1,4	(0,9-1,9)	1,0	(0,6-1,4)	3478
	2004	1,2	(0,8-1,6)	0,8	(0,5-1,1)	3925
	2008	2,1	(1,5-2,7)	1,3	(1,0-1,9)	3396
	2013	2,0	(1,3-2,6)	1,2	(0,9-1,7)	2991
	2018	2,6	(2,0-3,3)	1,6	(1,1-2,1)	3638

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B136 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ernstige hoofdpijn zoals migraine in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA19_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	7,0	(5,7-8,4)	6,1	(4,9-7,5)	1769
	Vrouwen	15,1	(13,1-17,1)	14,1	(12,2-16,2)	1869
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	10,9	(6,9-14,9)	10,3	(7,0-14,9)	380
	25 - 34	14,4	(10,4-18,3)	13,5	(10,2-17,7)	451
	35 - 44	16,3	(12,8-19,8)	15,6	(12,4-19,4)	534
	45 - 54	17,1	(13,6-20,6)	16,5	(13,4-20,0)	639
	55 - 64	7,0	(4,7-9,4)	6,5	(4,6-9,1)	654
	65 - 74	4,8	(2,7-6,9)	4,4	(2,8-6,7)	519
	75 +	4,5	(2,3-6,7)	3,8	(2,3-6,3)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	11,5	(6,2-16,9)	15,7	(9,6-24,8)	205
	Lager secundair	10,9	(6,7-15,1)	12,5	(8,5-18,1)	458
	Hoger secundair	11,9	(9,7-14,1)	9,9	(8,1-12,1)	1223
	Hoger onderwijs	10,6	(8,9-12,3)	7,7	(6,4-9,3)	1723
JAAR	**1997**	8,4	(7,1-9,6)	6,5	(5,5-7,7)	2979
	2001	8,5	(7,5-9,6)	6,9	(6,1-7,9)	3475
	2004	6,9	(5,8-7,9)	5,5	(4,7-6,5)	3931
	2008	9,6	(8,3-11,0)	8,0	(6,9-9,2)	3364
	2013	9,3	(8,0-10,7)	7,8	(6,7-9,0)	2991
	2018	11,2	(9,9-12,4)	9,6	(8,5-10,8)	3638

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B137 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met urinaire incontinentie in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA20_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	4,1	(3,0-5,1)	2,6	(1,9-3,4)	1768
	Vrouwen	7,1	(5,8-8,4)	4,1	(3,0-5,5)	1869
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	1,4	(0,3-2,6)	1,4	(0,6-3,1)	378
	25 - 34	0,7	(0,0-1,4)	0,7	(0,2-2,0)	452
	35 - 44	3,3	(1,3-5,2)	3,2	(1,8-5,7)	534
	45 - 54	3,6	(2,1-5,1)	3,6	(2,4-5,3)	639
	55 - 64	3,4	(2,0-4,7)	3,3	(2,2-4,9)	654
	65 - 74	7,9	(5,3-10,5)	7,7	(5,4-10,7)	519
	75 +	22,9	(18,1-27,6)	21,9	(17,5-27,1)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	25,4	(18,1-32,8)	9,3	(5,7-14,8)	205
	Lager secundair	8,3	(5,6-11,0)	3,3	(2,2-5,0)	459
	Hoger secundair	4,7	(3,3-6,0)	3,0	(2,2-4,1)	1222
	Hoger onderwijs	3,3	(2,3-4,3)	2,8	(2,0-3,8)	1722
JAAR	**2008**	3,9	(3,1-4,6)	2,0	(1,5-2,5)	3384
	2013	4,7	(3,8-5,6)	2,3	(1,8-3,0)	2991
	2018	5,6	(4,7-6,5)	2,7	(2,2-3,5)	3637

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B138 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met depressie in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA21_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	5,3	(4,0-6,5)	4,9	(3,9-6,3)	1769
	Vrouwen	8,1	(6,5-9,6)	7,5	(6,1-9,1)	1869
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	2,5	(1,1-3,9)	2,5	(1,4-4,2)	380
	25 - 34	6,4	(3,6-9,2)	6,3	(4,0-9,8)	452
	35 - 44	7,1	(3,8-10,4)	7,0	(4,4-10,9)	534
	45 - 54	7,2	(5,0-9,4)	7,1	(5,3-9,6)	639
	55 - 64	8,1	(5,4-10,7)	7,9	(5,6-11,0)	654
	65 - 74	5,4	(3,2-7,5)	5,2	(3,5-7,7)	518
	75 +	9,9	(6,6-13,3)	9,5	(6,7-13,3)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	11,0	(5,6-16,4)	10,0	(6,0-16,2)	205
	Lager secundair	12,5	(9,0-15,9)	11,6	(8,6-15,5)	459
	Hoger secundair	6,5	(4,8-8,2)	6,0	(4,6-7,9)	1223
	Hoger onderwijs	4,8	(3,5-6,1)	4,4	(3,4-5,7)	1722
JAAR	**1997**	5,1	(4,1-6,2)	5,0	(4,0-6,2)	2983
	2001	4,9	(4,0-5,7)	4,5	(3,8-5,4)	3475
	2004	4,8	(3,8-5,7)	4,4	(3,6-5,4)	3932
	2008	5,1	(4,1-6,0)	4,6	(3,8-5,6)	3378
	2013	5,9	(4,9-7,0)	5,4	(4,5-6,5)	2991
	2018	6,7	(5,7-7,7)	6,1	(5,2-7,1)	3638

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B139 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met schildklierlijden in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA22_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,5	(0,9-2,1)	1,3	(0,8-2,0)	1768
	Vrouwen	7,8	(6,4-9,1)	6,4	(5,1-8,0)	1868
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	1,2	(0,0-2,7)	0,9	(0,3-3,2)	378
	25 - 34	2,3	(0,7-4,0)	1,7	(0,9-3,5)	451
	35 - 44	3,3	(1,7-4,9)	2,5	(1,5-4,1)	534
	45 - 54	4,1	(2,5-5,6)	3,2	(2,1-4,8)	639
	55 - 64	5,8	(3,9-7,6)	4,5	(3,1-6,4)	654
	65 - 74	9,1	(6,4-11,8)	6,9	(4,9-9,7)	519
	75 +	8,1	(5,1-11,1)	5,6	(3,7-8,5)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	7,0	(3,0-11,0)	2,9	(1,4-5,9)	205
	Lager secundair	5,7	(3,1-8,2)	2,6	(1,5-4,3)	458
	Hoger secundair	4,9	(3,7-6,2)	3,1	(2,2-4,4)	1222
	Hoger onderwijs	4,1	(3,1-5,1)	2,9	(2,0-4,2)	1722
JAAR	**1997**	2,5	(1,8-3,2)	1,8	(1,3-2,5)	2978
	2001	2,8	(2,1-3,5)	1,8	(1,3-2,4)	3477
	2004	2,5	(1,9-3,1)	1,6	(1,2-2,1)	3931
	2008	3,3	(2,6-4,1)	2,1	(1,6-2,7)	3396
	2013	4,1	(3,2-5,0)	2,5	(2,0-3,2)	2991
	2018	4,7	(4,0-5,5)	2,9	(2,3-3,5)	3636

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B140 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met cataract in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA2301_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	3,2	(2,3-4,2)	1,0	(0,6-1,7)	1768
	Vrouwen	4,2	(3,2-5,3)	1,0	(0,6-1,7)	1870
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	380
	25 - 34	0,0	.	.	.	452
	35 - 44	0,3	(0,0-0,8)	0,3	(0,1-1,1)	534
	45 - 54	0,4	(0,0-0,8)	0,4	(0,1-1,1)	639
	55 - 64	3,2	(1,3-5,0)	3,2	(1,8-5,6)	654
	65 - 74	9,3	(6,5-12,1)	9,3	(6,8-12,4)	519
	75 +	16,7	(12,7-20,7)	16,6	(13,0-21,0)	460
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	9,3	(4,8-13,9)	1,0	(0,4-2,1)	204
	Lager secundair	6,4	(3,8-9,0)	0,9	(0,5-1,7)	459
	Hoger secundair	4,3	(3,0-5,6)	1,2	(0,7-2,0)	1223
	Hoger onderwijs	2,1	(1,3-3,0)	0,9	(0,5-1,7)	1723
JAAR	**1997**	0,6	(0,3-0,9)	0,5	(0,3-1,0)	2980
	2001	1,5	(1,1-2,0)	0,7	(0,5-1,1)	3477
	2004	1,6	(1,2-2,0)	0,7	(0,5-1,1)	3930
	2008	2,7	(2,2-3,3)	1,1	(0,8-1,5)	3386
	2013	3,2	(2,4-4,1)	1,3	(0,9-1,9)	2991
	2018	3,7	(3,0-4,5)	1,4	(1,1-1,9)	3638

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B141 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met glaucoom in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA2302_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,4	(0,7-2,0)	0,8	(0,4-1,5)	1768
	Vrouwen	1,2	(0,7-1,6)	0,6	(0,3-1,0)	1870
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	380
	25 - 34	0,2	(0,0-0,6)	0,2	(0,0-1,3)	452
	35 - 44	0,7	(0,0-1,4)	0,7	(0,2-2,0)	534
	45 - 54	0,3	(0,0-0,7)	0,3	(0,1-1,1)	639
	55 - 64	2,2	(0,6-3,9)	2,2	(1,1-4,4)	654
	65 - 74	2,0	(0,7-3,4)	2,0	(1,0-3,9)	519
	75 +	3,9	(2,0-5,8)	4,0	(2,5-6,4)	460
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	2,7	(0,3-5,0)	0,7	(0,2-2,0)	204
	Lager secundair	1,4	(0,4-2,4)	0,4	(0,2-1,1)	459
	Hoger secundair	1,0	(0,4-1,5)	0,5	(0,2-1,0)	1223
	Hoger onderwijs	1,3	(0,6-2,0)	0,9	(0,5-1,6)	1723
JAAR	**1997**	1,1	(0,7-1,5)	1,1	(0,7-1,8)	2981
	2001	1,8	(1,1-2,4)	1,3	(0,8-1,9)	3475
	2004	2,2	(1,7-2,8)	1,6	(1,2-2,1)	3930
	2008	1,7	(1,2-2,2)	1,1	(0,8-1,6)	3385
	2013	0,9	(0,6-1,3)	0,7	(0,4-1,1)	2991
	2018	1,3	(0,9-1,7)	0,8	(0,5-1,1)	3638

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B142 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met maculadegeneratie in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA2303_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,3	(0,0-0,6)	0,3	(0,1-0,7)	1768
	Vrouwen	0,5	(0,2-0,8)	0,3	(0,1-0,6)	1870
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	380
	25 - 34	0,0	.	.	.	452
	35 - 44	0,1	(0,0-0,3)	0,1	(0,0-0,8)	534
	45 - 54	0,2	(0,0-0,5)	0,2	(0,0-1,3)	639
	55 - 64	0,5	(0,0-1,2)	0,5	(0,1-2,2)	654
	65 - 74	0,4	(0,0-0,9)	0,4	(0,1-1,4)	519
	75 +	1,9	(0,6-3,1)	1,9	(1,0-3,7)	460
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	0,5	(0,0-1,5)	0,1	(0,0-1,5)	204
	Lager secundair	1,3	(0,1-2,6)	0,5	(0,1-2,0)	459
	Hoger secundair	0,2	(0,0-0,5)	0,2	(0,1-0,5)	1223
	Hoger onderwijs	0,3	(0,0-0,5)	0,3	(0,2-0,8)	1723
JAAR	**2013**	0,3	(0,1-0,5)	0,4	(0,2-0,8)	2991
	2018	0,4	(0,2-0,6)	0,3	(0,2-0,6)	3638

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B143 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetische retinopathie in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA2304_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,0	.	.	.	1768
	Vrouwen	0,0	.	.	.	1870
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	380
	25 - 34	0,0	.	.	.	452
	35 - 44	0,0	.	.	.	534
	45 - 54	0,0	.	.	.	639
	55 - 64	0,0	.	.	.	654
	65 - 74	0,0	.	.	.	519
	75 +	0,0	.	.	.	460
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	0,0	.	.	.	204
	Lager secundair	0,0	.	.	.	459
	Hoger secundair	0,0	.	.	.	1223
	Hoger onderwijs	0,0	.	.	.	1723
JAAR	**2013**	0,1	(0,0-0,2)	.	.	2991
	2018	0,0	.	.	.	3638

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B144 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ziekte van Parkinson in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA24_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,7	(0,3-1,1)	0,4	(0,2-1,0)	1767
	Vrouwen	0,4	(0,1-0,8)	0,2	(0,1-0,5)	1868
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	380
	25 - 34	0,0	.	.	.	452
	35 - 44	0,0	.	.	.	531
	45 - 54	0,0	.	.	.	639
	55 - 64	0,2	(0,0-0,5)	0,2	(0,0-0,7)	654
	65 - 74	1,5	(0,4-2,7)	1,4	(0,6-3,3)	518
	75 +	2,8	(1,1-4,6)	2,8	(1,5-5,2)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	2,0	(0,0-4,2)	0,3	(0,1-1,3)	205
	Lager secundair	0,5	(0,0-1,0)	0,1	(0,0-0,4)	458
	Hoger secundair	0,7	(0,2-1,2)	0,3	(0,1-0,7)	1220
	Hoger onderwijs	0,3	(0,0-0,6)	0,3	(0,1-0,9)	1723
JAAR	**1997**	0,3	(0,1-0,6)	0,5	(0,2-1,1)	2984
	2001	0,4	(0,2-0,6)	0,4	(0,2-0,6)	3476
	2004	03	(0,2-0,5)	0,3	(0,2-0,6)	3928
	2008	0,6	(0,3-0,9)	0,4	(0,2-0,7)	3401
	2013	0,6	(0,3-0,9)	0,5	(0,3-0,9)	2991
	2018	0,6	(0,3-0,8)	0,4	(0,2-0,6)	3635

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B145 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met epilepsie in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA25_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,7	(0,2-1,2)	0,6	(0,3-1,1)	1769
	Vrouwen	0,8	(0,4-1,3)	0,7	(0,3-1,3)	1870
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,1	(0,0-0,4)	0,1	(0,0-0,9)	380
	25 - 34	0,5	(0,0-1,0)	0,5	(0,2-1,5)	452
	35 - 44	0,9	(0,0-1,9)	0,9	(0,3-2,8)	534
	45 - 54	1,2	(0,2-2,2)	1,2	(0,5-2,7)	639
	55 - 64	0,6	(0,0-1,4)	0,6	(0,2-2,2)	654
	65 - 74	1,5	(0,1-2,9)	1,5	(0,6-3,9)	519
	75 +	0,5	(0,0-1,0)	0,5	(0,1-1,5)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	2,3	(0,0-5,6)	2,2	(0,5-8,5)	205
	Lager secundair	0,5	(0,0-1,1)	0,4	(0,1-1,5)	459
	Hoger secundair	0,6	(0,2-1,0)	0,4	(0,2-1,0)	1223
	Hoger onderwijs	0,8	(0,3-1,3)	0,6	(0,3-1,1)	1723
JAAR	**1997**	0,6	(0,0-1,2)	0,7	(0,3-1,7)	2981
	2001	0,7	(0,4-1,0)	0,6	(0,4-1,0)	3476
	2004	0,7	(0,4-1,0)	0,7	(0,4-1,0)	3934
	2008	0,7	(0,3-1,0)	0,7	(0,4-1,2)	3403
	2013	1,0	(0,6-1,4)	1,0	(0,6-1,5)	2991
	2018	0,8	(0,4-1,1)	0,7	(0,5-1,2)	3639

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B146 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met langdurige vermoeidheid in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA26_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	6,2	(4,7-7,6)	5,8	(4,6-7,4)	1769
	Vrouwen	9,9	(8,2-11,5)	9,4	(7,8-11,2)	1869
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	4,3	(1,7-6,9)	4,2	(2,3-7,5)	380
	25 - 34	6,6	(3,5-9,7)	6,5	(4,0-10,3)	452
	35 - 44	6,6	(4,3-8,9)	6,5	(4,5-9,2)	534
	45 - 54	12,3	(9,0-15,6)	12,2	(9,3-15,7)	639
	55 - 64	7,6	(5,3-9,9)	7,4	(5,4-10,1)	654
	65 - 74	8,4	(5,8-11,1)	8,2	(5,9-11,1)	519
	75 +	9,8	(6,1-13,5)	9,2	(6,2-13,5)	460
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	10,5	(4,9-16,2)	9,4	(5,3-16,3)	205
	Lager secundair	9,7	(6,7-12,6)	8,8	(6,3-12,2)	459
	Hoger secundair	8,5	(6,3-10,6)	7,9	(6,0-10,2)	1223
	Hoger onderwijs	6,8	(5,4-8,3)	6,3	(5,1-7,8)	1722
JAAR	**2001**	3,6	(2,9-4,3)	3,2	(2,6-3,9)	3475
	2004	3,5	(2,8-4,3)	3,1	(2,5-3,9)	3930
	2008	3,5	(2,7-4,2)	3,0	(2,4-3,8)	3381
	2013	4,3	(3,4-5,1)	3,7	(3,0-4,6)	2991
	2018	8,0	(6,9-9,2)	7,1	(6,1-8,3)	3638

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B147 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met osteoporose in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA27_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,0	(0,5-1,5)	0,5	(0,2-0,9)	1769
	Vrouwen	6,5	(5,2-7,8)	2,6	(1,7-4,0)	1869
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	380
	25 - 34	0,0	.	.	.	452
	35 - 44	1,0	(0,0-2,0)	0,8	(0,3-2,0)	534
	45 - 54	1,7	(0,3-3,0)	1,3	(0,6-2,8)	639
	55 - 64	4,4	(2,7-6,1)	3,3	(2,2-4,9)	653
	65 - 74	9,5	(6,5-12,5)	7,1	(5,1-9,9)	519
	75 +	12,4	(8,8-16,1)	8,8	(6,1-12,4)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	9,6	(5,3-13,9)	1,5	(0,6-3,3)	205
	Lager secundair	9,1	(6,0-12,2)	1,7	(0,9-3,2)	459
	Hoger secundair	3,0	(1,9-4,0)	0,9	(0,5-1,7)	1223
	Hoger onderwijs	2,5	(1,6-3,4)	1,1	(0,6-2,0)	1722
JAAR	**1997**	2,3	(1,5-3,0)	1,2	(0,7-2,0)	2983
	2001	3,7	(2,8-4,6)	1,4	(1,0-2,0)	3479
	2004	3,3	(2,7-3,9)	1,2	(0,9-1,6)	3920
	2008	4,8	(4,0-5,6)	1,7	(1,3-2,3)	3357
	2013	3,9	(3,2-4,7)	1,3	(1,0-1,8)	2985
	2018	3,8	(3,1-4,5)	1,2	(0,9-1,6)	3638

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B148 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met gebroken heup in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA28_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,3	(0,0-0,6)	0,2	(0,1-0,5)	1769
	Vrouwen	0,6	(0,2-0,9)	0,2	(0,1-0,6)	1870
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	380
	25 - 34	0,2	(0,0-0,6)	0,2	(0,0-1,3)	452
	35 - 44	0,1	(0,0-0,3)	0,1	(0,0-0,8)	534
	45 - 54	0,0	.	.	.	639
	55 - 64	0,0	.	.	.	654
	65 - 74	0,9	(0,1-1,6)	0,8	(0,3-2,1)	519
	75 +	2,5	(1,0-4,1)	2,5	(1,3-4,9)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	1,2	(0,0-2,7)	0,2	(0,0-0,9)	205
	Lager secundair	1,5	(0,3-2,6)	0,4	(0,1-1,0)	459
	Hoger secundair	0,2	(0,0-0,6)	0,1	(0,0-0,5)	1223
	Hoger onderwijs	0,3	(0,0-0,5)	0,3	(0,1-0,7)	1723
JAAR	**2001**	0,4	(0,1-0,6)	0,3	(0,2-0,5)	3479
	2004	0,4	(0,1-0,6)	0,3	(0,2-0,5)	3933
	2008	0,2	(0,1-0,4)	0,2	(0,1-0,4)	3401
	2013	0,6	(0,3-0,9)	0,5	(0,3-0,9)	2991
	2018	0,4	(0,2-0,7)	0,3	(0,2-0,5)	3639

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B149 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met darmziekte, langer dan 3 maanden in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA29_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	3,9	(2,8-5,0)	3,6	(2,7-4,7)	1768
	Vrouwen	6,9	(5,5-8,3)	6,2	(5,0-7,7)	1869
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	3,2	(1,4-5,1)	3,1	(1,7-5,5)	378
	25 - 34	4,2	(1,6-6,8)	4,1	(2,2-7,3)	452
	35 - 44	2,4	(1,2-3,6)	2,3	(1,4-3,9)	534
	45 - 54	6,0	(3,8-8,2)	5,9	(4,0-8,5)	639
	55 - 64	5,7	(3,5-8,0)	5,6	(3,7-8,3)	654
	65 - 74	7,2	(4,5-9,9)	6,9	(4,7-10,1)	519
	75 +	10,0	(6,4-13,6)	9,3	(6,3-13,5)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	12,4	(6,3-18,6)	8,7	(4,9-15,2)	205
	Lager secundair	6,6	(3,5-9,7)	4,9	(3,1-7,7)	459
	Hoger secundair	5,4	(3,8-7,1)	4,9	(3,6-6,7)	1222
	Hoger onderwijs	4,4	(3,3-5,5)	4,2	(3,3-5,4)	1722
JAAR	**1997**	3,2	(2,4-3,9)	3,3	(2,6-4,2)	2982
	2001	3,1	(2,3-4,0)	2,9	(2,3-3,8)	3472
	2004	2,7	(2,2-3,3)	2,5	(2,0-3,1)	3935
	2008	2,9	(2,2-3,5)	2,6	(2,0-3,3)	3400
	2013	2,8	(2,1-3,4)	2,4	(1,9-3,0)	2991
	2018	5,4	(4,5-6,3)	4,8	(4,0-5,7)	3637

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B150 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met nierstenen in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA30_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,1	(0,6-1,6)	0,9	(0,5-1,6)	1768
	Vrouwen	0,5	(0,1-0,8)	0,3	(0,2-0,7)	1869
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	378
	25 - 34	0,4	(0,0-1,1)	0,4	(0,1-1,6)	452
	35 - 44	0,4	(0,0-0,8)	0,4	(0,1-1,0)	534
	45 - 54	1,3	(0,3-2,3)	1,1	(0,5-2,4)	639
	55 - 64	0,9	(0,1-1,6)	0,8	(0,3-2,0)	654
	65 - 74	0,6	(0,0-1,4)	0,6	(0,2-1,8)	519
	75 +	1,7	(0,4-3,0)	1,6	(0,7-3,7)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	0,3	(0,0-0,8)	0,1	(0,0-0,9)	205
	Lager secundair	0,4	(0,0-1,1)	0,2	(0,0-1,5)	459
	Hoger secundair	1,1	(0,5-1,7)	0,8	(0,4-1,5)	1222
	Hoger onderwijs	0,7	(0,3-1,1)	0,6	(0,3-1,0)	1722
JAAR	**1997**	1,1	(0,7-1,5)	0,9	(0,6-1,4)	2982
	2001	1,0	(0,6-1,4)	0,8	(0,6-1,2)	3470
	2004	1,2	(0,7-1,7)	1,0	(0,7-1,5)	3931
	2008	0,7	(0,4-1,0)	0,6	(0,4-0,9)	3396
	2013	0,8	(0,4-1,1)	0,7	(0,4-1,0)	2991
	2018	0,8	(0,5-1,1)	0,6	(0,4-0,9)	3637

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B151 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ernstige nierziekte behalve nierstenen in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA31_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,6	(0,2-1,1)	0,4	(0,2-0,8)	1769
	Vrouwen	0,7	(0,3-1,1)	0,4	(0,2-0,9)	1870
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,4	(0,0-1,0)	0,4	(0,1-1,7)	380
	25 - 34	0,3	(0,0-0,9)	0,3	(0,0-2,0)	452
	35 - 44	0,1	(0,0-0,2)	0,1	(0,0-0,6)	534
	45 - 54	0,5	(0,0-1,1)	0,5	(0,2-1,6)	639
	55 - 64	0,3	(0,0-0,8)	0,3	(0,1-1,6)	654
	65 - 74	1,3	(0,2-2,4)	1,3	(0,5-3,0)	519
	75 +	2,3	(0,7-3,8)	2,3	(1,1-4,5)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	1,2	(0,0-2,5)	0,3	(0,1-1,1)	205
	Lager secundair	0,3	(0,0-0,7)	0,1	(0,0-0,4)	459
	Hoger secundair	0,9	(0,3-1,6)	0,5	(0,3-1,1)	1223
	Hoger onderwijs	0,5	(0,2-0,9)	0,4	(0,2-0,9)	1723
JAAR	**1997**	0,7	(0,3-1,0)	0,8	(0,5-1,4)	2978
	2001	0,5	(0,2-0,8)	0,5	(0,3-0,8)	3472
	2004	0,7	(0,4-1,0)	0,6	(0,4-1,0)	3936
	2008	0,7	(0,4-0,9)	0,6	(0,4-0,9)	3400
	2013	1,1	(0,7-1,5)	0,9	(0,6-1,4)	2991
	2018	0,7	(0,4-1,0)	0,6	(0,4-0,9)	3639

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B152 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met chronische blaasontsteking in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA32_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,2	(0,5-1,8)	0,9	(0,5-1,6)	1768
	Vrouwen	3,5	(2,6-4,4)	2,7	(1,9-3,8)	1869
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	1,3	(0,0-2,9)	1,2	(0,4-3,6)	378
	25 - 34	1,9	(0,0-3,7)	1,6	(0,6-4,3)	452
	35 - 44	0,8	(0,1-1,4)	0,7	(0,3-1,6)	534
	45 - 54	1,3	(0,5-2,2)	1,2	(0,6-2,3)	639
	55 - 64	1,6	(0,7-2,5)	1,4	(0,8-2,5)	654
	65 - 74	3,9	(2,0-5,7)	3,4	(2,1-5,5)	519
	75 +	7,0	(3,9-10,0)	5,8	(3,3-10,2)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	5,9	(1,1-10,7)	2,6	(1,0-6,6)	205
	Lager secundair	4,3	(2,0-6,6)	2,2	(1,1-4,4)	459
	Hoger secundair	2,8	(1,6-3,9)	2,1	(1,3-3,3)	1222
	Hoger onderwijs	1,2	(0,7-1,7)	1,1	(0,7-1,6)	1722
JAAR	**1997**	1,6	(1,1-2,0)	1,5	(1,1-2,0)	2981
	2001	1,6	(1,2-2,1)	1,3	(1,0-1,8)	3473
	2004	1,5	(1,1-2,0)	1,2	(0,9-1,6)	3934
	2008	1,2	(0,8-1,6)	0,9	(0,6-1,3)	3399
	2013	1,6	(1,0-2,1)	1,1	(0,8-1,6)	2991
	2018	2,4	(1,8-2,9)	1,7	(1,3-2,2)	3637

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B153 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ernstige of chronische huidaandoening in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA33_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	3,7	(2,8-4,7)	3,7	(2,8-4,8)	1769
	Vrouwen	4,7	(3,5-5,8)	4,5	(3,5-5,8)	1870
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	3,4	(1,0-5,8)	3,4	(1,7-6,7)	380
	25 - 34	4,4	(2,4-6,3)	4,3	(2,7-6,8)	452
	35 - 44	3,0	(1,5-4,5)	3,0	(1,8-4,9)	534
	45 - 54	4,9	(2,7-7,2)	4,9	(3,2-7,7)	639
	55 - 64	3,5	(2,0-5,1)	3,5	(2,3-5,4)	654
	65 - 74	5,0	(3,0-7,1)	5,0	(3,3-7,4)	519
	75 +	5,6	(3,3-8,0)	5,5	(3,6-8,3)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	4,5	(1,5-7,5)	3,5	(1,7-7,2)	205
	Lager secundair	3,7	(1,8-5,6)	3,1	(1,9-5,2)	459
	Hoger secundair	3,6	(2,3-4,8)	3,4	(2,4-4,8)	1223
	Hoger onderwijs	4,8	(3,6-5,9)	4,8	(3,7-6,2)	1723
JAAR	**1997**	3,2	(2,3-4,0)	3,2	(2,5-4,1)	2979
	2001	3,3	(2,7-4,0)	3,3	(2,7-4,0)	3475
	2004	3,3	(2,5-4,2)	3,3	(2,6-4,2)	3932
	2008	2,9	(2,1-3,7)	2,9	(2,1-3,8)	3399
	2013	2,9	(2,2-3,6)	2,9	(2,3-3,6)	2991
	2018	4,2	(3,5-5,0)	4,2	(3,5-5,0)	3639

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B154 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met galstenen of galblaasontsteking in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA34_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,7	(0,2-1,2)	0,5	(0,3-1,1)	1768
	Vrouwen	1,9	(1,1-2,6)	1,5	(0,9-2,3)	1869
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	1,1	(0,0-2,5)	1,0	(0,2-3,6)	378
	25 - 34	0,3	(0,0-0,8)	0,3	(0,1-1,2)	452
	35 - 44	0,9	(0,0-1,9)	0,8	(0,3-2,2)	534
	45 - 54	1,3	(0,4-2,3)	1,2	(0,6-2,6)	639
	55 - 64	0,6	(0,0-1,2)	0,5	(0,2-1,6)	654
	65 - 74	2,9	(1,0-4,8)	2,6	(1,2-5,2)	519
	75 +	2,4	(0,7-4,0)	2,0	(0,9-4,3)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	2,2	(0,0-5,4)	1,0	(0,2-5,5)	205
	Lager secundair	1,6	(0,3-3,0)	0,9	(0,3-2,4)	459
	Hoger secundair	1,5	(0,7-2,2)	1,1	(0,6-1,9)	1222
	Hoger onderwijs	1,0	(0,4-1,5)	0,8	(0,5-1,4)	1722
JAAR	**1997**	0,7	(0,4-1,1)	0,8	(0,4-1,4)	2981
	2001	1,0	(0,6-1,3)	0,7	(0,5-1,1)	3479
	2004	0,8	(0,5-1,1)	0,6	(0,4-0,9)	3933
	2008	0,7	(0,4-0,9)	0,5	(0,3-0,7)	3395
	2013	0,8	(0,4-1,1)	0,5	(0,3-0,8)	2990
	2018	1,3	(0,8-1,7)	0,8	(0,6-1,2)	3637

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B155 Percentage van de mannelijke bevolking van 15 jaar en ouder met prostaatklachten in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA35_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
LEEFTIJDSGROEP						
	15 - 24	0,0	.	.	.	199
	25 - 34	0,0	.	.	.	206
	35 - 44	0,0	.	.	.	260
	45 - 54	1,2	(0,0-2,4)	1,2	(0,4-3,2)	305
	55 - 64	6,0	(3,3-8,8)	6,0	(3,8-9,4)	329
	65 - 74	12,8	(8,5-17,1)	12,8	(9,1-17,8)	258
	75 +	24,7	(17,3-32,0)	24,7	(18,1-32,6)	209
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	14,8	(4,3-25,3)	1,9	(0,8-4,9)	90
	Lager secundair	9,4	(4,9-13,8)	1,7	(0,8-3,6)	204
	Hoger secundair	4,0	(2,5-5,5)	1,2	(0,6-2,2)	615
	Hoger onderwijs	4,3	(2,9-5,6)	2,2	(1,2-4,0)	844
JAAR	**2001**	4,0	(3,0-4,9)	1,9	(1,4-2,6)	1738
	2004	4,6	(3,6-5,6)	2,1	(1,5-2,9)	1850
	2008	3,8	(2,8-4,9)	1,6	(1,1-2,3)	1594
	2013	4,5	(3,3-5,8)	1,9	(1,3-2,6)	1444
	2018	5,2	(4,1-6,3)	2,0	(1,5-2,7)	1766

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B156 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met astma in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA01_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	3,6	(1,8-5,4)	3,5	(2,1-5,9)	467
	Vrouwen	5,2	(2,7-7,8)	4,9	(3,1-7,7)	513
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	3,3	(1,7-4,9)	3,3	(2,0-5,4)	519
	75 +	5,8	(2,9-8,7)	5,7	(3,5-9,0)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	3,7	(0,6-6,8)	3,1	(1,4-7,1)	139
	Lager secundair	7,3	(2,2-12,5)	6,7	(3,5-12,3)	234
	Hoger secundair	4,4	(2,0-6,9)	4,3	(2,4-7,5)	312
	Hoger onderwijs	2,9	(0,7-5,0)	3,0	(1,4-6,1)	287
JAAR	**2001**	6,1	(4,0-8,1)	6,1	(4,3-8,5)	689
	2004	5,6	(3,9-7,2)	5,6	(4,1-7,5)	1239
	2008	5,5	(3,3-7,8)	5,5	(3,6-8,3)	1093
	2013	3,2	(1,8-4,7)	3,2	(2,0-5,0)	745
	2018	4,5	(2,9-6,1)	4,5	(3,1-6,4)	980

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B157 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met chronisch longlijden in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA02_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	6,8	(3,8-9,8)	6,6	(4,2-10,2)	467
	Vrouwen	6,6	(4,1-9,2)	6,2	(4,1-9,3)	512
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	4,9	(2,5-7,3)	4,9	(3,0-8,0)	518
	75 +	8,6	(5,3-11,8)	8,6	(5,8-12,4)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	11,2	(3,6-18,9)	10,0	(5,1-18,6)	139
	Lager secundair	8,8	(4,0-13,5)	8,4	(4,8-14,3)	234
	Hoger secundair	4,7	(1,8-7,6)	4,6	(2,4-8,5)	311
	Hoger onderwijs	5,3	(2,3-8,2)	5,4	(3,1-9,3)	287
JAAR	**2001**	9,5	(6,9-12,2)	9,5	(7,2-12,4)	688
	2004	10,2	(8,0-12,5)	10,2	(8,2-12,8)	1242
	2008	8,2	(6,1-10,3)	8,0	(6,2-10,3)	1083
	2013	8,2	(5,8-10,5)	7,9	(5,9-10,4)	745
	2018	6,7	(4,7-8,7)	6,5	(4,8-8,7)	979

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B158 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hartinfarct in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA03_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	3,3	(0,8-5,8)	3,2	(1,6-6,3)	467
	Vrouwen	0,7	(0,0-1,4)	0,7	(0,2-2,0)	513
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	1,4	(0,3-2,5)	1,0	(0,4-2,7)	519
	75 +	2,3	(0,2-4,5)	1,8	(0,8-4,1)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	4,5	(0,0-11,2)	3,2	(1,0-10,3)	139
	Lager secundair	1,3	(0,0-2,9)	1,0	(0,2-4,6)	234
	Hoger secundair	2,1	(0,5-3,7)	1,5	(0,6-3,8)	312
	Hoger onderwijs	0,8	(0,0-1,9)	0,5	(0,1-2,3)	287
JAAR	**2008**	1,9	(0,9-2,8)	1,7	(1,0-2,8)	1084
	2013	2,3	(0,7-3,9)	2,0	(1,0-4,1)	745
	2018	1,8	(0,7-3,0)	1,6	(0,9-3,0)	980

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B159 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met coronaire hartziekte in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA04_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	5,8	(2,7-9,0)	5,5	(3,3-9,2)	466
	Vrouwen	1,5	(0,4-2,6)	1,3	(0,6-2,9)	513
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	2,3	(0,9-3,7)	1,8	(0,9-3,5)	518
	75 +	4,5	(1,8-7,2)	3,7	(2,0-6,8)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	0,6	(0,0-1,9)	0,4	(0,0-3,2)	138
	Lager secundair	4,3	(1,4-7,2)	3,3	(1,3-7,8)	234
	Hoger secundair	4,8	(1,1-8,4)	3,4	(1,8-6,3)	312
	Hoger onderwijs	2,6	(0,5-4,6)	1,9	(0,8-4,5)	287
JAAR	**2008**	6,1	(4,1-8,1)	5,4	(3,8-7,7)	1079
	2013	4,5	(2,2-6,9)	3,9	(2,3-6,5)	744
	2018	3,4	(1,9-4,9)	2,9	(1,9-4,5)	979

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B160 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ernstige hartziekte (uitgezonderd hartinfarct of coronaire hartziekte) in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA05_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	12,5	(8,4-16,6)	11,5	(8,2-15,9)	467
	Vrouwen	8,9	(5,9-12,0)	7,6	(5,2-11,0)	513
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	5,8	(3,3-8,3)	5,6	(3,6-8,6)	519
	75 +	15,5	(11,2-19,7)	15,4	(11,6-20,1)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	14,9	(6,9-23,0)	11,2	(6,3-19,0)	139
	Lager secundair	13,6	(7,7-19,4)	11,8	(7,2-18,7)	234
	Hoger secundair	7,9	(4,0-11,8)	6,9	(4,3-10,9)	312
	Hoger onderwijs	8,9	(4,9-12,9)	8,8	(5,4-13,9)	287
JAAR	**2013**	6,7	(4,6-8,8)	6,0	(4,3-8,4)	745
	2018	10,5	(8,0-13,0)	9,6	(7,6-12,2)	980

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B161 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoge bloeddruk in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA06_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	36,2	(31,1-41,2)	36,2	(31,3-41,4)	467
	Vrouwen	38,1	(33,4-42,8)	37,9	(33,4-42,7)	513
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	35,8	(31,0-40,6)	35,9	(31,2-40,8)	519
	75 +	38,7	(33,5-44,0)	38,7	(33,6-44,1)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	47,4	(37,3-57,5)	46,9	(37,2-56,9)	139
	Lager secundair	36,7	(29,3-44,0)	36,4	(29,4-44,0)	234
	Hoger secundair	35,3	(29,2-41,5)	35,4	(29,5-41,7)	312
	Hoger onderwijs	34,1	(27,7-40,5)	34,3	(28,1-41,1)	287
JAAR	**1997**	23,3	(18,3-28,3)	23,0	(18,4-28,4)	558
	2001	34,3	(29,2-39,4)	34,2	(29,3-39,5)	686
	2004	34,5	(31,1-37,9)	34,4	(31,1-37,9)	1241
	2008	35,9	(31,5-40,3)	35,8	(31,5-40,3)	1073
	2013	38,7	(34,4-43,1)	38,7	(34,4-43,1)	744
	2018	37,2	(33,7-40,8)	37,2	(33,7-40,8)	980

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B162 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoge bloeddruk dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet te hebben gevolgd, Vlaams Gewest

MA06_30		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	16,8	(9,1-24,5)	16,4	(10,2-25,3)	167
	Vrouwen	19,5	(13,3-25,6)	18,7	(13,6-25,2)	204
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	14,4	(8,5-20,3)	14,4	(9,5-21,3)	179
	75 +	22,2	(14,2-30,1)	22,0	(15,1-31,0)	192
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	21,6	(6,6-36,6)	18,0	(8,1-35,4)	65
	Lager secundair	13,9	(5,3-22,6)	12,9	(7,0-22,8)	90
	Hoger secundair	15,2	(7,4-23,0)	14,6	(8,5-24,0)	118
	Hoger onderwijs	22,5	(12,5-32,6)	23,1	(14,6-34,7)	93
JAAR	**2001**	38,1	(28,4-47,8)	36,6	(28,0-46,1)	201
	2008	19,8	(11,8-27,8)	19,0	(12,6-27,7)	257
	2013	19,0	(12,2-25,7)	18,4	(12,8-25,7)	278
	2018	18,3	(13,3-23,3)	17,9	(13,5-23,5)	371

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B163 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoge bloeddruk dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden geneesmiddelen te hebben genomen, Vlaams Gewest

MA06_40		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	94,9	(91,3-98,5)	95,0	(90,1-97,5)	167
	Vrouwen	91,7	(87,6-95,9)	91,7	(86,4-95,0)	204
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	92,3	(88,3-96,2)	92,4	(87,2-95,6)	179
	75 +	93,9	(89,9-97,9)	94,2	(89,3-96,9)	192
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	89,1	(80,3-97,9)	88,4	(76,6-94,7)	65
	Lager secundair	97,7	(95,1-100,0)	97,8	(92,9-99,3)	90
	Hoger secundair	89,3	(83,0-95,7)	89,7	(81,4-94,5)	118
	Hoger onderwijs	97,0	(93,6-100,0)	97,2	(91,4-99,2)	93
JAAR	**1997**	88,6	(81,7-95,6)	89,4	(81,4-94,3)	147
	2001	87,3	(81,7-92,9)	87,8	(81,4-92,2)	227
	2008	86,4	(80,9-91,9)	86,7	(80,3-91,3)	251
	2013	96,1	(93,5-98,7)	96,2	(92,7-98,1)	278
	2018	93,1	(90,3-95,9)	93,2	(89,8-95,5)	371

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B164 Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoge bloeddruk volgens de behandeling van de aandoening, Vlaams Gewest

MA06_50		Geen behandeling	Enkel dieet	Medicamenteuze behandeling	N
GESLACHT	**Mannen**	4,6	0,4	94,9	167
	Vrouwen	6,7	1,6	91,7	204
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	7,1	0,7	92,3	179
	75 +	4,6	1,5	93,9	192
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	10,9	0.0	89,1	65
	Lager secundair	1,5	0,8	97,7	90
	Hoger secundair	7,8	2,9	89,3	118
	Hoger onderwijs	3,0	0.0	97,0	93
JAAR	**2001**	4,1	1,6	94,3	209
	2008	13,0	0,6	86,4	251
	2013	3,3	0,6	96,1	278
	2018	5,8	1,1	93,1	371

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

Tabel B165 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder methoog cholesterolgehalte in het bloed in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA07_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	40,7	(35,4-46,0)	40,7	(35,5-46,1)	465
	Vrouwen	38,3	(33,5-43,0)	38,3	(33,7-43,1)	513
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	39,8	(34,9-44,7)	39,7	(34,9-44,7)	518
	75 +	38,9	(33,3-44,5)	38,9	(33,5-44,7)	460
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	37,7	(27,7-47,7)	38,0	(28,6-48,5)	138
	Lager secundair	43,1	(35,6-50,7)	43,4	(36,1-51,0)	234
	Hoger secundair	38,5	(31,5-45,6)	38,5	(31,7-45,7)	312
	Hoger onderwijs	37,5	(31,3-43,8)	37,3	(31,1-43,9)	287
JAAR	**2013**	37,1	(32,6-41,5)	37,0	(32,7-41,5)	744
	2018	39,3	(35,6-43,1)	39,3	(35,7-43,1)	978

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B166 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet te hebben gevolgd, Vlaams Gewest

MA07_30		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	28,7	(20,6-36,9)	28,7	(21,2-37,5)	183
	Vrouwen	27,1	(20,2-34,0)	27,2	(20,9-34,5)	204
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	29,1	(22,3-36,0)	29,1	(22,8-36,3)	210
	75 +	26,4	(17,7-35,1)	26,4	(18,8-35,9)	177
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	26,1	(8,0-44,2)	26,3	(12,6-46,8)	51
	Lager secundair	24,9	(15,4-34,3)	24,9	(16,7-35,3)	106
	Hoger secundair	22,8	(14,0-31,6)	22,8	(15,2-32,5)	126
	Hoger onderwijs	37,2	(25,9-48,5)	37,1	(26,6-49,0)	100
JAAR	**2013**	25,0	(17,4-32,6)	24,9	(18,4-32,8)	256
	2018	27,8	(22,4-33,3)	27,8	(22,6-33,7)	387

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B167 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden geneesmiddelen te hebben genomen, Vlaams Gewest

MA07_40		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	91,9	(87,7-96,0)	92,6	(87,3-95,8)	183
	Vrouwen	86,4	(80,9-91,8)	87,0	(80,9-91,3)	204
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	84,8	(79,2-90,4)	84,9	(78,7-89,6)	210
	75 +	93,3	(89,3-97,3)	93,5	(88,3-96,5)	177
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	93,7	(86,4-100,0)	93,0	(80,7-97,7)	51
	Lager secundair	91,2	(83,8-98,5)	91,4	(82,2-96,1)	106
	Hoger secundair	90,4	(84,4-96,3)	91,2	(84,1-95,3)	126
	Hoger onderwijs	83,7	(76,1-91,3)	86,1	(76,5-92,3)	100
JAAR	**2013**	90,6	(86,3-94,9)	91,3	(85,4-94,9)	256
	2018	88,9	(85,3-92,5)	89,5	(85,5-92,5)	387

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B168 Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed volgens de behandeling van de aandoening, Vlaams Gewest

MA07_50		Geen behandeling	Enkel dieet	Medicamenteuze behandeling	N
GESLACHT	**Mannen**	5,4	2,7	91,9	183
	Vrouwen	8,7	4,9	86,4	204
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	11,3	3,9	84,8	210
	75 +	2,8	3,9	93,3	177
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	1,3	5,0	93,7	51
	Lager secundair	6,9	2,0	91,2	106
	Hoger secundair	6,8	2,8	90,4	126
	Hoger onderwijs	11,3	5,0	83,7	100
JAAR	**2013**	6,9	2,5	90,6	256
	2018	7,2	3,9	88,9	387

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

Tabel B169 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beroerte in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA08_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	3,6	(1,1-6,1)	3,6	(1,7-7,4)	467
	Vrouwen	0,2	(0,0-0,4)	0,2	(0,0-0,7)	513
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	1,9	(0,7-3,1)	0,7	(0,3-1,7)	519
	75 +	1,5	(0,0-3,5)	0,6	(0,2-2,3)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	4,7	(0,0-11,5)	2,2	(0,6-7,8)	139
	Lager secundair	1,6	(0,0-3,3)	0,7	(0,2-2,4)	234
	Hoger secundair	0,7	(0,0-1,6)	0,2	(0,1-0,9)	312
	Hoger onderwijs	1,4	(0,0-2,9)	0,4	(0,1-1,5)	287
JAAR	**1997**	3,5	(1,5-5,5)	3,5	(2,0-6,3)	559
	2001	1,6	(0,6-2,6)	1,5	(0,8-2,7)	690
	2004	1,9	(1,0-2,9)	1,8	(1,1-3,0)	1237
	2008	2,3	(1,1-3,4)	2,0	(1,2-3,4)	1089
	2013	1,8	(0,7-3,0)	1,6	(0,9-2,9)	745
	2018	1,7	(0,5-2,8)	1,4	(0,7-2,7)	980

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B170 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met vernauwing van de bloedvaten in de buik of de benen in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA09_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	6,1	(3,2-9,1)	5,8	(3,7-9,1)	466
	Vrouwen	6,1	(3,8-8,4)	5,5	(3,7-8,1)	506
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	3,9	(2,2-5,6)	3,9	(2,5-6,0)	518
	75 +	8,5	(5,1-11,8)	8,5	(5,7-12,4)	454
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	12,7	(4,6-20,7)	10,7	(5,5-19,8)	139
	Lager secundair	6,9	(2,9-10,9)	6,3	(3,6-10,9)	231
	Hoger secundair	4,1	(1,9-6,2)	3,9	(2,2-6,8)	310
	Hoger onderwijs	4,8	(2,0-7,5)	4,9	(2,7-8,6)	285
JAAR	**2013**	8,5	(5,8-11,3)	8,2	(5,8-11,6)	744
	2018	6,1	(4,3-7,9)	6,0	(4,4-8,0)	972

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B171 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met reumatoïde artritis in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA10_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	13,2	(9,9-16,5)	13,2	(10,2-16,9)	467
	Vrouwen	22,1	(18,0-26,1)	22,1	(18,3-26,3)	513
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	17,7	(14,0-21,5)	17,6	(14,1-21,6)	519
	75 +	18,6	(14,2-23,0)	17,9	(14,0-22,5)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	22,7	(14,0-31,4)	22,0	(14,6-31,7)	139
	Lager secundair	19,8	(13,7-25,9)	18,8	(13,6-25,5)	234
	Hoger secundair	14,3	(9,6-19,0)	14,1	(10,1-19,4)	312
	Hoger onderwijs	18,5	(13,4-23,6)	18,4	(13,8-24,2)	287
JAAR	**1997**	12,5	(8,3-16,8)	12,1	(8,5-17,0)	555
	2001	19,2	(15,1-23,2)	18,6	(15,0-22,8)	689
	2004	15,7	(12,9-18,5)	15,3	(12,8-18,2)	1237
	2008	19,8	(16,6-23,1)	19,1	(16,1-22,6)	1065
	2013	19,5	(15,9-23,1)	18,8	(15,5-22,7)	745
	2018	18,1	(15,3-21,0)	17,6	(15,0-20,6)	980

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B172 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met artrose in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA11_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	30,2	(25,2-35,2)	30,2	(25,5-35,4)	467
	Vrouwen	46,0	(41,1-50,9)	45,8	(41,0-50,8)	512
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	36,7	(32,2-41,3)	36,9	(32,5-41,6)	519
	75 +	41,4	(36,0-46,8)	40,7	(35,3-46,2)	460
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	39,9	(29,6-50,3)	38,3	(28,4-49,4)	139
	Lager secundair	42,9	(35,5-50,3)	41,5	(34,2-49,1)	234
	Hoger secundair	37,1	(31,2-42,9)	37,1	(31,4-43,1)	312
	Hoger onderwijs	37,6	(31,2-43,9)	38,2	(32,0-44,9)	286
JAAR	**1997**	32,6	(26,6-38,7)	31,7	(25,9-38,0)	557
	2001	39,9	(35,3-44,5)	39,3	(34,8-44,1)	689
	2004	33,3	(29,9-36,7)	32,7	(29,4-36,2)	1231
	2008	39,6	(35,1-44,1)	39,0	(34,4-43,9)	1031
	2013	40,2	(35,9-44,5)	39,5	(35,2-44,0)	745
	2018	39,0	(35,5-42,5)	38,5	(35,0-42,2)	979

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B173 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met een lage rugprobleem in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA12_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	33,0	(27,9-38,2)	33,1	(28,1-38,5)	467
	Vrouwen	35,7	(30,9-40,5)	35,7	(31,0-40,6)	513
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	33,7	(29,3-38,2)	33,8	(29,4-38,5)	519
	75 +	35,4	(29,5-41,3)	35,3	(29,7-41,4)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	34,7	(24,1-45,3)	34,2	(24,7-45,2)	139
	Lager secundair	31,0	(23,6-38,4)	30,7	(23,9-38,3)	234
	Hoger secundair	37,8	(30,9-44,7)	37,9	(31,3-45,0)	312
	Hoger onderwijs	33,4	(27,4-39,3)	33,7	(27,8-40,0)	287
JAAR	**2008**	31,3	(26,9-35,8)	31,1	(26,8-35,8)	1049
	2013	31,8	(27,8-35,8)	31,7	(27,8-35,9)	744
	2018	34,5	(30,9-38,2)	34,5	(30,9-38,3)	980

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B174 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met een nekprobleem in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA13_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	11,9	(8,6-15,2)	11,8	(8,8-15,5)	466
	Vrouwen	24,6	(20,4-28,9)	24,8	(20,8-29,3)	513
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	20,2	(16,2-24,3)	19,8	(16,1-24,0)	519
	75 +	17,7	(13,5-21,9)	16,4	(12,7-21,0)	460
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	12,7	(6,3-19,2)	12,1	(7,0-20,2)	139
	Lager secundair	21,6	(15,5-27,8)	20,0	(14,9-26,2)	234
	Hoger secundair	21,6	(16,1-27,0)	21,0	(16,0-27,0)	312
	Hoger onderwijs	16,4	(11,2-21,5)	15,6	(11,1-21,4)	287
JAAR	**2008**	17,2	(14,1-20,3)	16,7	(13,9-20,0)	1069
	2013	18,3	(15,0-21,7)	18,0	(14,9-21,7)	744
	2018	19,0	(16,1-21,9)	18,7	(16,0-21,7)	979

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B175 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA14_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	16,2	(12,4-20,1)	16,2	(12,7-20,4)	467
	Vrouwen	10,7	(7,8-13,6)	10,5	(8,0-13,7)	513
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	11,7	(8,8-14,5)	11,3	(8,7-14,4)	519
	75 +	14,7	(11,1-18,3)	14,6	(11,4-18,7)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	19,7	(12,7-26,6)	18,6	(12,4-26,9)	139
	Lager secundair	12,2	(7,7-16,7)	12,1	(8,3-17,3)	234
	Hoger secundair	11,1	(7,3-14,9)	10,7	(7,5-14,9)	312
	Hoger onderwijs	13,0	(8,7-17,3)	12,8	(9,0-17,8)	287
JAAR	**1997**	6,2	(3,4-8,9)	6,4	(4,1-9,8)	558
	2001	8,4	(6,2-10,6)	8,4	(6,5-10,9)	680
	2004	9,4	(7,4-11,4)	9,5	(7,6-11,7)	1239
	2008	10,7	(8,2-13,2)	10,6	(8,3-13,4)	1080
	2013	13,6	(10,2-16,9)	13,4	(10,3-17,2)	745
	2018	13,2	(10,9-15,4)	13,0	(10,9-15,4)	980

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B176 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet volgde, Vlaams Gewest

MA14_30		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	60,6	(48,4-72,8)	60,5	(48,0-71,8)	72
	Vrouwen	66,2	(54,0-78,4)	65,9	(52,3-77,4)	61
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	61,7	(48,9-74,4)	62,6	(49,3-74,2)	65
	75 +	64,4	(51,9-76,9)	64,7	(51,1-76,3)	68
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	56,7	(36,9-76,5)	55,1	(34,4-74,3)	30
	Lager secundair	64,3	(46,1-82,5)	64,8	(45,8-80,0)	30
	Hoger secundair	64,3	(48,0-80,7)	65,9	(47,9-80,3)	35
	Hoger onderwijs	64,1	(46,3-81,9)	65,0	(44,5-81,2)	37
JAAR	**2001**	72,1	(59,3-84,9)	72,6	(59,1-83,0)	63
	2008	54,0	(40,9-67,1)	54,9	(42,0-67,2)	114
	2013	55,6	(42,3-69,0)	55,5	(42,1-68,1)	101
	2018	63,1	(54,4-71,9)	64,2	(54,6-72,7)	133

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B177 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden medicamenteus behandeld werd, Vlaams Gewest

MA14_40		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	94,0	(87,7-100,0)	94,0	(83,9-97,9)	72
	Vrouwen	90,2	(80,9-99,5)	90,0	(76,5-96,1)	61
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	91,5	(83,2-99,8)	91,1	(77,9-96,7)	65
	75 +	93,0	(85,8-100,0)	93,0	(82,1-97,4)	68
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	95,1	(87,2-100,0)	96,1	(78,2-99,4)	30
	Lager secundair	100	(100,0-100,0)	100	(100,0-100,0)	30
	Hoger secundair	96,7	(90,0-100,0)	96,4	(75,4-99,6)	35
	Hoger onderwijs	84,2	(69,0-99,4)	84,3	(67,2-93,4)	37
JAAR	**2001**	94,4	(87,5-100,0)	94,4	(82,1-98,4)	65
	2008	97,7	(95,6-99,9)	97,7	(94,4-99,1)	114
	2013	95,5	(91,8-99,2)	95,6	(89,9-98,1)	101
	2018	92,3	(86,9-97,7)	92,2	(84,4-96,2)	133

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B178 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden insuline gebruikte, Vlaams Gewest

MA14_50		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	29,1	(17,9-40,3)	29,1	(19,0-41,9)	72
	Vrouwen	29,8	(16,9-42,6)	30,9	(19,7-44,9)	61
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	34,7	(21,7-47,7)	35,0	(23,0-49,3)	65
	75 +	25,0	(13,4-36,5)	25,0	(15,4-38,0)	68
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	28,1	(8,9-47,4)	30,1	(15,1-51,0)	30
	Lager secundair	23,5	(7,4-39,7)	24,6	(11,6-44,7)	30
	Hoger secundair	41,0	(22,0-60,0)	42,1	(25,6-60,5)	35
	Hoger onderwijs	24,6	(8,9-40,4)	24,4	(11,1-45,6)	37
JAAR	**2001**	35,8	(22,1-49,6)	35,9	(23,7-50,2)	62
	2008	21,6	(13,1-30,1)	21,6	(14,3-31,3)	113
	2013	20,6	(12,0-29,1)	20,6	(13,3-30,4)	101
	2018	29,4	(20,9-37,9)	29,5	(21,5-38,9)	133

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B179 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden orale antidiabetica gebruikte, Vlaams Gewest

MA14_60		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	91,4	(84,4-98,5)	91,5	(81,8-96,3)	71
	Vrouwen	84,6	(74,3-94,8)	84,0	(70,9-91,9)	61
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	86,2	(76,7-95,8)	85,4	(72,1-92,9)	65
	75 +	90,0	(82,0-98,1)	90,1	(79,4-95,6)	67
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	93,3	(84,3-100,0)	94,5	(76,7-98,9)	29
	Lager secundair	95,3	(88,2-100,0)	95,3	(81,0-99,0)	30
	Hoger secundair	89,1	(77,7-100,0)	87,7	(69,0-95,8)	35
	Hoger onderwijs	82,6	(67,4-97,7)	82,5	(64,9-92,3)	37
JAAR	**2001**	73,0	(59,9-86,2)	72,8	(58,4-83,6)	65
	2008	84,9	(77,7-92,1)	84,6	(75,7-90,6)	114
	2013	87,0	(80,3-93,6)	87,1	(78,8-92,5)	101
	2018	88,3	(82,1-94,5)	88,0	(80,1-93,0)	132

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B180 Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes volgens de behandeling van de aandoening, Vlaams Gewest

MA14_70		Geen behandeling	Enkel dieet	Orale antidiabetica	Insuline	N
GESLACHT	**Mannen**	3,6	2,4	65,0	29,1	72
	Vrouwen	3,7	6,1	60,4	29,8	61
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	2,0	6,5	56,8	34,7	65
	75 +	4,9	2,1	68,0	25,0	68
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	4,9	0.0	67,0	28,1	30
	Lager secundair	0.0	0.0	76,5	23,5	30
	Hoger secundair	3,3	0.0	55,7	41,0	35
	Hoger onderwijs	5,9	9,9	59,6	24,6	37
JAAR	**2001**	0,9	5,1	58,2	35,8	62
	2008	1,4	0,9	76,1	21,6	113
	2013	2,2	2,3	74,9	20,6	101
	2018	3,6	4,1	62,9	29,4	133

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

Tabel B181 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met allergie in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA15_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	13,3	(9,5-17,1)	13,3	(9,9-17,6)	467
	Vrouwen	18,1	(14,3-21,9)	18,1	(14,5-22,2)	513
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	15,5	(11,9-19,1)	15,5	(12,2-19,4)	519
	75 +	16,5	(12,3-20,7)	16,2	(12,4-20,9)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	16,9	(8,6-25,2)	16,1	(9,5-25,9)	139
	Lager secundair	17,0	(10,7-23,2)	16,3	(11,2-23,1)	234
	Hoger secundair	11,0	(7,3-14,7)	10,9	(7,7-15,2)	312
	Hoger onderwijs	20,1	(14,8-25,5)	20,4	(15,6-26,3)	287
JAAR	**2001**	9,1	(6,4-11,7)	8,9	(6,6-11,8)	688
	2004	10,1	(8,0-12,2)	9,9	(8,1-12,2)	1240
	2008	9,1	(6,0-12,2)	9,0	(6,3-12,6)	1082
	2013	9,7	(7,3-12,1)	9,6	(7,4-12,3)	745
	2018	16,0	(13,2-18,7)	15,9	(13,3-18,8)	980

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B182 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met een maagzweer in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA16_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,0	(0,1-1,9)	1,0	(0,4-2,5)	466
	Vrouwen	1,8	(0,6-2,9)	1,8	(0,9-3,4)	513
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	1,7	(0,6-2,8)	1,7	(0,9-3,1)	519
	75 +	1,2	(0,1-2,2)	1,1	(0,4-2,7)	460
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	1,5	(0,0-3,6)	1,6	(0,3-6,7)	139
	Lager secundair	2,2	(0,2-4,2)	2,1	(0,8-5,4)	234
	Hoger secundair	1,2	(0,1-2,3)	1,2	(0,4-3,0)	312
	Hoger onderwijs	0,8	(0,0-1,8)	0,7	(0,2-2,4)	287
JAAR	**1997**	3,0	(1,3-4,7)	3,0	(1,7-5,1)	559
	2001	5,3	(3,2-7,5)	5,3	(3,5-7,9)	690
	2004	2,6	(1,3-4,0)	2,6	(1,6-4,3)	1233
	2008	3,0	(0,4-5,6)	3,0	(1,3-6,9)	1091
	2013	2,1	(0,8-3,4)	2,1	(1,2-3,8)	745
	2018	1,4	(0,7-2,2)	1,4	(0,9-2,4)	979

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B183 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met leverlijden in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA17_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,6	(0,0-3,3)	1,6	(0,5-4,4)	467
	Vrouwen	2,8	(1,0-4,6)	2,8	(1,5-5,3)	512
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	2,6	(0,5-4,6)	2,5	(1,1-5,7)	518
	75 +	2,0	(0,5-3,5)	1,9	(0,9-3,8)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	2,7	(0,0-7,3)	2,9	(0,4-17,0)	139
	Lager secundair	4,2	(0,5-7,9)	4,0	(1,8-9,1)	234
	Hoger secundair	1,2	(0,0-2,6)	1,2	(0,4-3,5)	312
	Hoger onderwijs	1,7	(0,0-3,5)	1,5	(0,5-4,7)	286
JAAR	**2001**	1,8	(0,5-3,1)	1,7	(0,8-3,5)	689
	2004	1,6	(0,7-2,6)	1,5	(0,9-2,7)	1237
	2008	0,7	(0,2-1,2)	0,7	(0,3-1,4)	1088
	2013	0,9	(0,3-1,5)	0,9	(0,4-1,8)	744
	2018	2,3	(1,0-3,5)	2,2	(1,2-3,8)	979

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B184 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met kanker in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA18_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	7,6	(4,3-10,8)	7,5	(4,9-11,4)	467
	Vrouwen	4,4	(2,1-6,8)	4,3	(2,6-7,0)	512
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	4,9	(2,9-6,9)	4,6	(3,0-6,9)	519
	75 +	6,8	(3,6-10,1)	6,7	(4,1-10,9)	460
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	9,7	(2,2-17,1)	8,9	(4,1-18,2)	139
	Lager secundair	5,3	(2,1-8,6)	5,2	(2,8-9,4)	234
	Hoger secundair	6,2	(2,7-9,8)	5,9	(3,2-10,5)	311
	Hoger onderwijs	4,1	(1,3-6,8)	3,9	(2,0-7,5)	287
JAAR	**1997**	4,7	(0,8-8,6)	4,6	(2,0-10,0)	559
	2001	4,2	(1,9-6,5)	4,1	(2,4-7,2)	690
	2004	2,5	(1,4-3,6)	2,5	(1,6-3,8)	1233
	2008	6,3	(4,0-8,5)	6,2	(4,4-8,9)	1088
	2013	4,9	(2,7-7,1)	4,9	(3,1-7,6)	745
	2018	5,8	(3,9-7,7)	5,8	(4,2-8,1)	979

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B185 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ernstige hoofdpijn zoals migraine in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA19_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	2,3	(0,8-3,8)	2,3	(1,2-4,5)	467
	Vrouwen	6,5	(4,1-8,9)	6,5	(4,5-9,5)	513
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	4,8	(2,7-6,9)	4,4	(2,9-6,7)	519
	75 +	4,5	(2,3-6,7)	3,9	(2,2-6,7)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	7,4	(2,0-12,9)	7,0	(3,2-14,7)	139
	Lager secundair	5,5	(1,9-9,1)	4,7	(2,4-9,0)	234
	Hoger secundair	4,6	(2,2-6,9)	4,2	(2,4-7,0)	312
	Hoger onderwijs	2,9	(0,8-5,0)	2,6	(1,2-5,3)	287
JAAR	**1997**	3,7	(1,9-5,5)	2,9	(1,7-4,9)	556
	2001	5,3	(3,5-7,2)	4,4	(3,0-6,4)	689
	2004	4,0	(2,6-5,3)	3,3	(2,3-4,6)	1236
	2008	6,9	(4,7-9,2)	5,9	(4,2-8,1)	1080
	2013	8,3	(5,6-11,0)	7,1	(5,2-9,8)	745
	2018	4,7	(3,2-6,2)	4,0	(2,8-5,5)	980

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B186 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met urinaire incontinentie in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA20_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	15,6	(11,5-19,7)	14,2	(10,7-18,6)	467
	Vrouwen	14,9	(11,4-18,4)	12,6	(9,7-16,2)	513
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	7,9	(5,3-10,5)	7,9	(5,6-10,9)	519
	75 +	22,9	(18,1-27,6)	22,9	(18,5-28,0)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	33,0	(23,4-42,5)	26,6	(18,0-37,4)	139
	Lager secundair	14,3	(9,4-19,3)	12,3	(8,5-17,6)	234
	Hoger secundair	11,8	(7,4-16,3)	10,7	(7,3-15,4)	312
	Hoger onderwijs	11,0	(6,7-15,3)	11,2	(7,4-16,6)	287
JAAR	**2008**	12,7	(10,1-15,3)	11,2	(8,8-14,2)	1078
	2013	14,1	(11,1-17,1)	12,3	(9,9-15,2)	745
	2018	15,2	(12,5-17,9)	13,6	(11,2-16,4)	980

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B187 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met depressie in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA21_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	6,4	(3,5-9,3)	6,2	(4,0-9,5)	467
	Vrouwen	8,6	(5,8-11,3)	8,0	(5,7-11,2)	512
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	5,4	(3,2-7,5)	5,4	(3,6-7,9)	518
	75 +	9,9	(6,6-13,3)	9,8	(6,9-13,7)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	12,6	(4,9-20,2)	11,2	(5,8-20,5)	139
	Lager secundair	11,9	(6,8-17,0)	11,2	(7,2-16,9)	234
	Hoger secundair	5,8	(3,2-8,5)	5,7	(3,6-9,0)	312
	Hoger onderwijs	3,5	(1,3-5,8)	3,7	(1,9-6,8)	286
JAAR	**1997**	6,6	(3,8-9,5)	6,6	(4,2-10,0)	559
	2001	6,1	(3,7-8,6)	6,0	(3,9-9,0)	687
	2004	5,6	(3,9-7,4)	5,5	(4,1-7,5)	1234
	2008	6,3	(3,5-9,2)	6,1	(3,8-9,8)	1082
	2013	8,2	(5,5-10,8)	7,9	(5,6-10,9)	745
	2018	7,6	(5,6-9,6)	7,4	(5,7-9,6)	979

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B188 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met schildklierlijden in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA22_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	2,5	(0,9-4,2)	2,5	(1,3-4,7)	467
	Vrouwen	13,4	(10,1-16,8)	13,5	(10,5-17,2)	513
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	9,1	(6,4-11,8)	7,3	(5,0-10,4)	519
	75 +	8,1	(5,1-11,1)	5,9	(3,8-9,0)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	8,5	(3,2-13,8)	6,5	(3,1-13,3)	139
	Lager secundair	8,2	(3,8-12,7)	5,9	(3,3-10,3)	234
	Hoger secundair	9,2	(5,7-12,7)	7,3	(4,6-11,3)	312
	Hoger onderwijs	8,6	(5,0-12,3)	6,7	(4,2-10,7)	287
JAAR	**1997**	3,8	(1,4-6,2)	2,7	(1,4-5,2)	556
	2001	6,2	(3,6-8,9)	4,8	(3,1-7,4)	688
	2004	5,2	(3,6-6,8)	4,0	(2,9-5,5)	1231
	2008	5,4	(3,7-7,1)	4,1	(2,9-5,8)	1088
	2013	6,1	(4,1-8,1)	4,7	(3,3-6,7)	745
	2018	8,6	(6,6-10,6)	6,9	(5,3-8,9)	980

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B189 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met cataract in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA2301_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	11,2	(7,9-14,6)	11,0	(8,1-14,6)	466
	Vrouwen	14,2	(10,8-17,6)	13,4	(10,3-17,2)	513
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	9,3	(6,5-12,1)	9,3	(6,9-12,5)	519
	75 +	16,7	(12,7-20,7)	16,6	(12,9-21,0)	460
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	12,6	(6,2-19,1)	10,5	(6,0-17,8)	138
	Lager secundair	11,7	(6,7-16,8)	10,6	(6,6-16,6)	234
	Hoger secundair	16,2	(11,3-21,0)	15,7	(11,5-21,0)	312
	Hoger onderwijs	10,2	(6,1-14,3)	10,6	(7,1-15,5)	287
JAAR	**1997**	4,5	(2,3-6,6)	4,5	(2,8-7,3)	557
	2001	6,9	(4,8-9,1)	6,6	(4,8-9,0)	688
	2004	6,3	(4,6-8,0)	6,1	(4,7-7,9)	1234
	2008	10,6	(8,2-12,9)	9,8	(7,8-12,2)	1078
	2013	11,6	(8,8-14,4)	10,6	(8,2-13,5)	745
	2018	12,9	(10,4-15,4)	12,0	(9,8-14,6)	979

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B190 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met glaucoom in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA2302_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	3,0	(1,2-4,7)	2,8	(1,5-5,3)	466
	Vrouwen	3,0	(1,4-4,5)	2,7	(1,6-4,5)	513
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	2,0	(0,7-3,4)	2,0	(1,0-3,9)	519
	75 +	3,9	(2,0-5,8)	3,9	(2,4-6,3)	460
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	2,9	(0,3-5,5)	2,3	(0,9-5,9)	138
	Lager secundair	2,2	(0,4-4,0)	2,0	(0,9-4,3)	234
	Hoger secundair	3,0	(0,9-5,1)	2,8	(1,3-6,2)	312
	Hoger onderwijs	3,6	(1,0-6,2)	3,7	(1,9-7,3)	287
JAAR	**1997**	3,0	(1,6-4,4)	3,0	(1,9-4,8)	557
	2001	5,1	(3,3-7,0)	5,1	(3,6-7,2)	686
	2004	6,2	(4,5-8,0)	6,2	(4,7-8,2)	1235
	2008	6,1	(4,0-8,2)	6,0	(4,2-8,4)	1079
	2013	2,7	(1,4-3,9)	2,6	(1,6-4,2)	745
	2018	3,0	(1,8-4,1)	2,9	(2,0-4,3)	979

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B191 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetische retinopathie in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA2303_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,8	(0,0-1,5)	0,6	(0,2-1,6)	466
	Vrouwen	1,4	(0,3-2,4)	1,0	(0,4-2,5)	513
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	0,4	(0,0-0,9)	0,4	(0,1-1,3)	519
	75 +	1,9	(0,6-3,1)	1,8	(0,9-3,6)	460
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	0,8	(0,0-2,3)	0,4	(0,0-5,0)	138
	Lager secundair	1,4	(0,0-3,0)	0,9	(0,3-2,8)	234
	Hoger secundair	1,0	(0,0-2,2)	0,7	(0,2-2,3)	312
	Hoger onderwijs	1,2	(0,0-2,5)	1,1	(0,4-2,9)	287
JAAR	**2013**	0,5	(0,0-1,0)	0,4	(0,1-1,1)	745
	2018	1,1	(0,4-1,8)	0,9	(0,5-1,7)	979

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B192 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met maculadegeneratie in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA2304_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,0	.	.	.	466
	Vrouwen	0,0	.	.	.	513
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	0,0	.	.	.	519
	75 +	0,0	.	.	.	460
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	0,0	.	.	.	138
	Lager secundair	0,0	.	.	.	234
	Hoger secundair	0,0	.	.	.	312
	Hoger onderwijs	0,0	.	.	.	287
JAAR	**2013**	1,2	(0,4-2,0)	.	.	745
	2018	0,0	.	.	.	979

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B193 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ziekte van Parkinson in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA24_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	3,0	(1,2-4,8)	2,8	(1,6-5,1)	467
	Vrouwen	1,5	(0,3-2,8)	1,4	(0,6-3,4)	512
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	1,5	(0,4-2,7)	1,4	(0,6-3,3)	518
	75 +	2,8	(1,1-4,6)	2,7	(1,5-5,0)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	3,1	(0,0-6,6)	2,4	(0,7-8,1)	139
	Lager secundair	1,0	(0,0-2,1)	0,9	(0,3-2,5)	233
	Hoger secundair	2,6	(0,5-4,8)	2,3	(1,0-5,6)	312
	Hoger onderwijs	2,2	(0,2-4,2)	2,1	(0,8-5,3)	287
JAAR	**1997**	2,3	(0,3-4,3)	2,4	(1,0-5,7)	559
	2001	1,5	(0,7-2,3)	1,4	(0,8-2,5)	689
	2004	1,2	(0,5-1,8)	1,1	(0,7-2,0)	1235
	2008	1,8	(0,8-2,9)	1,7	(0,9-2,9)	1091
	2013	2,5	(1,1-3,9)	2,2	(1,3-3,9)	745
	2018	2,2	(1,1-3,2)	2,0	(1,2-3,2)	979

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B194 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met epilepsie in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA25_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,6	(0,0-3,2)	1,4	(0,5-3,4)	467
	Vrouwen	0,5	(0,0-1,1)	0,5	(0,1-1,6)	513
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	1,5	(0,1-2,9)	1,3	(0,5-3,0)	519
	75 +	0,5	(0,0-1,0)	0,4	(0,1-1,5)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	2,3	(0,0-6,8)	2,2	(0,5-9,5)	139
	Lager secundair	0,4	(0,0-1,1)	0,3	(0,1-1,8)	234
	Hoger secundair	0,6	(0,0-1,3)	0,3	(0,0-2,7)	312
	Hoger onderwijs	1,0	(0,0-2,2)	0,5	(0,1-2,6)	287
JAAR	**1997**	1,8	(0,0-4,8)	1,5	(0,3-6,1)	558
	2001	0,8	(0,1-1,5)	0,6	(0,3-1,6)	689
	2004	0,5	(0,0-0,9)	0,4	(0,1-1,0)	1237
	2008	0,3	(0,0-0,6)	0,4	(0,1-1,4)	1093
	2013	1,2	(0,3-2,1)	1,0	(0,4-2,4)	745
	2018	1,0	(0,2-1,8)	0,8	(0,4-1,8)	980

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B195 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met langdurige vermoeidheid in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA26_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	8,1	(4,8-11,3)	8,1	(5,4-11,9)	467
	Vrouwen	9,9	(6,8-13,0)	9,8	(7,2-13,3)	512
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	8,4	(5,8-11,1)	8,4	(6,2-11,5)	519
	75 +	9,8	(6,1-13,5)	9,7	(6,6-14,1)	460
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	10,9	(3,3-18,5)	10,6	(5,2-20,4)	139
	Lager secundair	9,8	(5,5-14,2)	9,6	(6,2-14,7)	234
	Hoger secundair	9,0	(4,9-13,1)	9,0	(5,7-13,9)	312
	Hoger onderwijs	7,3	(3,8-10,8)	7,4	(4,6-11,7)	286
JAAR	**2001**	7,0	(4,8-9,2)	6,8	(5,0-9,3)	687
	2004	5,2	(3,6-6,8)	5,1	(3,7-6,9)	1235
	2008	3,5	(2,1-4,9)	3,4	(2,2-5,0)	1084
	2013	4,7	(3,1-6,4)	4,5	(3,2-6,4)	745
	2018	9,1	(6,9-11,3)	8,8	(6,8-11,3)	979

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B196 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met osteoporose in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA27_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	2,9	(1,1-4,7)	2,9	(1,6-5,3)	467
	Vrouwen	17,3	(13,5-21,1)	17,1	(13,6-21,2)	513
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	9,5	(6,5-12,5)	7,4	(5,2-10,4)	519
	75 +	12,4	(8,8-16,1)	9,1	(6,2-13,2)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	10,8	(5,4-16,2)	7,5	(4,1-13,3)	139
	Lager secundair	16,5	(10,6-22,3)	11,7	(7,6-17,6)	234
	Hoger secundair	8,5	(4,9-12,1)	6,5	(3,9-10,6)	312
	Hoger onderwijs	9,7	(5,4-13,9)	7,8	(4,8-12,3)	287
JAAR	**1997**	7,7	(4,6-10,8)	5,9	(3,9-8,9)	558
	2001	12,3	(8,5-16,1)	9,6	(6,9-13,3)	690
	2004	10,2	(8,2-12,3)	8,0	(6,4-10,0)	1225
	2008	15,0	(12,2-17,8)	11,8	(9,4-14,5)	1056
	2013	12,0	(9,3-14,6)	9,1	(7,1-11,6)	740
	2018	10,9	(8,6-13,3)	8,4	(6,6-10,6)	980

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B197 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met gebroken heup in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA28_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,5	(0,1-2,8)	1,3	(0,6-3,0)	467
	Vrouwen	1,8	(0,7-3,0)	1,5	(0,7-3,3)	513
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	0,9	(0,1-1,6)	0,9	(0,3-2,1)	519
	75 +	2,5	(1,0-4,1)	2,5	(1,3-4,8)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	2,0	(0,0-4,2)	1,4	(0,3-5,3)	139
	Lager secundair	3,1	(0,7-5,5)	2,5	(1,1-5,6)	234
	Hoger secundair	0,8	(0,0-2,2)	0,7	(0,1-3,5)	312
	Hoger onderwijs	1,4	(0,1-2,8)	1,5	(0,6-3,7)	287
JAAR	**2001**	1,4	(0,4-2,4)	1,4	(0,7-2,7)	690
	2004	1,1	(0,3-2,0)	1,1	(0,5-2,4)	1235
	2008	0,9	(0,2-1,6)	0,8	(0,4-1,9)	1091
	2013	2,2	(1,0-3,5)	2,1	(1,1-3,8)	745
	2018	1,7	(0,8-2,6)	1,6	(0,9-2,6)	980

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B198 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met darmziekte, langer dan 3 maanden in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA29_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	7,1	(3,9-10,4)	7,1	(4,5-11,0)	467
	Vrouwen	9,7	(6,8-12,7)	9,5	(7,0-12,9)	513
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	7,2	(4,5-9,9)	7,2	(5,0-10,4)	519
	75 +	10,0	(6,4-13,6)	9,8	(6,7-14,2)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	14,5	(5,8-23,1)	13,7	(7,0-25,1)	139
	Lager secundair	11,3	(5,5-17,0)	10,9	(6,4-17,7)	234
	Hoger secundair	6,3	(3,3-9,3)	6,3	(3,9-9,9)	312
	Hoger onderwijs	6,4	(3,5-9,3)	6,6	(4,2-10,2)	287
JAAR	**1997**	4,3	(2,0-6,5)	4,2	(2,5-7,2)	557
	2001	6,7	(3,4-9,9)	6,6	(4,1-10,4)	688
	2004	4,9	(3,4-6,4)	4,9	(3,6-6,6)	1239
	2008	4,9	(3,1-6,8)	4,7	(3,2-6,9)	1090
	2013	5,3	(3,5-7,1)	5,1	(3,6-7,1)	745
	2018	8,6	(6,4-10,8)	8,4	(6,4-10,9)	980

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B199 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met nierstenen in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA30_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,7	(0,4-2,9)	1,5	(0,6-3,6)	467
	Vrouwen	0,7	(0,0-1,7)	0,6	(0,2-2,0)	513
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	0,6	(0,0-1,4)	0,6	(0,2-1,8)	519
	75 +	1,7	(0,4-3,0)	1,6	(0,6-3,9)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	0,4	(0,0-1,3)	0,3	(0,0-2,0)	139
	Lager secundair	0,8	(0,0-2,2)	0,6	(0,1-5,5)	234
	Hoger secundair	2,0	(0,2-3,8)	1,6	(0,6-4,2)	312
	Hoger onderwijs	0,9	(0,0-1,7)	0,8	(0,3-2,0)	287
JAAR	**1997**	2,3	(0,7-4,0)	2,3	(1,1-4,7)	557
	2001	1,5	(0,5-2,6)	1,5	(0,8-3,0)	689
	2004	1,5	(0,6-2,3)	1,4	(0,8-2,6)	1235
	2008	1,3	(0,4-2,3)	1,3	(0,7-2,6)	1089
	2013	0,8	(0,2-1,5)	0,8	(0,4-1,8)	745
	2018	1,2	(0,4-1,9)	1,1	(0,6-2,2)	980

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B200 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ernstige nierziekte behalve nierstenen in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA31_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	2,3	(0,5-4,1)	2,2	(1,0-4,9)	467
	Vrouwen	1,3	(0,4-2,3)	1,2	(0,6-2,5)	513
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	1,3	(0,2-2,4)	1,2	(0,5-2,8)	519
	75 +	2,3	(0,7-3,8)	2,2	(1,1-4,3)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	1,9	(0,0-4,0)	1,6	(0,5-4,7)	139
	Lager secundair	0,6	(0,0-1,4)	0,5	(0,1-2,2)	234
	Hoger secundair	2,8	(0,4-5,2)	2,6	(1,1-5,7)	312
	Hoger onderwijs	1,5	(0,2-2,8)	1,5	(0,6-3,6)	287
JAAR	**1997**	1,9	(0,0-3,7)	1,8	(0,7-4,7)	556
	2001	1,2	(0,0-2,3)	1,2	(0,4-3,0)	688
	2004	1,2	(0,5-1,9)	1,2	(0,6-2,2)	1239
	2008	0,9	(0,2-1,5)	0,9	(0,4-1,8)	1091
	2013	2,2	(1,0-3,4)	2,2	(1,3-3,7)	745
	2018	1,8	(0,8-2,7)	1,8	(1,0-3,0)	980

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B201 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met chronische blaasontsteking in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA32_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	3,8	(1,0-6,6)	3,7	(1,9-7,3)	467
	Vrouwen	6,6	(4,3-8,9)	6,2	(4,2-9,1)	513
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	3,9	(2,0-5,7)	3,8	(2,4-6,0)	519
	75 +	7,0	(3,9-10,0)	6,7	(4,0-11,0)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	8,7	(1,4-16,0)	7,3	(3,0-17,1)	139
	Lager secundair	5,3	(1,9-8,8)	4,7	(2,4-9,0)	234
	Hoger secundair	5,6	(2,7-8,6)	5,4	(3,2-9,0)	312
	Hoger onderwijs	3,6	(1,1-6,1)	3,7	(1,9-7,2)	287
JAAR	**1997**	2,4	(0,9-3,8)	2,4	(1,3-4,3)	557
	2001	3,8	(2,2-5,4)	3,6	(2,3-5,5)	688
	2004	3,8	(2,5-5,2)	3,7	(2,6-5,3)	1236
	2008	2,4	(1,3-3,5)	2,2	(1,4-3,5)	1091
	2013	3,1	(1,8-4,5)	2,8	(1,8-4,3)	745
	2018	5,4	(3,6-7,1)	5,0	(3,5-7,0)	980

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B202 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ernstige of chronische huidaandoening in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA33_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	4,8	(2,5-7,2)	4,8	(3,0-7,8)	467
	Vrouwen	5,7	(3,6-7,8)	5,6	(3,9-8,1)	513
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	5,0	(3,0-7,1)	5,0	(3,3-7,5)	519
	75 +	5,6	(3,3-8,0)	5,6	(3,7-8,4)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	4,8	(1,2-8,5)	4,6	(2,1-9,7)	139
	Lager secundair	5,8	(2,4-9,2)	5,6	(3,1-10,0)	234
	Hoger secundair	3,7	(1,6-5,8)	3,7	(2,1-6,5)	312
	Hoger onderwijs	7,2	(3,6-10,7)	7,3	(4,4-11,9)	287
JAAR	**1997**	3,4	(1,5-5,3)	3,5	(2,0-6,0)	558
	2001	3,6	(2,1-5,2)	3,6	(2,4-5,5)	689
	2004	3,9	(2,5-5,3)	3,9	(2,7-5,6)	1236
	2008	3,7	(1,1-6,2)	3,7	(1,8-7,3)	1090
	2013	4,0	(2,4-5,6)	4,0	(2,7-5,8)	745
	2018	5,3	(3,8-6,9)	5,3	(3,9-7,1)	980

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B203 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met galstenen of galblaasontsteking in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA34_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,8	(0,0-3,6)	1,7	(0,6-4,8)	467
	Vrouwen	3,3	(1,6-5,1)	3,4	(2,0-5,6)	513
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	2,9	(1,0-4,8)	2,8	(1,4-5,6)	519
	75 +	2,4	(0,7-4,0)	2,2	(1,1-4,6)	461
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	3,4	(0,0-8,4)	3,4	(0,6-16,6)	139
	Lager secundair	1,8	(0,0-3,5)	1,6	(0,6-4,4)	234
	Hoger secundair	2,6	(0,5-4,8)	2,5	(1,1-5,8)	312
	Hoger onderwijs	3,1	(0,6-5,5)	2,9	(1,3-6,3)	287
JAAR	**1997**	2,5	(0,8-4,3)	2,4	(1,2-4,7)	556
	2001	3,0	(1,4-4,6)	2,8	(1,7-4,7)	690
	2004	2,4	(1,4-3,5)	2,3	(1,5-3,5)	1236
	2008	2,1	(1,1-3,1)	1,9	(1,2-3,2)	1087
	2013	1,5	(0,6-2,4)	1,4	(0,7-2,6)	744
	2018	2,6	(1,4-3,9)	2,5	(1,5-4,1)	980

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B204 Percentage van de mannelijke bevolking van 65 jaar en ouder met prostaatklachten in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

MA35_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
LEEFTIJDSGROEP						
	65 - 74	12,8	(8,5-17,1)	12,8	(9,1-17,8)	258
	75 +	24,7	(17,3-32,0)	24,7	(18,1-32,6)	209
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	25,7	(9,5-41,9)	21,4	(10,6-38,3)	59
	Lager secundair	17,1	(8,8-25,4)	15,6	(9,5-24,5)	98
	Hoger secundair	14,2	(8,2-20,3)	13,6	(8,7-20,5)	155
	Hoger onderwijs	21,1	(13,6-28,5)	21,4	(14,7-30,1)	150
JAAR	**1997**	11,5	(6,2-16,9)	12,2	(7,6-18,9)	243
	2001	17,9	(13,4-22,4)	18,0	(13,8-23,1)	332
	2004	16,1	(12,3-19,9)	16,2	(12,7-20,4)	523
	2008	13,2	(8,8-17,7)	13,0	(9,2-18,1)	427
	2013	15,7	(11,0-20,5)	15,3	(11,2-20,5)	336
	2018	18,2	(14,0-22,3)	17,7	(14,0-22,0)	467

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B205 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens aantal aandoeningen waaraan ze lijden °, Vlaams Gewest

MA_1		Geen	1	2	3 of meer	N
GESLACHT	**Mannen**	62,2	23,2	10,5	4,0	1764
	Vrouwen	58,4	25,7	11,0	4,9	1864
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	86,1	12,7	1,1	0.0	378
	25 - 34	88,9	10,3	0,8	0.0	452
	35 - 44	78,4	16,7	4,5	0,3	533
	45 - 54	61,8	27,3	8,7	2,2	637
	55 - 64	41,5	36,1	16,4	6,0	652
	65 - 74	32,0	37,4	21,2	9,4	517
	75 +	26,9	31,1	25,8	16,3	459
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	38,6	30,6	14,2	16,6	203
	Lager secundair	42,5	27,8	21,8	7,9	459
	Hoger secundair	58,4	25,9	11,8	3,9	1218
	Hoger onderwijs	68,7	22,0	6,6	2,7	1719
JAAR	**1997**	72,3	20,2	5,9	1,6	2970
	2001	68,2	21,2	7,8	2,8	3437
	2004	67,5	21,9	7,9	2,7	3876
	2013	63,9	22,4	10,0	3,7	2990
	2018	60,3	24,5	10,7	4,5	3628

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

° op een totaal van 6 chronische aandoeningen: chronisch longlijden, hartlijden, diabetes, artritis/artrose, hypertensie, kanker

Tabel B206 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met multimorbiditeit *, Vlaams Gewest

MA_2		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	14,5	(12,6-16,4)	7,6	(6,0-9,7)	1764
	Vrouwen	15,9	(14,0-17,7)	7,6	(5,9-9,8)	1864
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	1,1	(0,0-2,5)	1,1	(0,3-3,7)	378
	25 - 34	0,8	(0,0-1,5)	0,8	(0,3-2,0)	452
	35 - 44	4,9	(2,9-6,8)	4,9	(3,3-7,2)	533
	45 - 54	10,9	(8,1-13,8)	10,9	(8,4-14,1)	637
	55 - 64	22,4	(18,5-26,2)	22,4	(18,8-26,4)	652
	65 - 74	30,6	(26,1-35,0)	30,6	(26,3-35,2)	517
	75 +	42,1	(36,6-47,5)	42,1	(36,7-47,6)	459
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	30,8	(22,7-38,8)	9,3	(6,1-13,9)	203
	Lager secundair	29,7	(24,7-34,7)	11,4	(8,4-15,2)	459
	Hoger secundair	15,7	(13,5-18,0)	8,5	(6,5-11,0)	1218
	Hoger onderwijs	9,4	(7,6-11,1)	6,0	(4,6-7,8)	1719
JAAR	**1997**	7,5	(6,2-8,8)	5,1	(4,1-6,3)	2970
	2001	10,6	(9,3-12,0)	5,7	(4,8-6,8)	3437
	2004	10,6	(9,4-11,7)	5,5	(4,7-6,5)	3876
	2013	13,6	(12,0-15,2)	6,7	(5,6-7,9)	2990
	2018	15,2	(13,8-16,6)	7,3	(6,3-8,6)	3628

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)
Meer dan één van de volgende aandoeningen: chronisch longlijden, hartlijden, diabetes, artritis/artrose, hypertensie, kanker

Tabel B207 Gemiddeld aantal chronische aandoeningen bij personen van 15 jaar en ouder (op een totaal van 25 aandoeningen°), Vlaams Gewest

MA_3		Gemiddelde (Ruw)	95% BI gemid	Gemiddelde (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,2	(1,1-1,3)	1,2	(1,1-1,3)	1760
	Vrouwen	1,6	(1,5-1,7)	1,5	(1,5-1,6)	1858
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,7	(0,5-0,8)	0,7	(0,5-0,8)	378
	25 - 34	0,8	(0,7-1,0)	0,8	(0,7-1,0)	451
	35 - 44	0,9	(0,8-1,1)	1,0	(0,8-1,1)	530
	45 - 54	1,3	(1,2-1,5)	1,4	(1,2-1,5)	637
	55 - 64	1,6	(1,5-1,8)	1,6	(1,5-1,8)	651
	65 - 74	2,0	(1,8-2,2)	2,0	(1,8-2,2)	515
	75 +	2,6	(2,3-2,9)	2,5	(2,2-2,8)	456
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	2,4	(1,8-2,9)	1,8	(1,4-2,3)	202
	Lager secundair	2,0	(1,8-2,2)	1,6	(1,4-1,8)	457
	Hoger secundair	1,4	(1,3-1,5)	1,4	(1,3-1,5)	1215
	Hoger onderwijs	1,1	(1,0-1,2)	1,2	(1,2-1,3)	1716
JAAR	**2001**	1,0	(0,9-1,1)	1,1	(1,0-1,1)	3408
	2004	1,0	(0,9-1,0)	1,0	(1,0-1,1)	3767
	2013	1,2	(1,1-1,2)	1,2	(1,1-1,2)	2983
	2018	1,4	(1,3-1,5)	1,4	(1,3-1,4)	3618

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

° Astma, chronisch longlijden, hartlijden, hoge bloeddruk, beroerte, artritis/artrose, diabetes, allergie, maagzweer, chronische darmproblemen, leverlijden, galstenen/ontsteking van de galblaas, kanker, ernstige hoofdpijn, depressie, schildklierlijden, glaucoom, cataract, ziekte van Parkinson, epilepsie, ernstig nierlijden/nierstenen, chronische blaasontsteking, chronische vermoeidheid, osteoporose, ernstige huidziekte

Tabel B208 Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder volgens aantal aandoeningen waaraan ze lijden °, Vlaams Gewest

MA_10		Geen	1	2	3 of meer	N
GESLACHT	**Mannen**	31,8	32,3	23,0	12,9	466
	Vrouwen	27,7	36,0	23,8	12,6	510
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	32,0	37,4	21,2	9,4	517
	75 +	26,9	31,1	25,8	16,3	459
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	25,3	34,1	17,0	23,6	138
	Lager secundair	27,4	29,2	30,8	12,6	234
	Hoger secundair	32,7	33,7	23,7	9,9	310
	Hoger onderwijs	30,3	38,9	19,6	11,3	286
JAAR	**1997**	35,2	39,2	18,7	6,8	555
	2001	31,0	34,8	24,5	9,8	674
	2004	31,8	36,1	22,7	9,5	1212
	2013	30,6	31,9	25,3	12,2	744
	2018	29,5	34,3	23,4	12,7	976

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
° op een totaal van 6 chronische aandoeningen: chronisch longlijden, hartlijden, diabetes, artritis/artrose, hypertensie, kanker

Tabel B209 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met multimorbiditeit *, Vlaams Gewest

MA_20		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	35,9	(30,7-41,1)	35,9	(30,9-41,2)	466
	Vrouwen	36,4	(31,6-41,2)	35,7	(31,1-40,6)	510
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	30,6	(26,1-35,0)	30,6	(26,3-35,2)	517
	75 +	42,1	(36,6-47,5)	42,1	(36,7-47,6)	459
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	40,6	(30,0-51,1)	37,8	(28,3-48,5)	138
	Lager secundair	43,4	(35,8-51,0)	42,6	(35,2-50,3)	234
	Hoger secundair	33,6	(27,8-39,5)	33,4	(27,9-39,3)	310
	Hoger onderwijs	30,9	(24,3-37,5)	31,8	(25,5-38,9)	286
JAAR	**1997**	25,6	(19,5-31,7)	26,0	(20,4-32,6)	555
	2001	34,2	(29,7-38,7)	34,3	(30,1-38,8)	674
	2004	32,1	(28,7-35,6)	32,3	(29,0-35,9)	1212
	2013	37,6	(33,2-41,9)	37,1	(32,9-41,5)	744
	2018	36,2	(32,6-39,7)	35,9	(32,5-39,5)	976

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)
Meer dan één van de volgende aandoeningen: chronisch longlijden, hartlijden, diabetes, artritis/artrose, hypertensie, kanker

Tabel B210 Gemiddeld aantal chronische aandoeningen bij personen van 65 jaar en ouder (op een totaal van 25 aandoeningen°), Vlaams Gewest

MA_30		Gemiddelde (Ruw)	95% BI gemid	Gemiddelde (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	2,0	(1,8-2,3)	2,0	(1,8-2,3)	464
	Vrouwen	2,5	(2,3-2,7)	2,5	(2,3-2,7)	507
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	2,0	(1,8-2,2)	2,0	(1,9-2,2)	515
	75 +	2,6	(2,3-2,9)	2,6	(2,3-2,9)	456
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	2,8	(2,1-3,6)	2,7	(2,0-3,4)	137
	Lager secundair	2,5	(2,2-2,9)	2,4	(2,1-2,8)	233
	Hoger secundair	2,1	(1,8-2,4)	2,1	(1,9-2,4)	310
	Hoger onderwijs	2,1	(1,8-2,3)	2,1	(1,9-2,4)	284
JAAR	**2001**	2,0	(1,9-2,2)	2,1	(1,9-2,2)	665
	2004	1,9	(1,8-2,0)	1,9	(1,8-2,0)	1159
	2013	2,1	(1,9-2,3)	2,1	(1,9-2,3)	738
	2018	2,3	(2,1-2,5)	2,3	(2,1-2,5)	971

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

° Astma, chronisch longlijden, hartlijden, hoge bloeddruk, beroerte, artritis/artrose, diabetes, allergie, maagzweer, chronische darmproblemen, leverlijden, galstenen/ontsteking van de galblaas, kanker, ernstige hoofdpijn, depressie, schildklierlijden, glaucoom, cataract, ziekte van Parkinson, epilepsie, ernstig nierlijden/nierstenen, chronische blaasontsteking, chronische vermoeidheid, osteoporose, ernstige huidziekte

Tabel B211 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een zelfgerapporteerde chronische ziekte of aandoening, Brussels Gewest

MA_SH02		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	26,0	(22,8-29,2)	26,6	(23,3-30,1)	840
	Vrouwen	31,1	(27,9-34,3)	30,7	(27,4-34,2)	991
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	13,2	(6,9-19,4)	13,2	(8,1-20,7)	128
	25 - 34	15,1	(10,9-19,4)	15,1	(11,3-19,8)	318
	35 - 44	26,3	(21,4-31,2)	26,3	(21,7-31,4)	377
	45 - 54	32,6	(26,7-38,5)	32,6	(27,0-38,7)	316
	55 - 64	40,5	(33,8-47,2)	40,3	(33,8-47,1)	293
	65 - 74	42,8	(36,2-49,5)	42,6	(36,1-49,3)	240
	75 +	47,6	(38,0-57,1)	47,0	(37,7-56,5)	159
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	36,5	(26,3-46,8)	35,3	(26,5-45,2)	108
	Lager secundair	39,4	(29,2-49,7)	36,4	(27,0-47,0)	150
	Hoger secundair	26,6	(21,8-31,5)	28,0	(23,3-33,3)	413
	Hoger onderwijs	26,5	(23,5-29,5)	26,3	(23,3-29,6)	1114
JAAR	**2001**	28,7	(26,5-30,9)	28,6	(26,4-31,0)	2158
	2004	30,6	(28,2-33,0)	31,5	(29,0-34,1)	2006
	2008	31,7	(29,3-34,1)	32,6	(30,1-35,3)	1867
	2013	32,3	(29,0-35,5)	32,5	(29,4-35,8)	1317
	2018	28,7	(26,2-31,1)	28,5	(26,1-31,0)	1831

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B212 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met astma in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA01_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	5,5	(4,1-6,9)	5,7	(4,4-7,2)	1169
	Vrouwen	8,7	(6,8-10,6)	8,9	(7,2-11,0)	1344
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	9,5	(4,5-14,5)	9,3	(5,5-15,3)	230
	25 - 34	3,8	(2,0-5,7)	3,7	(2,3-5,9)	447
	35 - 44	6,0	(3,9-8,1)	5,9	(4,2-8,4)	516
	45 - 54	7,3	(4,4-10,3)	7,2	(4,8-10,8)	439
	55 - 64	8,3	(5,2-11,3)	8,1	(5,5-11,7)	378
	65 - 74	10,9	(7,2-14,7)	10,6	(7,5-14,7)	291
	75 +	8,9	(4,6-13,2)	8,2	(5,0-13,3)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	9,1	(4,9-13,4)	8,7	(5,4-13,7)	227
	Lager secundair	12,5	(4,8-20,3)	11,5	(6,3-20,1)	222
	Hoger secundair	6,3	(4,2-8,4)	6,4	(4,5-8,9)	610
	Hoger onderwijs	6,1	(4,7-7,5)	6,0	(4,7-7,7)	1401
JAAR	**2001**	6,4	(5,3-7,5)	6,5	(5,5-7,7)	2447
	2004	5,9	(4,8-6,9)	6,0	(5,0-7,1)	2966
	2008	6,0	(4,9-7,1)	6,1	(5,1-7,3)	2796
	2013	5,7	(4,3-7,1)	5,9	(4,6-7,6)	2532
	2018	7,2	(5,9-8,4)	7,4	(6,2-8,8)	2513

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B213 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met chronisch longlijden in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA02_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	3,2	(2,2-4,2)	3,0	(2,2-4,1)	1168
	Vrouwen	4,2	(2,8-5,7)	3,8	(2,5-5,9)	1344
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	2,2	(0,0-5,9)	2,2	(0,4-10,8)	230
	25 - 34	1,4	(0,2-2,6)	1,4	(0,6-3,3)	447
	35 - 44	1,2	(0,3-2,1)	1,2	(0,6-2,5)	516
	45 - 54	4,2	(2,2-6,3)	4,2	(2,6-6,8)	439
	55 - 64	8,8	(5,5-12,0)	8,7	(5,9-12,6)	378
	65 - 74	6,9	(3,9-9,9)	6,8	(4,4-10,4)	290
	75 +	6,6	(3,3-9,9)	6,4	(3,8-10,5)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	8,0	(4,1-12,0)	6,2	(3,6-10,4)	227
	Lager secundair	7,9	(1,8-14,0)	6,7	(2,8-15,2)	222
	Hoger secundair	4,2	(2,6-5,8)	4,1	(2,8-5,9)	610
	Hoger onderwijs	1,9	(1,2-2,7)	1,7	(1,1-2,6)	1400
JAAR	**2001**	7,6	(6,4-8,8)	7,3	(6,1-8,6)	2427
	2004	6,2	(5,2-7,2)	6,0	(5,1-7,2)	2961
	2008	4,8	(3,9-5,7)	4,7	(3,9-5,7)	2795
	2013	3,5	(2,6-4,4)	3,5	(2,7-4,6)	2532
	2018	3,7	(2,8-4,6)	3,7	(2,8-4,7)	2512

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B214 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hartinfarct in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA03_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,9	(0,3-1,5)	0,9	(0,4-1,7)	1169
	Vrouwen	0,3	(0,0-0,7)	0,2	(0,1-0,7)	1344
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	230
	25 - 34	0,0	.	.	.	447
	35 - 44	0,0	.	.	.	516
	45 - 54	0,0	.	.	.	439
	55 - 64	0,4	(0,0-1,0)	0,3	(0,1-1,5)	378
	65 - 74	3,2	(0,0-6,4)	2,8	(1,1-6,9)	291
	75 +	3,8	(0,8-6,9)	3,7	(1,5-8,9)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	2,4	(0,0-4,9)	1,8	(0,6-4,9)	227
	Lager secundair	1,5	(0,0-4,0)	0,9	(0,2-3,3)	222
	Hoger secundair	0,3	(0,0-0,7)	0,2	(0,0-0,7)	610
	Hoger onderwijs	0,4	(0,1-0,6)	0,2	(0,1-0,7)	1401
JAAR	**2008**	1,4	(0,9-1,9)	0,9	(0,6-1,4)	2809
	2013	0,7	(0,3-1,0)	0,5	(0,3-0,9)	2532
	2018	0,6	(0,2-1,0)	0,5	(0,3-0,9)	2513

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B215 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met coronaire hartziekte in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA04_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,5	(0,7-2,2)	1,1	(0,6-2,1)	1169
	Vrouwen	0,6	(0,3-1,0)	0,3	(0,1-0,7)	1344
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	230
	25 - 34	0,0	.	.	.	447
	35 - 44	0,0	.	.	.	516
	45 - 54	0,2	(0,0-0,5)	0,2	(0,0-0,8)	439
	55 - 64	1,4	(0,2-2,6)	1,2	(0,5-2,9)	378
	65 - 74	5,0	(1,5-8,4)	4,4	(2,2-8,4)	291
	75 +	5,4	(2,5-8,3)	5,3	(3,0-9,3)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	1,5	(0,0-3,0)	1,1	(0,3-3,5)	227
	Lager secundair	2,4	(0,0-5,1)	1,2	(0,4-4,2)	222
	Hoger secundair	0,5	(0,0-1,1)	0,3	(0,1-0,8)	610
	Hoger onderwijs	1,0	(0,6-1,5)	0,5	(0,3-1,0)	1401
JAAR	**2008**	2,5	(1,8-3,1)	1,4	(1,0-2,1)	2796
	2013	1,1	(0,6-1,7)	0,7	(0,4-1,2)	2532
	2018	1,0	(0,6-1,4)	0,7	(0,4-1,1)	2513

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B216 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ernstige hartziekte (uitgezonderd hartinfarct of coronaire hartziekte) in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA05_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	2,0	(1,2-2,8)	1,7	(1,0-3,0)	1169
	Vrouwen	1,3	(0,7-1,9)	0,9	(0,5-1,5)	1344
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	230
	25 - 34	0,0	.	.	.	447
	35 - 44	0,8	(0,0-1,6)	0,7	(0,3-2,1)	516
	45 - 54	1,4	(0,1-2,7)	1,3	(0,5-3,2)	439
	55 - 64	2,5	(0,8-4,2)	2,4	(1,2-4,8)	378
	65 - 74	4,3	(2,0-6,6)	4,1	(2,4-7,1)	291
	75 +	7,6	(3,8-11,5)	7,9	(4,7-12,8)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	4,7	(1,8-7,6)	3,1	(1,4-7,0)	227
	Lager secundair	2,6	(0,6-4,6)	1,9	(0,8-4,8)	222
	Hoger secundair	0,8	(0,2-1,4)	0,7	(0,3-1,4)	610
	Hoger onderwijs	1,4	(0,8-2,1)	1,1	(0,6-1,7)	1401
JAAR	**2013**	2,1	(1,4-2,8)	1,6	(1,1-2,5)	2531
	2018	1,6	(1,1-2,1)	1,3	(0,9-1,9)	2513

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B217 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoge bloeddruk in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA06_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	11,6	(9,7-13,5)	8,8	(6,8-11,3)	1168
	Vrouwen	14,7	(12,7-16,7)	10,4	(8,2-13,1)	1344
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,7	(0,0-1,6)	0,7	(0,2-2,6)	230
	25 - 34	2,5	(0,9-4,2)	2,5	(1,3-4,8)	447
	35 - 44	8,2	(5,6-10,8)	8,2	(6,0-11,2)	516
	45 - 54	13,8	(10,4-17,2)	13,8	(10,7-17,6)	439
	55 - 64	24,4	(19,6-29,1)	24,3	(19,9-29,4)	377
	65 - 74	32,9	(27,3-38,6)	32,8	(27,4-38,6)	291
	75 +	38,4	(31,1-45,7)	37,8	(30,9-45,3)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	18,9	(13,7-24,2)	11,1	(7,6-15,8)	227
	Lager secundair	18,0	(12,6-23,5)	11,9	(8,2-17,2)	222
	Hoger secundair	13,0	(10,2-15,8)	11,1	(8,1-14,9)	609
	Hoger onderwijs	11,5	(9,7-13,4)	8,2	(6,4-10,5)	1401
JAAR	**1997**	11,7	(10,0-13,4)	9,1	(7,6-10,7)	2562
	2001	13,3	(11,8-14,8)	9,9	(8,5-11,5)	2454
	2004	12,8	(11,5-14,1)	9,8	(8,6-11,1)	2953
	2008	13,5	(12,0-14,9)	10,7	(9,3-12,2)	2782
	2013	15,7	(13,9-17,6)	13,2	(11,5-15,1)	2532
	2018	13,2	(11,8-14,6)	10,5	(9,2-12,0)	2512

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B218 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoge bloeddruk dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet te hebben gevolgd, Brussels Gewest

MA06_3		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	34,2	(26,1-42,4)	77,3	(67,1-85,1)	161
	Vrouwen	29,0	(22,4-35,6)	73,6	(64,2-81,3)	225
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	100	(100,0-100,0)	100	(100,0-100,0)	2
	25 - 34	8,0	(0,0-26,3)	8,1	(1,1-41,4)	11
	35 - 44	36,5	(19,7-53,3)	37,1	(22,5-54,5)	42
	45 - 54	36,0	(22,3-49,7)	35,7	(23,7-49,9)	59
	55 - 64	43,4	(31,9-54,8)	43,6	(32,6-55,2)	96
	65 - 74	24,1	(13,7-34,4)	24,1	(15,4-35,7)	96
	75 +	21,0	(11,4-30,5)	21,5	(13,4-32,6)	80
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	44,3	(28,4-60,3)	85,7	(72,2-93,2)	50
	Lager secundair	30,3	(12,5-48,1)	74,2	(54,1-87,5)	41
	Hoger secundair	36,2	(25,5-47,0)	78,3	(68,1-85,9)	97
	Hoger onderwijs	26,1	(18,5-33,6)	70,5	(58,5-80,2)	189
JAAR	**2001**	29,7	(24,2-35,3)	30,7	(23,8-38,6)	311
	2008	29,8	(23,3-36,4)	29,5	(22,3-38,0)	290
	2013	40,1	(33,9-46,3)	40,1	(32,0-48,6)	420
	2018	31,2	(25,8-36,6)	31,1	(24,5-38,7)	386

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B219 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoge bloeddruk dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden geneesmiddelen te hebben genomen, Brussels Gewest

MA06_4		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	82,8	(75,9-89,7)	73,8	(60,6-83,7)	161
	Vrouwen	84,9	(79,8-89,9)	77,0	(64,4-86,1)	225
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	52,0	(0,0-100,0)	52,0	(6,9-94,1)	2
	25 - 34	22,4	(0,0-54,9)	22,2	(5,7-57,3)	11
	35 - 44	70,3	(55,2-85,4)	69,8	(53,3-82,4)	42
	45 - 54	81,0	(70,0-92,0)	81,1	(67,9-89,7)	59
	55 - 64	88,3	(81,4-95,1)	88,2	(79,5-93,5)	96
	65 - 74	94,3	(89,5-99,1)	94,3	(87,2-97,6)	96
	75 +	92,1	(84,7-99,6)	91,9	(80,2-97,0)	80
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	75,8	(63,0-88,6)	57,3	(36,5-75,8)	50
	Lager secundair	85,0	(73,3-96,7)	69,3	(46,9-85,3)	41
	Hoger secundair	81,0	(71,5-90,5)	77,6	(62,1-88,0)	97
	Hoger onderwijs	88,8	(83,4-94,2)	82,4	(69,2-90,7)	189
JAAR	**1997**	79,1	(72,7-85,5)	73,5	(64,3-81,1)	328
	2001	81,2	(76,4-86,0)	75,7	(68,5-81,7)	320
	2008	73,4	(67,5-79,4)	66,2	(57,7-73,8)	289
	2013	88,8	(85,3-92,4)	85,2	(79,7-89,5)	419
	2018	84,0	(79,8-88,2)	78,9	(72,6-84,1)	386

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B220 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoge bloeddruk volgens de behandeling van de aandoening, Brussels Gewest

MA06_5		Geen behandeling	Enkel dieet	Medicamenteuze behandeling	N
GESLACHT	**Mannen**	14,9	2,4	82,8	161
	Vrouwen	12,2	2,9	84,9	225
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0.0	48,0	52,0	2
	25 - 34	69,6	8,0	22,4	11
	35 - 44	26,8	3,0	70,3	42
	45 - 54	16,9	2,1	81,0	59
	55 - 64	6,9	4,8	88,3	96
	65 - 74	4,9	0,8	94,3	96
	75 +	7,9	0.0	92,1	80
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	17,7	6,5	75,8	50
	Lager secundair	7,3	7,7	85,0	41
	Hoger secundair	16,2	2,8	81,0	97
	Hoger onderwijs	10,8	0,4	88,8	189
JAAR	**2001**	15,1	3,3	81,6	318
	2008	24,1	2,1	73,8	288
	2013	8,6	2,6	88,8	419
	2018	13,3	2,7	84,0	386

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

Tabel B221 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA07_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	13,4	(11,3-15,4)	10,3	(7,7-13,6)	1160
	Vrouwen	13,0	(11,1-14,9)	9,1	(6,6-12,3)	1341
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,7	(0,0-2,1)	0,7	(0,1-4,8)	226
	25 - 34	2,9	(1,2-4,5)	2,9	(1,6-5,1)	442
	35 - 44	6,0	(3,9-8,1)	6,0	(4,2-8,4)	516
	45 - 54	15,2	(11,4-18,9)	15,1	(11,8-19,2)	438
	55 - 64	28,2	(23,3-33,2)	28,2	(23,6-33,4)	376
	65 - 74	35,8	(29,7-41,9)	35,9	(30,0-42,2)	291
	75 +	30,2	(22,6-37,7)	30,5	(23,5-38,5)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	21,0	(15,7-26,3)	13,2	(9,0-18,8)	227
	Lager secundair	13,1	(7,4-18,9)	8,4	(4,5-14,9)	221
	Hoger secundair	12,2	(9,5-14,8)	10,2	(7,3-14,0)	608
	Hoger onderwijs	12,6	(10,6-14,5)	9,1	(6,8-12,2)	1392
JAAR	**2013**	16,3	(14,3-18,3)	13,0	(10,7-15,7)	2530
	2018	13,2	(11,7-14,6)	9,8	(8,2-11,7)	2501

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B222 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet te hebben gevolgd, Brussels Gewest

MA07_3		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	33,6	(26,1-41,2)	79,9	(71,5-86,4)	186
	Vrouwen	36,7	(29,4-44,0)	82,1	(74,8-87,7)	203
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	1
	25 - 34	30,8	(0,0-63,3)	31,9	(10,9-64,2)	13
	35 - 44	41,6	(23,1-60,1)	42,2	(25,9-60,3)	32
	45 - 54	29,9	(18,4-41,3)	30,0	(20,0-42,3)	67
	55 - 64	36,6	(26,5-46,7)	36,6	(27,3-47,0)	110
	65 - 74	34,7	(24,0-45,4)	34,6	(24,8-45,9)	101
	75 +	38,8	(22,6-54,9)	38,2	(23,7-55,1)	65
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	39,3	(24,5-54,1)	82,0	(68,9-90,3)	56
	Lager secundair	44,4	(24,4-64,5)	87,1	(75,8-93,6)	29
	Hoger secundair	39,3	(28,0-50,6)	82,7	(72,5-89,7)	93
	Hoger onderwijs	30,3	(22,6-38,0)	76,0	(66,1-83,7)	205
JAAR	**2013**	48,8	(42,2-55,4)	54,6	(43,3-65,4)	411
	2018	35,2	(29,7-40,7)	41,5	(31,6-52,2)	389

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B223 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden geneesmiddelen te hebben genomen, Brussels Gewest

MA07_4		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	63,0	(55,3-70,8)	90,0	(84,1-93,9)	186
	Vrouwen	65,9	(58,7-73,0)	87,2	(80,4-91,9)	203
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	1
	25 - 34	9,5	(0,0-30,0)	8,7	(1,2-42,9)	13
	35 - 44	35,2	(17,3-53,2)	34,1	(19,5-52,5)	32
	45 - 54	54,3	(40,9-67,7)	54,0	(40,7-66,8)	67
	55 - 64	67,6	(58,0-77,3)	67,7	(57,4-76,5)	110
	65 - 74	77,4	(68,3-86,4)	77,6	(67,6-85,2)	101
	75 +	85,8	(75,3-96,3)	86,5	(73,0-93,8)	65
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	76,3	(64,2-88,4)	92,6	(85,2-96,5)	56
	Lager secundair	69,9	(48,6-91,1)	90,8	(80,8-95,9)	29
	Hoger secundair	62,9	(51,6-74,1)	89,2	(80,9-94,1)	93
	Hoger onderwijs	60,5	(52,6-68,3)	85,4	(76,4-91,4)	205
JAAR	**2013**	61,8	(55,3-68,4)	51,3	(41,1-61,4)	411
	2018	64,5	(59,0-70,0)	53,1	(42,7-63,3)	389

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B224 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed volgens de behandeling van de aandoening, Brussels Gewest

MA07_5		Geen behandeling	Enkel dieet	Medicamenteuze behandeling	N
GESLACHT	**Mannen**	27,2	9,8	63,0	186
	Vrouwen	25,7	8,5	65,9	203
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	100,0	0.0	0.0	1
	25 - 34	59,7	30,8	9,5	13
	35 - 44	46,2	18,6	35,2	32
	45 - 54	36,2	9,5	54,3	67
	55 - 64	21,8	10,6	67,6	110
	65 - 74	17,5	5,1	77,4	101
	75 +	12,7	1,5	85,8	65
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	14,4	9,3	76,3	56
	Lager secundair	24,4	5,7	69,9	29
	Hoger secundair	25,2	12,0	62,9	93
	Hoger onderwijs	31,0	8,5	60,5	205
JAAR	**2013**	18,9	19,3	61,8	411
	2018	26,4	9,1	64,5	389

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

Tabel B225 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met beroerte in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA08_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,5	(0,2-0,8)	0,6	(0,3-1,3)	1169
	Vrouwen	0,3	(0,0-0,6)	0,3	(0,1-0,8)	1344
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	230
	25 - 34	0,0	.	.	.	447
	35 - 44	0,2	(0,0-0,7)	0,2	(0,0-1,4)	516
	45 - 54	0,0	.	.	.	439
	55 - 64	0,4	(0,0-1,1)	0,3	(0,0-2,7)	378
	65 - 74	2,3	(0,7-3,9)	2,2	(1,1-4,4)	291
	75 +	1,6	(0,2-3,0)	1,7	(0,7-3,9)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	0,2	(0,0-0,5)	0,6	(0,1-3,4)	227
	Lager secundair	1,0	(0,0-2,0)	1,0	(0,3-2,9)	222
	Hoger secundair	0,3	(0,0-0,8)	0,3	(0,1-1,1)	610
	Hoger onderwijs	0,4	(0,1-0,7)	0,4	(0,1-0,9)	1401
JAAR	**1997**	1,3	(0,4-2,2)	1,1	(0,6-2,1)	2562
	2001	0,7	(0,4-1,1)	0,6	(0,4-0,9)	2449
	2004	0,8	(0,5-1,1)	0,6	(0,4-1,1)	2951
	2008	2,0	(1,4-2,6)	1,5	(1,1-2,1)	2804
	2013	0,6	(0,3-1,0)	0,6	(0,4-1,1)	2531
	2018	0,4	(0,2-0,6)	0,4	(0,2-0,7)	2513

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B226 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met vernauwing van de bloedvaten in de buik of de benen in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA09_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,2	(0,6-1,7)	1,0	(0,5-2,0)	1169
	Vrouwen	1,3	(0,8-1,9)	0,8	(0,5-1,5)	1341
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	230
	25 - 34	0,0	.	.	.	447
	35 - 44	0,2	(0,0-0,5)	0,2	(0,0-1,1)	516
	45 - 54	1,1	(0,2-1,9)	1,0	(0,4-2,4)	439
	55 - 64	2,5	(1,0-4,1)	2,5	(1,4-4,7)	378
	65 - 74	3,7	(1,6-5,8)	3,7	(2,1-6,5)	289
	75 +	5,4	(2,4-8,5)	5,5	(3,2-9,5)	211
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	3,6	(1,2-6,0)	2,3	(1,0-5,2)	227
	Lager secundair	2,2	(0,5-3,9)	1,5	(0,5-4,7)	222
	Hoger secundair	0,9	(0,2-1,5)	0,7	(0,3-1,6)	609
	Hoger onderwijs	0,9	(0,4-1,3)	0,6	(0,3-1,1)	1399
JAAR	**2013**	2,5	(1,8-3,2)	2,0	(1,4-2,8)	2529
	2018	1,2	(0,8-1,6)	1,0	(0,7-1,5)	2510

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B227 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met reumatoïde artritis in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA10_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	3,6	(2,5-4,7)	2,5	(1,6-4,0)	1168
	Vrouwen	5,1	(3,8-6,3)	3,2	(2,1-4,9)	1344
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,3	(0,0-0,9)	0,3	(0,0-2,1)	230
	25 - 34	0,5	(0,0-1,2)	0,5	(0,2-1,7)	447
	35 - 44	2,8	(1,3-4,3)	2,8	(1,6-4,8)	516
	45 - 54	3,3	(1,5-5,2)	3,3	(1,9-5,8)	439
	55 - 64	9,6	(6,1-13,2)	9,6	(6,6-13,7)	377
	65 - 74	9,1	(5,6-12,6)	9,0	(6,1-13,1)	291
	75 +	15,0	(9,4-20,6)	14,6	(10,0-20,9)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	9,4	(5,1-13,7)	5,1	(2,9-9,0)	227
	Lager secundair	6,2	(2,6-9,7)	3,7	(2,0-6,9)	222
	Hoger secundair	3,8	(2,3-5,3)	2,9	(1,8-4,6)	610
	Hoger onderwijs	3,4	(2,3-4,4)	2,3	(1,3-3,8)	1400
JAAR	**1997**	7,5	(6,0-9,0)	5,6	(4,4-7,0)	2562
	2001	8,3	(7,1-9,6)	5,8	(4,7-7,1)	2452
	2004	7,7	(6,7-8,7)	5,6	(4,7-6,6)	2938
	2008	7,1	(6,0-8,1)	5,1	(4,3-6,1)	2790
	2013	5,9	(4,7-7,0)	4,4	(3,5-5,5)	2532
	2018	4,4	(3,5-5,2)	3,1	(2,5-3,9)	2512

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B228 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met artrose in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA11_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	7,8	(6,2-9,3)	4,1	(2,7-6,1)	1169
	Vrouwen	16,6	(14,5-18,8)	9,0	(6,5-12,3)	1344
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	230
	25 - 34	0,6	(0,0-1,3)	0,6	(0,2-1,8)	447
	35 - 44	2,4	(1,0-3,8)	2,3	(1,3-4,1)	516
	45 - 54	12,8	(9,2-16,3)	12,3	(9,2-16,3)	439
	55 - 64	26,6	(21,5-31,8)	25,7	(20,9-31,1)	378
	65 - 74	30,1	(23,8-36,3)	28,7	(22,9-35,3)	291
	75 +	49,7	(42,1-57,2)	47,0	(39,5-54,6)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	18,7	(12,5-24,9)	7,2	(3,9-12,9)	227
	Lager secundair	16,0	(10,4-21,6)	6,6	(3,9-10,9)	222
	Hoger secundair	9,9	(7,5-12,3)	5,7	(3,8-8,6)	610
	Hoger onderwijs	11,8	(9,9-13,7)	6,0	(4,2-8,5)	1401
JAAR	**1997**	10,6	(9,1-12,2)	6,5	(5,2-7,9)	2562
	2001	13,0	(11,5-14,6)	7,5	(6,3-8,8)	2454
	2004	10,2	(9,1-11,4)	5,9	(5,0-6,9)	2953
	2008	13,1	(11,7-14,5)	8,4	(7,2-9,8)	2769
	2013	13,2	(11,6-14,7)	8,9	(7,6-10,4)	2532
	2018	12,3	(10,9-13,8)	8,0	(6,9-9,3)	2513

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B229 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een lage rugprobleem in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA12_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	15,4	(13,0-17,7)	15,6	(13,2-18,3)	1169
	Vrouwen	19,6	(17,3-21,9)	19,5	(17,2-22,2)	1344
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	7,1	(3,3-10,9)	7,1	(4,1-11,9)	230
	25 - 34	9,5	(6,6-12,5)	9,5	(6,9-12,8)	447
	35 - 44	16,4	(12,9-19,9)	16,4	(13,2-20,3)	516
	45 - 54	21,2	(16,9-25,5)	21,2	(17,2-25,9)	439
	55 - 64	26,2	(21,3-31,2)	26,1	(21,5-31,3)	378
	65 - 74	28,9	(22,4-35,3)	28,6	(22,6-35,5)	291
	75 +	28,4	(21,8-35,0)	27,6	(21,7-34,5)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	24,4	(17,3-31,6)	22,8	(15,9-31,5)	227
	Lager secundair	21,6	(14,6-28,6)	20,8	(14,8-28,4)	222
	Hoger secundair	16,0	(12,7-19,2)	17,1	(13,9-20,9)	610
	Hoger onderwijs	16,5	(14,4-18,6)	16,3	(14,1-18,7)	1401
JAAR	**2008**	18,7	(16,9-20,5)	18,8	(16,9-20,8)	2758
	2013	20,1	(17,9-22,2)	20,4	(18,2-22,9)	2532
	2018	17,5	(15,8-19,2)	17,6	(15,8-19,5)	2513

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B230 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een nekprobleem in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA13_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	6,4	(4,9-7,8)	6,2	(4,9-7,8)	1169
	Vrouwen	13,7	(11,7-15,8)	13,6	(11,5-15,9)	1344
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	4,4	(1,7-7,2)	4,1	(2,2-7,5)	230
	25 - 34	5,5	(3,3-7,6)	5,0	(3,4-7,4)	447
	35 - 44	10,3	(7,5-13,1)	9,8	(7,3-13,0)	516
	45 - 54	14,1	(10,4-17,8)	13,6	(10,3-17,7)	439
	55 - 64	16,4	(12,0-20,8)	15,5	(11,7-20,2)	378
	65 - 74	11,8	(8,1-15,6)	10,8	(7,8-14,9)	291
	75 +	13,8	(9,2-18,4)	11,9	(8,4-16,7)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	11,3	(6,8-15,8)	10,2	(6,7-15,0)	227
	Lager secundair	10,2	(5,9-14,5)	9,0	(5,8-13,7)	222
	Hoger secundair	7,8	(5,6-10,0)	7,7	(5,8-10,3)	610
	Hoger onderwijs	11,1	(9,3-13,0)	10,1	(8,3-12,2)	1401
JAAR	**2008**	11,1	(9,7-12,4)	10,0	(8,8-11,4)	2781
	2013	13,0	(11,4-14,6)	12,0	(10,5-13,8)	2532
	2018	10,2	(8,9-11,5)	9,2	(8,0-10,6)	2513

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B231 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA14_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	5,5	(4,2-6,9)	4,7	(3,7-6,1)	1169
	Vrouwen	6,2	(4,8-7,5)	4,7	(3,5-6,3)	1344
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	1,6	(0,2-3,0)	1,6	(0,6-3,8)	230
	25 - 34	2,1	(0,6-3,7)	2,1	(1,0-4,4)	447
	35 - 44	1,4	(0,4-2,5)	1,4	(0,7-2,9)	516
	45 - 54	4,0	(2,1-5,8)	4,0	(2,5-6,2)	439
	55 - 64	11,7	(8,3-15,2)	11,7	(8,7-15,7)	378
	65 - 74	17,7	(12,8-22,5)	17,7	(13,3-23,0)	291
	75 +	17,4	(11,7-23,1)	17,4	(12,4-24,0)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	12,3	(8,0-16,6)	8,0	(5,4-11,7)	227
	Lager secundair	10,5	(6,1-15,0)	7,6	(4,3-13,1)	222
	Hoger secundair	5,7	(3,9-7,5)	5,2	(3,7-7,4)	610
	Hoger onderwijs	4,0	(2,8-5,1)	3,2	(2,3-4,3)	1401
JAAR	**1997**	3,3	(2,4-4,1)	2,5	(1,8-3,3)	2562
	2001	3,4	(2,7-4,1)	2,4	(1,9-3,0)	2403
	2004	4,4	(3,6-5,2)	3,3	(2,6-4,0)	2959
	2008	5,5	(4,5-6,5)	4,2	(3,5-5,2)	2788
	2013	5,9	(4,9-6,9)	4,7	(3,9-5,7)	2532
	2018	5,9	(4,9-6,8)	4,6	(3,8-5,6)	2513

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B232 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet volgde, Brussels Gewest

MA14_3		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	58,5	(46,5-70,6)	64,4	(48,8-77,4)	79
	Vrouwen	56,5	(45,5-67,5)	61,4	(47,6-73,6)	94
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	63,6	(0,0-100,0)	64,4	(22,2-92,0)	5
	25 - 34	63,0	(17,4-100,0)	63,9	(27,5-89,2)	8
	35 - 44	76,0	(38,0-100,0)	76,2	(37,8-94,4)	8
	45 - 54	66,9	(42,1-91,8)	67,0	(41,6-85,3)	19
	55 - 64	56,4	(40,4-72,3)	56,0	(40,2-70,6)	46
	65 - 74	51,5	(36,2-66,9)	51,8	(36,8-66,5)	51
	75 +	53,5	(35,6-71,3)	53,5	(36,4-69,8)	36
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	61,4	(43,5-79,3)	71,6	(49,3-86,7)	35
	Lager secundair	52,7	(29,2-76,2)	59,3	(35,7-79,3)	26
	Hoger secundair	57,7	(42,6-72,8)	63,0	(44,0-78,6)	47
	Hoger onderwijs	57,0	(42,6-71,4)	66,4	(48,0-80,9)	60
JAAR	**2001**	66,0	(55,5-76,5)	70,8	(58,6-80,6)	91
	2008	62,5	(52,4-72,6)	66,6	(55,1-76,4)	135
	2013	82,5	(76,2-88,7)	85,9	(78,4-91,1)	168
	2018	57,4	(49,3-65,5)	63,2	(52,9-72,4)	173

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B233 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden medicamenteus behandeld werd, Brussels Gewest

MA14_4		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	85,0	(74,6-95,4)	97,4	(94,4-98,8)	79
	Vrouwen	89,2	(82,3-96,2)	98,9	(97,4-99,5)	94
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	100	(100,0-100,0)	100	(100,0-100,0)	5
	25 - 34	57,7	(10,0-100,0)	51,2	(19,1-82,3)	8
	35 - 44	68,3	(27,9-100,0)	67,4	(26,9-92,1)	8
	45 - 54	96,8	(90,0-100,0)	97,0	(80,7-99,6)	19
	55 - 64	95,6	(89,3-100,0)	96,3	(84,4-99,2)	46
	65 - 74	92,4	(84,7-100,0)	92,4	(80,1-97,3)	51
	75 +	80,5	(64,6-96,3)	81,2	(63,1-91,6)	36
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	94,3	(86,0-100,0)	99,0	(94,4-99,8)	35
	Lager secundair	87,6	(69,4-100,0)	98,3	(95,4-99,4)	26
	Hoger secundair	85,8	(75,8-95,7)	98,2	(94,7-99,4)	47
	Hoger onderwijs	86,8	(75,1-98,5)	98,7	(96,4-99,6)	60
JAAR	**2001**	83,5	(75,5-91,5)	83,4	(72,0-90,8)	90
	2008	76,3	(67,6-85,1)	76,1	(64,1-85,0)	134
	2013	89,4	(83,2-95,6)	89,1	(80,5-94,2)	168
	2018	87,3	(81,3-93,3)	86,8	(78,7-92,1)	173

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B234 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden insuline gebruikte, Brussels Gewest

MA14_5		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	31,7	(20,1-43,3)	37,0	(22,6-54,2)	79
	Vrouwen	21,6	(12,0-31,2)	24,7	(14,6-38,6)	94
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	65,6	(1,0-100,0)	69,5	(22,3-94,7)	5
	25 - 34	20,1	(0,0-55,2)	22,8	(4,6-64,5)	8
	35 - 44	38,5	(0,0-83,2)	39,5	(13,7-72,8)	8
	45 - 54	17,3	(0,0-35,6)	17,1	(5,5-42,2)	19
	55 - 64	33,0	(17,8-48,1)	31,1	(18,8-46,7)	46
	65 - 74	19,3	(8,1-30,6)	19,8	(10,9-33,2)	51
	75 +	23,2	(6,8-39,7)	23,0	(10,9-42,0)	36
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	33,1	(14,8-51,5)	42,6	(21,5-66,7)	35
	Lager secundair	34,2	(12,2-56,1)	36,6	(16,9-62,2)	26
	Hoger secundair	27,0	(11,9-42,0)	29,4	(15,7-48,2)	47
	Hoger onderwijs	19,2	(7,6-30,9)	25,4	(11,5-47,1)	60
JAAR	**2001**	29,7	(19,2-40,2)	37,7	(25,6-51,7)	90
	2008	30,6	(20,9-40,3)	37,0	(26,5-48,9)	134
	2013	31,2	(22,7-39,7)	38,9	(28,8-50,1)	168
	2018	26,2	(18,7-33,7)	32,4	(23,6-42,5)	173

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B235 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden orale antidiabetica gebruikte, Brussels Gewest

MA14_6		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	75,7	(63,8-87,6)	67,4	(49,8-81,1)	79
	Vrouwen	79,0	(69,0-88,9)	79,5	(63,7-89,6)	94
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	54,5	(0,0-100,0)	50,1	(12,0-88,0)	5
	25 - 34	37,7	(0,0-84,0)	33,0	(9,7-69,4)	8
	35 - 44	68,3	(27,9-100,0)	67,5	(28,7-91,5)	8
	45 - 54	91,2	(77,9-100,0)	91,5	(68,0-98,2)	19
	55 - 64	86,5	(75,5-97,5)	87,8	(74,0-94,8)	46
	65 - 74	87,2	(76,9-97,4)	86,9	(72,8-94,3)	51
	75 +	70,4	(52,1-88,6)	70,7	(51,5-84,6)	36
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	86,6	(73,0-100,0)	79,6	(50,8-93,6)	35
	Lager secundair	73,1	(49,1-97,2)	75,1	(46,3-91,3)	26
	Hoger secundair	79,6	(68,0-91,2)	75,8	(55,1-88,8)	47
	Hoger onderwijs	76,3	(62,1-90,5)	75,3	(55,4-88,2)	60
JAAR	**2001**	66,8	(56,6-77,1)	63,7	(50,8-74,9)	92
	2008	61,7	(51,4-72,1)	55,7	(43,2-67,6)	134
	2013	80,1	(72,7-87,5)	76,5	(66,3-84,4)	168
	2018	77,5	(69,9-85,1)	73,8	(63,5-81,9)	173

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B236 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes volgens de behandeling van de aandoening, Brussels Gewest

MA14_7		Geen behandeling	Enkel dieet	Orale antidiabetica	Insuline	N
GESLACHT	**Mannen**	4,4	10,6	53,3	31,7	79
	Vrouwen	7,4	3,4	67,6	21,6	94
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0.0	0.0	34,4	65,6	5
	25 - 34	24,2	18,1	37,7	20,1	8
	35 - 44	11,9	19,8	29,8	38,5	8
	45 - 54	3,2	0.0	79,5	17,3	19
	55 - 64	2,2	2,3	62,6	33,0	46
	65 - 74	3,9	3,7	73,0	19,3	51
	75 +	7,4	12,1	57,2	23,2	36
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	5,7	0.0	61,1	33,1	35
	Lager secundair	3,7	8,7	53,4	34,2	26
	Hoger secundair	5,4	8,8	58,8	27,0	47
	Hoger onderwijs	6,6	6,6	67,6	19,2	60
JAAR	**2001**	5,2	11,6	53,3	29,9	89
	2008	16,7	6,9	45,7	30,6	134
	2013	1,6	9,0	58,2	31,2	168
	2018	6,0	6,7	61,1	26,2	173

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

Tabel B237 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met allergie in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA15_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	14,2	(11,8-16,5)	14,2	(12,0-16,8)	1169
	Vrouwen	21,4	(18,7-24,1)	21,5	(18,9-24,3)	1344
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	16,7	(10,4-23,0)	16,4	(11,1-23,6)	230
	25 - 34	17,3	(13,6-21,1)	17,0	(13,6-21,1)	447
	35 - 44	16,7	(13,4-20,0)	16,6	(13,5-20,2)	516
	45 - 54	19,4	(15,3-23,5)	19,3	(15,6-23,7)	439
	55 - 64	20,4	(15,5-25,3)	20,1	(15,6-25,4)	378
	65 - 74	15,5	(11,0-20,1)	15,0	(11,2-19,9)	291
	75 +	19,8	(12,4-27,2)	18,6	(12,6-26,6)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	11,2	(6,3-16,2)	10,9	(7,1-16,4)	227
	Lager secundair	17,6	(9,7-25,6)	16,8	(10,6-25,6)	222
	Hoger secundair	15,7	(12,0-19,4)	15,9	(12,5-20,0)	610
	Hoger onderwijs	19,8	(17,3-22,3)	19,6	(17,1-22,4)	1401
JAAR	**2001**	18,2	(16,4-20,0)	17,7	(16,0-19,6)	2435
	2004	17,4	(15,8-19,1)	16,9	(15,4-18,6)	2965
	2008	14,3	(12,8-15,7)	13,8	(12,4-15,3)	2777
	2013	16,5	(14,5-18,4)	15,9	(14,2-17,9)	2531
	2018	17,9	(16,0-19,8)	17,3	(15,5-19,3)	2513

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B238 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een maagzweer in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA16_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	3,4	(2,3-4,5)	3,1	(2,0-4,7)	1169
	Vrouwen	4,4	(3,2-5,5)	3,7	(2,6-5,2)	1344
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	230
	25 - 34	2,9	(1,0-4,8)	2,9	(1,5-5,5)	447
	35 - 44	4,6	(2,7-6,6)	4,6	(3,0-7,0)	516
	45 - 54	3,7	(1,8-5,5)	3,7	(2,2-6,0)	439
	55 - 64	7,3	(4,4-10,2)	7,3	(4,8-10,8)	378
	65 - 74	5,7	(3,0-8,3)	5,6	(3,5-8,9)	291
	75 +	5,3	(1,7-8,9)	5,2	(2,6-10,0)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	6,2	(3,0-9,4)	5,7	(3,0-10,6)	227
	Lager secundair	4,4	(1,5-7,4)	3,9	(1,9-7,7)	222
	Hoger secundair	3,7	(2,1-5,3)	3,4	(2,1-5,4)	610
	Hoger onderwijs	3,5	(2,5-4,6)	2,9	(2,0-4,2)	1401
JAAR	**1997**	4,9	(3,8-6,1)	4,8	(3,7-6,1)	2562
	2001	5,0	(3,9-6,0)	4,6	(3,7-5,8)	2452
	2004	6,0	(4,9-7,0)	5,7	(4,7-6,8)	2953
	2008	6,4	(5,3-7,4)	6,1	(5,1-7,3)	2801
	2013	3,8	(2,9-4,8)	3,7	(2,9-4,7)	2532
	2018	3,9	(3,1-4,7)	3,8	(3,0-4,7)	2513

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B239 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met leverlijden in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA17_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,1	(0,5-1,6)	1,1	(0,6-2,0)	1169
	Vrouwen	1,1	(0,4-1,7)	0,9	(0,5-1,7)	1344
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	230
	25 - 34	0,5	(0,0-1,3)	0,5	(0,1-2,4)	447
	35 - 44	0,7	(0,0-1,4)	0,7	(0,3-1,9)	516
	45 - 54	1,1	(0,0-2,4)	1,1	(0,4-3,3)	439
	55 - 64	3,5	(1,4-5,5)	3,4	(1,9-6,2)	378
	65 - 74	0,8	(0,0-1,7)	0,8	(0,3-2,5)	291
	75 +	1,7	(0,2-3,3)	1,8	(0,7-4,4)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	3,0	(0,5-5,5)	3,0	(1,2-7,5)	227
	Lager secundair	2,0	(0,3-3,7)	1,9	(0,8-4,2)	222
	Hoger secundair	0,1	(0,0-0,4)	0,1	(0,0-0,8)	610
	Hoger onderwijs	1,0	(0,5-1,6)	0,9	(0,5-1,6)	1401
JAAR	**2001**	1,3	(0,9-1,8)	1,3	(0,9-1,8)	2447
	2004	1,5	(1,0-2,0)	1,4	(1,0-2,0)	2960
	2008	0,6	(0,3-0,9)	0,6	(0,4-1,0)	2808
	2013	0,9	(0,5-1,3)	1,0	(0,6-1,5)	2531
	2018	1,1	(0,6-1,5)	1,1	(0,7-1,6)	2513

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B240 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met kanker in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA18_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,2	(0,5-2,0)	1,0	(0,5-2,1)	1169
	Vrouwen	1,5	(0,9-2,1)	1,1	(0,7-1,8)	1344
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,3	(0,0-0,9)	0,3	(0,0-2,2)	230
	25 - 34	0,0	.	.	.	447
	35 - 44	1,1	(0,0-2,5)	1,1	(0,3-3,8)	516
	45 - 54	2,2	(0,3-4,1)	2,2	(0,9-5,1)	439
	55 - 64	2,6	(1,1-4,2)	2,6	(1,5-4,7)	378
	65 - 74	4,5	(2,0-7,0)	4,5	(2,6-7,7)	291
	75 +	0,7	(0,0-1,7)	0,7	(0,2-2,7)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	1,5	(0,1-2,9)	1,1	(0,4-2,9)	227
	Lager secundair	0,7	(0,0-1,8)	0,9	(0,2-4,0)	222
	Hoger secundair	1,0	(0,2-1,7)	0,8	(0,4-1,8)	610
	Hoger onderwijs	1,6	(0,8-2,4)	1,2	(0,7-2,1)	1401
JAAR	**1997**	1,6	(0,7-2,5)	1,3	(0,7-2,2)	2560
	2001	2,1	(1,5-2,7)	1,5	(1,1-2,1)	2453
	2004	1,6	(1,1-2,1)	1,2	(0,9-1,7)	2944
	2008	1,9	(1,3-2,5)	1,5	(1,1-2,1)	2807
	2013	2,3	(1,5-3,1)	1,8	(1,3-2,6)	2531
	2018	1,4	(0,9-1,9)	1,1	(0,7-1,6)	2513

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B241 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ernstige hoofdpijn zoals migraine in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA19_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	6,4	(4,6-8,1)	5,5	(4,1-7,3)	1169
	Vrouwen	12,5	(10,5-14,6)	11,4	(9,6-13,5)	1344
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	10,1	(5,1-15,0)	9,5	(5,6-15,7)	230
	25 - 34	8,5	(5,7-11,2)	7,9	(5,7-10,9)	447
	35 - 44	10,0	(7,3-12,8)	9,6	(7,2-12,7)	516
	45 - 54	12,8	(9,4-16,1)	12,4	(9,4-16,1)	439
	55 - 64	13,1	(9,3-17,0)	12,4	(9,2-16,6)	378
	65 - 74	3,3	(1,2-5,4)	3,0	(1,5-5,6)	291
	75 +	4,3	(1,7-6,9)	3,7	(2,0-6,8)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	10,7	(6,4-15,0)	10,0	(6,5-15,1)	227
	Lager secundair	10,5	(6,1-14,8)	8,8	(5,7-13,5)	222
	Hoger secundair	8,5	(5,3-11,7)	7,2	(4,8-10,7)	610
	Hoger onderwijs	9,4	(7,6-11,3)	7,7	(6,2-9,6)	1401
JAAR	**1997**	14,8	(12,9-16,7)	13,7	(11,8-15,8)	2562
	2001	16,5	(14,7-18,2)	15,3	(13,7-17,2)	2455
	2004	12,5	(11,0-13,9)	11,5	(10,2-12,9)	2954
	2008	9,4	(8,1-10,7)	8,5	(7,4-9,9)	2758
	2013	10,4	(8,9-11,8)	9,4	(8,1-10,9)	2530
	2018	9,5	(8,1-11,0)	8,6	(7,4-10,1)	2513

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B242 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met urinaire incontinentie in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA20_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	2,8	(1,9-3,8)	1,8	(1,1-2,8)	1169
	Vrouwen	4,1	(3,0-5,3)	2,2	(1,4-3,4)	1344
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,2	(0,0-0,6)	0,2	(0,0-1,5)	230
	25 - 34	0,3	(0,0-0,8)	0,3	(0,1-1,3)	447
	35 - 44	1,9	(0,5-3,3)	1,9	(0,9-3,9)	516
	45 - 54	1,9	(0,5-3,3)	1,9	(0,9-3,9)	439
	55 - 64	6,5	(3,6-9,4)	6,4	(4,1-10,0)	378
	65 - 74	6,4	(3,5-9,3)	6,3	(4,0-9,8)	291
	75 +	17,8	(12,0-23,5)	17,3	(12,4-23,6)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	4,4	(1,8-7,1)	1,7	(0,8-3,5)	227
	Lager secundair	4,4	(1,6-7,3)	2,1	(0,9-4,8)	222
	Hoger secundair	2,7	(1,4-4,0)	1,8	(1,0-3,1)	610
	Hoger onderwijs	3,4	(2,4-4,4)	2,1	(1,3-3,3)	1401
JAAR	**2008**	3,2	(2,5-3,9)	1,6	(1,2-2,2)	2794
	2013	4,1	(3,2-5,0)	2,3	(1,8-3,1)	2531
	2018	3,5	(2,7-4,3)	1,9	(1,4-2,5)	2513

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B243 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met depressie in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA21_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	6,4	(4,9-7,9)	6,1	(4,7-7,9)	1169
	Vrouwen	9,0	(7,4-10,6)	8,7	(7,2-10,5)	1344
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	3,0	(0,7-5,4)	3,0	(1,4-6,4)	230
	25 - 34	4,9	(2,8-7,1)	4,9	(3,2-7,4)	447
	35 - 44	8,4	(5,9-11,0)	8,4	(6,2-11,3)	516
	45 - 54	10,4	(7,1-13,7)	10,4	(7,5-14,1)	439
	55 - 64	13,4	(9,5-17,3)	13,2	(9,8-17,6)	378
	65 - 74	8,6	(5,2-11,9)	8,4	(5,6-12,2)	291
	75 +	7,1	(3,5-10,6)	6,7	(4,0-10,9)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	11,3	(6,3-16,3)	10,7	(6,5-17,0)	227
	Lager secundair	10,6	(5,9-15,3)	10,2	(6,4-15,7)	222
	Hoger secundair	8,1	(5,8-10,4)	8,0	(6,0-10,7)	610
	Hoger onderwijs	6,6	(5,2-8,0)	6,0	(4,8-7,5)	1401
JAAR	**1997**	8,2	(6,8-9,7)	8,1	(6,8-9,7)	2562
	2001	8,9	(7,5-10,2)	8,6	(7,3-10,1)	2457
	2004	7,5	(6,4-8,7)	7,3	(6,3-8,5)	2955
	2008	7,3	(6,1-8,4)	7,1	(6,0-8,3)	2775
	2013	7,7	(6,4-8,9)	7,5	(6,3-8,8)	2531
	2018	7,7	(6,6-8,9)	7,5	(6,5-8,7)	2513

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B244 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met schildklierlijden in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA22_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,9	(1,2-2,6)	1,7	(1,1-2,6)	1169
	Vrouwen	11,8	(9,9-13,7)	10,4	(8,3-13,0)	1344
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	1,2	(0,0-2,7)	0,8	(0,2-3,0)	230
	25 - 34	3,0	(1,3-4,7)	2,1	(1,2-3,7)	447
	35 - 44	4,8	(3,0-6,6)	3,5	(2,2-5,4)	516
	45 - 54	7,2	(4,6-9,8)	5,4	(3,8-7,8)	439
	55 - 64	11,1	(7,6-14,6)	8,2	(5,7-11,5)	378
	65 - 74	16,7	(12,3-21,2)	12,4	(8,9-17,0)	291
	75 +	17,2	(11,5-22,9)	11,4	(7,6-16,7)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	7,3	(3,6-10,9)	3,7	(2,1-6,4)	227
	Lager secundair	7,7	(4,0-11,4)	4,1	(2,3-7,0)	222
	Hoger secundair	5,4	(3,4-7,4)	3,8	(2,3-6,2)	610
	Hoger onderwijs	7,5	(6,0-8,9)	4,6	(3,5-6,2)	1401
JAAR	**1997**	3,0	(2,2-3,9)	1,9	(1,4-2,6)	2562
	2001	4,4	(3,5-5,3)	2,7	(2,1-3,5)	2456
	2004	4,4	(3,6-5,1)	2,8	(2,2-3,4)	2957
	2008	4,3	(3,4-5,1)	2,8	(2,2-3,5)	2798
	2013	6,2	(5,1-7,2)	4,2	(3,4-5,2)	2531
	2018	7,0	(5,9-8,1)	4,8	(3,9-5,8)	2513

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B245 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met cataract in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA2301_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	2,0	(1,2-2,8)	1,1	(0,6-2,1)	1168
	Vrouwen	2,8	(1,9-3,7)	1,1	(0,6-2,0)	1344
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	230
	25 - 34	0,0	.	.	.	447
	35 - 44	0,1	(0,0-0,4)	0,1	(0,0-1,0)	516
	45 - 54	1,1	(0,0-2,1)	1,1	(0,4-2,8)	439
	55 - 64	2,7	(0,9-4,5)	2,7	(1,4-5,2)	378
	65 - 74	9,9	(6,3-13,4)	9,9	(6,9-14,0)	291
	75 +	14,0	(8,7-19,3)	14,1	(9,5-20,4)	211
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	4,0	(1,4-6,6)	1,4	(0,5-3,7)	226
	Lager secundair	2,9	(0,9-5,0)	1,1	(0,4-2,8)	222
	Hoger secundair	1,3	(0,5-2,1)	0,7	(0,3-1,5)	610
	Hoger onderwijs	2,7	(1,7-3,6)	1,3	(0,7-2,1)	1401
JAAR	**1997**	4,1	(2,8-5,5)	1,9	(1,4-2,7)	2562
	2001	3,8	(3,0-4,7)	1,6	(1,1-2,1)	2452
	2004	3,5	(2,9-4,1)	1,5	(1,2-2,0)	2952
	2008	3,2	(2,5-3,9)	1,4	(1,1-1,9)	2796
	2013	3,0	(2,3-3,8)	1,5	(1,1-2,1)	2531
	2018	2,4	(1,8-3,0)	1,2	(0,8-1,6)	2512

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B246 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met glaucoom in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA2302_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,8	(0,3-1,3)	0,7	(0,3-1,4)	1168
	Vrouwen	1,9	(1,1-2,7)	1,1	(0,6-1,9)	1344
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	230
	25 - 34	0,1	(0,0-0,4)	0,1	(0,0-0,9)	447
	35 - 44	0,3	(0,0-0,8)	0,3	(0,1-1,3)	516
	45 - 54	1,1	(0,0-2,2)	1,1	(0,4-3,0)	439
	55 - 64	1,7	(0,1-3,3)	1,7	(0,7-4,2)	378
	65 - 74	2,8	(0,9-4,7)	2,7	(1,3-5,2)	291
	75 +	8,7	(4,4-13,1)	8,1	(5,0-13,0)	211
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	2,3	(0,2-4,4)	1,2	(0,3-4,1)	226
	Lager secundair	1,6	(0,0-3,6)	0,7	(0,2-2,5)	222
	Hoger secundair	1,1	(0,2-2,0)	0,7	(0,3-1,7)	610
	Hoger onderwijs	1,3	(0,7-2,0)	0,9	(0,5-1,6)	1401
JAAR	**1997**	1,8	(0,8-2,8)	1,4	(0,8-2,4)	2562
	2001	2,4	(1,8-3,0)	1,7	(1,2-2,3)	2451
	2004	2,5	(1,9-3,2)	1,8	(1,4-2,4)	2950
	2008	2,2	(1,6-2,9)	1,6	(1,2-2,2)	2796
	2013	0,9	(0,4-1,4)	0,7	(0,4-1,2)	2531
	2018	1,4	(0,9-1,9)	1,1	(0,8-1,6)	2512

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B247 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met maculadegeneratie in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA2303_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,4	(0,1-0,7)	0,5	(0,2-1,1)	1168
	Vrouwen	1,0	(0,4-1,6)	0,6	(0,3-1,2)	1344
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	230
	25 - 34	0,0	.	.	.	447
	35 - 44	0,4	(0,0-1,0)	0,4	(0,1-1,7)	516
	45 - 54	0,0	.	.	.	439
	55 - 64	0,5	(0,0-1,1)	0,4	(0,1-1,8)	378
	65 - 74	1,4	(0,0-2,8)	1,3	(0,5-3,6)	291
	75 +	6,0	(2,5-9,6)	5,7	(3,2-9,8)	211
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	0,5	(0,0-1,3)	0,5	(0,1-2,8)	226
	Lager secundair	0,8	(0,0-2,5)	0,5	(0,1-2,8)	222
	Hoger secundair	1,1	(0,3-2,0)	0,8	(0,4-1,7)	610
	Hoger onderwijs	0,5	(0,2-0,8)	0,4	(0,2-0,8)	1401
JAAR	**2013**	0,7	(0,4-1,1)	0,7	(0,4-1,2)	2531
	2018	0,7	(0,4-1,1)	0,6	(0,4-1,1)	2512

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B248 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetische retinopathie in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA2304_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,1	(0,0-0,2)	0,5	(0,2-1,2)	1168
	Vrouwen	0,1	(0,0-0,2)	0,2	(0,1-0,7)	1344
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	230
	25 - 34	0,0	.	.	.	447
	35 - 44	0,0	.	.	.	516
	45 - 54	0,0	.	.	.	439
	55 - 64	0,0	.	.	.	378
	65 - 74	0,0	.	.	.	291
	75 +	0,8	(0,0-1,9)	.	.	211
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	0,0	.	.	.	226
	Lager secundair	0,0	.	.	.	222
	Hoger secundair	0,1	(0,0-0,4)	0,1	(0,0-1,1)	610
	Hoger onderwijs	0,0	(0,0-0,1)	0,3	(0,1-0,9)	1401
JAAR	**2013**	0,3	(0,1-0,6)	0,4	(0,2-0,7)	2531
	2018	0,1	(0,0-0,2)	0,3	(0,2-0,7)	2512

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B249 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ziekte van Parkinson in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA24_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,5	(0,2-0,9)	0,7	(0,4-1,4)	1169
	Vrouwen	0,2	(0,0-0,4)	0,2	(0,0-0,6)	1344
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	230
	25 - 34	0,0	.	.	.	447
	35 - 44	0,0	.	.	.	516
	45 - 54	0,0	.	.	.	439
	55 - 64	0,2	(0,0-0,7)	0,2	(0,0-1,6)	378
	65 - 74	1,6	(0,3-2,9)	1,4	(0,6-3,2)	291
	75 +	2,4	(0,4-4,4)	2,3	(1,0-5,0)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	0,5	(0,0-1,3)	0,9	(0,2-3,6)	227
	Lager secundair	0,3	(0,0-0,8)	0,4	(0,1-2,2)	222
	Hoger secundair	0,1	(0,0-0,3)	0,1	(0,0-0,6)	610
	Hoger onderwijs	0,5	(0,1-0,8)	0,4	(0,1-0,9)	1401
JAAR	**1997**	0,3	(0,1-0,4)	0,4	(0,2-0,8)	2560
	2001	0,5	(0,3-0,8)	0,5	(0,3-0,8)	2452
	2004	0,4	(0,2-0,7)	0,5	(0,3-0,9)	2956
	2008	0,4	(0,1-0,6)	0,4	(0,2-0,7)	2801
	2013	0,3	(0,1-0,5)	0,4	(0,2-0,7)	2531
	2018	0,4	(0,2-0,5)	0,5	(0,3-0,8)	2513

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B250 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met epilepsie in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA25_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,3	(0,4-2,1)	1,3	(0,7-2,5)	1169
	Vrouwen	0,6	(0,2-1,1)	0,6	(0,3-1,2)	1344
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	1,2	(0,0-2,6)	1,1	(0,4-3,5)	230
	25 - 34	0,0	.	.	.	447
	35 - 44	1,2	(0,0-2,6)	1,1	(0,3-3,5)	516
	45 - 54	0,9	(0,0-1,9)	0,8	(0,2-2,6)	439
	55 - 64	1,6	(0,0-3,2)	1,5	(0,6-3,9)	378
	65 - 74	1,1	(0,0-2,3)	1,0	(0,3-3,2)	291
	75 +	1,4	(0,0-3,5)	1,4	(0,3-6,1)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	1,2	(0,0-2,8)	0,9	(0,2-3,2)	227
	Lager secundair	1,9	(0,0-3,9)	2,2	(0,8-5,7)	222
	Hoger secundair	0,2	(0,0-0,5)	0,2	(0,0-0,8)	610
	Hoger onderwijs	1,1	(0,4-1,9)	1,0	(0,5-1,8)	1401
JAAR	**1997**	0,4	(0,2-0,6)	0,4	(0,2-0,7)	2561
	2001	0,8	(0,4-1,2)	0,8	(0,5-1,3)	2453
	2004	1,1	(0,6-1,5)	1,1	(0,7-1,7)	2961
	2008	0,7	(0,4-1,1)	0,7	(0,4-1,2)	2805
	2013	0,7	(0,4-1,1)	0,8	(0,5-1,3)	2531
	2018	0,9	(0,5-1,4)	1,0	(0,6-1,6)	2513

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B251 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met langdurige vermoeidheid in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA26_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	5,6	(4,1-7,0)	5,6	(4,2-7,5)	1169
	Vrouwen	8,5	(6,9-10,2)	8,5	(6,9-10,3)	1344
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	3,9	(0,8-7,0)	3,9	(1,7-8,4)	230
	25 - 34	4,9	(2,8-6,9)	4,7	(3,1-7,2)	447
	35 - 44	7,2	(4,8-9,6)	7,1	(5,1-9,9)	516
	45 - 54	7,8	(5,0-10,6)	7,7	(5,4-11,0)	439
	55 - 64	10,3	(6,8-13,7)	10,1	(7,1-14,0)	378
	65 - 74	7,0	(3,9-10,1)	6,8	(4,3-10,5)	291
	75 +	12,4	(7,1-17,6)	11,6	(7,4-17,8)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	10,0	(5,1-14,9)	9,2	(5,3-15,7)	227
	Lager secundair	6,6	(3,2-10,1)	6,2	(3,6-10,5)	222
	Hoger secundair	7,2	(5,1-9,4)	7,5	(5,5-10,1)	610
	Hoger onderwijs	6,6	(5,2-8,1)	6,5	(5,2-8,1)	1401
JAAR	**2001**	8,0	(6,7-9,3)	7,6	(6,4-9,1)	2453
	2004	7,2	(6,1-8,3)	6,9	(5,9-8,1)	2952
	2008	6,6	(5,5-7,7)	6,4	(5,4-7,6)	2781
	2013	9,0	(7,6-10,4)	8,8	(7,5-10,4)	2531
	2018	7,1	(6,0-8,2)	6,9	(5,8-8,1)	2513

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B252 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met osteoporose in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA27_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,8	(0,3-1,3)	0,4	(0,2-1,1)	1169
	Vrouwen	4,7	(3,6-5,9)	2,1	(1,2-3,4)	1344
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	230
	25 - 34	0,1	(0,0-0,4)	0,1	(0,0-0,6)	447
	35 - 44	0,2	(0,0-0,7)	0,2	(0,0-1,3)	516
	45 - 54	1,3	(0,0-2,5)	1,0	(0,4-2,7)	439
	55 - 64	7,7	(4,8-10,7)	6,1	(4,0-9,3)	378
	65 - 74	6,1	(3,3-8,8)	4,6	(2,8-7,5)	291
	75 +	13,7	(8,7-18,8)	9,9	(6,1-15,7)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	2,3	(0,5-4,2)	0,6	(0,2-2,2)	227
	Lager secundair	5,1	(2,0-8,2)	1,4	(0,5-3,4)	222
	Hoger secundair	2,6	(1,2-4,0)	1,1	(0,5-2,4)	610
	Hoger onderwijs	2,7	(1,8-3,5)	1,0	(0,5-1,8)	1401
JAAR	**1997**	4,5	(3,3-5,6)	1,7	(1,2-2,5)	2562
	2001	5,5	(4,5-6,5)	2,0	(1,5-2,7)	2450
	2004	4,7	(3,9-5,5)	1,8	(1,3-2,4)	2935
	2008	4,3	(3,5-5,2)	1,7	(1,3-2,3)	2782
	2013	3,6	(2,8-4,3)	1,4	(1,1-1,9)	2530
	2018	2,8	(2,1-3,5)	1,1	(0,8-1,5)	2513

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B253 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met gebroken heup in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA28_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,2	(0,0-0,3)	0,5	(0,2-1,4)	1169
	Vrouwen	0,5	(0,1-0,8)	0,4	(0,2-0,8)	1344
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	230
	25 - 34	0,0	.	.	.	447
	35 - 44	0,0	.	.	.	516
	45 - 54	0,3	(0,0-0,9)	0,3	(0,0-2,3)	439
	55 - 64	0,0	.	.	.	378
	65 - 74	1,1	(0,0-2,3)	1,1	(0,4-3,2)	291
	75 +	2,1	(0,2-4,1)	2,2	(0,9-5,3)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	0,4	(0,0-1,0)	1,3	(0,4-4,7)	227
	Lager secundair	0,4	(0,0-1,2)	0,7	(0,2-3,3)	222
	Hoger secundair	0,3	(0,0-0,8)	0,3	(0,1-1,6)	610
	Hoger onderwijs	0,2	(0,0-0,4)	0,3	(0,1-0,8)	1401
JAAR	**2001**	0,8	(0,5-1,2)	0,7	(0,4-1,1)	2450
	2004	0,5	(0,2-0,8)	0,4	(0,2-0,8)	2951
	2008	0,7	(0,4-1,0)	0,6	(0,4-1,0)	2806
	2013	0,4	(0,1-0,6)	0,4	(0,2-0,9)	2531
	2018	0,3	(0,1-0,5)	0,4	(0,2-0,8)	2513

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B254 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met darmziekte, langer dan 3 maanden in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA29_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	2,0	(1,1-2,8)	1,9	(1,2-3,1)	1169
	Vrouwen	3,6	(2,6-4,7)	3,4	(2,4-4,7)	1344
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	1,4	(0,0-3,1)	1,3	(0,3-4,8)	230
	25 - 34	1,2	(0,0-2,4)	1,2	(0,5-3,0)	447
	35 - 44	2,6	(1,2-4,0)	2,5	(1,5-4,3)	516
	45 - 54	2,0	(0,6-3,4)	2,0	(1,0-3,8)	439
	55 - 64	5,4	(3,0-7,9)	5,2	(3,3-8,3)	378
	65 - 74	4,1	(1,8-6,4)	3,9	(2,2-6,7)	291
	75 +	6,8	(3,2-10,4)	6,2	(3,5-10,7)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	5,7	(2,0-9,4)	4,6	(2,2-9,5)	227
	Lager secundair	5,0	(1,9-8,2)	4,4	(2,3-8,1)	222
	Hoger secundair	1,9	(0,8-3,0)	1,9	(1,1-3,5)	610
	Hoger onderwijs	2,4	(1,6-3,2)	2,2	(1,6-3,2)	1401
JAAR	**1997**	5,5	(4,0-7,0)	5,4	(4,0-7,3)	2561
	2001	3,9	(3,0-4,8)	3,7	(2,9-4,7)	2447
	2004	3,8	(3,0-4,6)	3,7	(3,0-4,6)	2959
	2008	3,8	(3,0-4,5)	3,7	(3,0-4,5)	2799
	2013	3,3	(2,1-4,5)	3,3	(2,3-4,8)	2531
	2018	2,8	(2,2-3,5)	2,8	(2,2-3,6)	2513

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B255 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met nierstenen in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA30_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,9	(0,3-1,4)	1,0	(0,5-1,8)	1169
	Vrouwen	0,4	(0,0-0,7)	0,3	(0,1-1,0)	1343
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	230
	25 - 34	0,2	(0,0-0,6)	0,2	(0,0-1,5)	447
	35 - 44	0,8	(0,0-1,6)	0,7	(0,2-2,0)	516
	45 - 54	0,6	(0,0-1,3)	0,5	(0,1-2,1)	438
	55 - 64	1,0	(0,0-2,2)	0,9	(0,3-2,6)	378
	65 - 74	0,9	(0,0-1,9)	0,8	(0,3-2,5)	291
	75 +	1,5	(0,0-3,7)	1,5	(0,3-6,0)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	0,4	(0,0-1,3)	0,8	(0,2-4,1)	227
	Lager secundair	1,7	(0,0-3,8)	1,5	(0,5-4,2)	222
	Hoger secundair	0,3	(0,0-0,8)	0,3	(0,1-1,2)	610
	Hoger onderwijs	0,6	(0,2-1,0)	0,5	(0,2-1,3)	1400
JAAR	**1997**	1,2	(0,7-1,7)	1,2	(0,8-1,8)	2562
	2001	0,7	(0,4-1,0)	0,7	(0,5-1,2)	2445
	2004	1,1	(0,7-1,5)	1,1	(0,7-1,6)	2959
	2008	0,9	(0,5-1,3)	0,9	(0,6-1,4)	2805
	2013	1,0	(0,5-1,5)	1,1	(0,7-1,7)	2531
	2018	0,6	(0,3-0,9)	0,7	(0,4-1,1)	2512

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B256 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ernstige nierziekte behalve nierstenen in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA31_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,8	(0,4-1,3)	0,8	(0,4-1,6)	1169
	Vrouwen	1,3	(0,6-2,0)	1,0	(0,5-1,8)	1343
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	230
	25 - 34	0,2	(0,0-0,6)	0,2	(0,0-1,4)	447
	35 - 44	1,3	(0,0-2,5)	1,3	(0,5-3,3)	516
	45 - 54	0,8	(0,0-1,7)	0,8	(0,2-2,4)	438
	55 - 64	0,8	(0,0-1,7)	0,8	(0,2-2,7)	378
	65 - 74	3,1	(0,8-5,4)	3,1	(1,5-6,4)	291
	75 +	3,8	(0,9-6,6)	3,7	(1,7-7,8)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	0,8	(0,0-2,0)	0,1	(0,0-0,5)	227
	Lager secundair	1,4	(0,0-2,8)	0,1	(0,0-0,4)	222
	Hoger secundair	1,0	(0,1-1,9)	0,1	(0,1-0,3)	610
	Hoger onderwijs	1,0	(0,4-1,6)	0,1	(0,1-0,2)	1400
JAAR	**1997**	1,6	(0,4-2,8)	1,3	(0,7-2,5)	2562
	2001	0,6	(0,3-0,9)	0,5	(0,3-0,9)	2444
	2004	0,5	(0,3-0,8)	0,4	(0,3-0,7)	2951
	2008	0,8	(0,4-1,1)	0,6	(0,4-1,0)	2803
	2013	1,2	(0,7-1,7)	1,0	(0,7-1,6)	2531
	2018	1,1	(0,6-1,5)	0,9	(0,6-1,5)	2512

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B257 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met chronische blaasontsteking in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA32_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,9	(0,4-1,5)	0,9	(0,5-1,6)	1169
	Vrouwen	3,0	(2,0-4,0)	2,7	(1,9-4,0)	1344
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	2,0	(0,2-3,8)	1,7	(0,7-4,3)	230
	25 - 34	0,5	(0,0-1,2)	0,5	(0,1-1,5)	447
	35 - 44	1,8	(0,7-3,0)	1,6	(0,8-3,1)	516
	45 - 54	2,9	(1,2-4,5)	2,5	(1,4-4,6)	439
	55 - 64	2,5	(0,5-4,5)	2,1	(0,9-4,8)	378
	65 - 74	1,2	(0,0-2,5)	1,0	(0,4-2,8)	291
	75 +	4,3	(1,3-7,3)	3,3	(1,6-7,0)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	1,9	(0,0-3,8)	1,4	(0,5-3,7)	227
	Lager secundair	3,1	(0,6-5,6)	2,1	(0,9-4,9)	222
	Hoger secundair	1,3	(0,5-2,1)	1,1	(0,6-2,2)	610
	Hoger onderwijs	2,2	(1,3-3,1)	1,8	(1,1-2,8)	1401
JAAR	**1997**	2,0	(1,3-2,7)	1,8	(1,2-2,6)	2562
	2001	1,8	(1,2-2,4)	1,6	(1,1-2,2)	2441
	2004	2,6	(1,9-3,2)	2,3	(1,8-3,0)	2956
	2008	1,8	(1,2-2,3)	1,6	(1,2-2,2)	2805
	2013	1,8	(1,2-2,4)	1,7	(1,2-2,4)	2531
	2018	2,0	(1,4-2,6)	1,8	(1,3-2,5)	2513

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B258 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ernstige of chronische huidaandoening in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA33_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	2,5	(1,6-3,5)	2,5	(1,7-3,6)	1169
	Vrouwen	4,1	(2,9-5,3)	3,8	(2,7-5,3)	1344
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	1,1	(0,0-2,4)	1,1	(0,3-3,5)	230
	25 - 34	1,5	(0,3-2,7)	1,4	(0,6-3,2)	447
	35 - 44	3,4	(1,7-5,2)	3,4	(2,1-5,6)	516
	45 - 54	3,3	(1,6-5,1)	3,3	(1,9-5,6)	439
	55 - 64	4,8	(2,4-7,3)	4,7	(2,8-7,9)	378
	65 - 74	5,8	(2,2-9,4)	5,6	(3,0-10,4)	291
	75 +	7,5	(3,4-11,5)	7,0	(4,0-11,7)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	2,4	(0,2-4,5)	1,9	(0,8-4,4)	227
	Lager secundair	3,9	(0,0-7,8)	3,3	(1,2-9,0)	222
	Hoger secundair	3,2	(1,8-4,5)	3,2	(2,0-5,1)	610
	Hoger onderwijs	3,1	(2,1-4,1)	2,9	(2,0-4,0)	1401
JAAR	**1997**	3,7	(2,6-4,8)	3,7	(2,8-5,0)	2561
	2001	4,5	(3,5-5,5)	4,5	(3,6-5,6)	2453
	2004	4,5	(3,6-5,3)	4,5	(3,7-5,4)	2951
	2008	2,3	(1,6-3,0)	2,3	(1,7-3,2)	2804
	2013	3,4	(2,5-4,2)	3,4	(2,7-4,4)	2531
	2018	3,3	(2,6-4,1)	3,4	(2,7-4,3)	2513

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B259 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met galstenen of galblaasontsteking in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA34_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,2	(0,0-0,4)	0,4	(0,1-1,1)	1169
	Vrouwen	1,2	(0,6-1,9)	1,1	(0,7-1,7)	1344
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	230
	25 - 34	0,0	.	.	.	447
	35 - 44	0,8	(0,1-1,4)	0,7	(0,3-1,7)	516
	45 - 54	1,8	(0,4-3,2)	1,7	(0,8-3,4)	439
	55 - 64	1,3	(0,0-2,9)	1,1	(0,4-3,7)	378
	65 - 74	0,5	(0,0-1,2)	0,4	(0,1-1,9)	291
	75 +	1,3	(0,0-2,6)	1,0	(0,4-2,9)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	1,1	(0,0-2,7)	1,4	(0,4-5,5)	227
	Lager secundair	0,5	(0,0-1,3)	0,7	(0,2-3,3)	222
	Hoger secundair	0,5	(0,0-1,1)	0,4	(0,2-1,2)	610
	Hoger onderwijs	0,9	(0,3-1,4)	0,6	(0,3-1,3)	1401
JAAR	**1997**	1,2	(0,6-1,7)	1,1	(0,6-1,8)	2562
	2001	1,0	(0,6-1,5)	0,9	(0,6-1,3)	2450
	2004	0,7	(0,4-1,0)	0,6	(0,4-1,0)	2938
	2008	0,5	(0,2-0,8)	0,5	(0,3-0,9)	2797
	2013	0,5	(0,2-0,7)	0,5	(0,3-0,8)	2531
	2018	0,7	(0,4-1,1)	0,8	(0,5-1,2)	2513

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B260 Percentage van de mannelijke bevolking van 15 jaar en ouder met prostaatklachten in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA35_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
LEEFTIJDSGROEP						
	15 - 24	0,0	.	.	.	97
	25 - 34	0,0	.	.	.	205
	35 - 44	1,3	(0,0-2,7)	1,3	(0,4-3,9)	248
	45 - 54	2,8	(0,5-5,2)	2,8	(1,2-6,4)	229
	55 - 64	5,6	(2,0-9,3)	5,6	(2,9-10,6)	176
	65 - 74	12,7	(6,6-18,9)	12,7	(7,8-20,1)	129
	75 +	30,0	(18,9-41,1)	30,0	(20,3-41,9)	84
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	4,6	(1,1-8,1)	3,2	(1,1-8,7)	112
	Lager secundair	7,1	(1,4-12,8)	4,1	(1,5-11,2)	93
	Hoger secundair	2,9	(1,1-4,7)	2,4	(1,2-4,9)	304
	Hoger onderwijs	4,6	(3,0-6,2)	2,7	(1,6-4,4)	634
JAAR	**2001**	4,4	(3,2-5,6)	2,4	(1,7-3,3)	1140
	2004	4,4	(3,3-5,5)	2,5	(1,8-3,6)	1306
	2008	3,7	(2,6-4,8)	2,2	(1,5-3,2)	1251
	2013	4,2	(2,9-5,4)	2,6	(1,9-3,7)	1177
	2018	4,2	(3,1-5,3)	2,5	(1,8-3,6)	1168

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B261 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met astma in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA01_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	6,3	(3,0-9,6)	6,2	(3,6-10,5)	213
	Vrouwen	12,5	(8,2-16,8)	12,6	(8,8-17,5)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	10,9	(7,2-14,7)	10,5	(7,4-14,6)	291
	75 +	8,9	(4,6-13,2)	8,0	(4,7-13,2)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	17,1	(7,5-26,6)	15,9	(8,7-27,5)	66
	Lager secundair	6,1	(0,0-12,2)	5,8	(2,2-14,5)	59
	Hoger secundair	9,0	(3,0-15,0)	8,1	(3,9-15,9)	99
	Hoger onderwijs	9,8	(5,8-13,8)	9,3	(6,0-14,2)	267
JAAR	**2001**	9,1	(6,4-11,8)	9,1	(6,8-12,2)	533
	2004	6,3	(4,5-8,0)	6,3	(4,8-8,3)	957
	2008	7,8	(5,4-10,1)	7,8	(5,8-10,5)	732
	2013	7,8	(4,6-11,1)	7,8	(5,1-11,9)	427
	2018	9,9	(7,1-12,7)	9,9	(7,4-13,1)	503

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B262 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met chronisch longlijden in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA02_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	6,0	(2,9-9,2)	6,0	(3,5-10,1)	212
	Vrouwen	7,3	(4,2-10,4)	7,3	(4,7-11,1)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	6,9	(3,9-9,9)	6,9	(4,5-10,5)	290
	75 +	6,6	(3,3-9,9)	6,5	(3,8-10,7)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	16,2	(6,6-25,8)	16,7	(9,3-28,2)	66
	Lager secundair	7,2	(1,1-13,3)	7,3	(3,1-16,0)	59
	Hoger secundair	6,8	(1,4-12,2)	6,7	(2,9-14,8)	99
	Hoger onderwijs	4,4	(2,0-6,8)	4,3	(2,5-7,2)	266
JAAR	**2001**	15,4	(12,0-18,7)	15,4	(12,3-19,1)	531
	2004	11,7	(9,4-14,0)	11,7	(9,6-14,3)	958
	2008	10,1	(7,4-12,7)	10,1	(7,7-13,0)	731
	2013	8,1	(4,9-11,3)	8,1	(5,4-11,9)	427
	2018	6,8	(4,5-9,0)	6,8	(4,8-9,3)	502

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B263 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hartinfarct in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA03_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	6,2	(1,7-10,6)	6,2	(2,9-12,6)	213
	Vrouwen	1,6	(0,0-3,7)	1,6	(0,5-5,1)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	3,2	(0,0-6,4)	2,5	(1,0-6,3)	291
	75 +	3,8	(0,8-6,9)	3,4	(1,2-9,1)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	9,7	(0,0-19,3)	9,4	(3,0-26,0)	66
	Lager secundair	6,1	(0,0-16,6)	4,8	(0,9-21,6)	59
	Hoger secundair	2,4	(0,0-5,8)	2,1	(0,5-7,8)	99
	Hoger onderwijs	1,7	(0,2-3,3)	1,2	(0,5-3,3)	267
JAAR	**2008**	5,8	(3,7-7,9)	5,3	(3,6-7,6)	736
	2013	1,6	(0,3-3,0)	1,4	(0,6-3,3)	427
	2018	3,5	(1,3-5,7)	3,1	(1,6-5,8)	503

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B264 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met coronaire hartziekte in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA04_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	8,7	(3,9-13,5)	8,7	(4,9-14,9)	213
	Vrouwen	2,7	(0,9-4,5)	2,7	(1,4-5,0)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	5,0	(1,5-8,4)	4,1	(2,2-7,8)	291
	75 +	5,4	(2,5-8,3)	5,0	(2,7-8,9)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	5,1	(0,0-11,0)	5,0	(1,5-15,3)	66
	Lager secundair	7,7	(0,0-18,5)	6,8	(1,7-23,3)	59
	Hoger secundair	4,0	(0,0-8,4)	3,8	(1,3-10,2)	99
	Hoger onderwijs	5,2	(2,6-7,8)	4,3	(2,3-7,7)	267
JAAR	**2008**	10,0	(7,3-12,8)	9,4	(6,9-12,6)	723
	2013	3,8	(1,3-6,3)	3,5	(1,8-6,4)	427
	2018	5,2	(2,9-7,4)	4,7	(3,0-7,2)	503

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B265 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ernstige hartziekte (uitgezonderd hartinfarct of coronaire hartziekte) in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA05_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	8,2	(3,9-12,6)	8,0	(4,8-13,1)	213
	Vrouwen	4,3	(1,9-6,7)	3,9	(2,2-7,0)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	4,3	(2,0-6,6)	4,0	(2,2-7,0)	291
	75 +	7,6	(3,8-11,5)	7,6	(4,6-12,3)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	8,8	(1,2-16,4)	8,2	(3,4-18,5)	66
	Lager secundair	7,8	(1,5-14,1)	7,2	(3,2-15,5)	59
	Hoger secundair	2,9	(0,0-6,5)	2,9	(0,9-8,9)	99
	Hoger onderwijs	5,7	(2,4-8,9)	5,2	(3,0-9,0)	267
JAAR	**2013**	7,0	(4,2-9,9)	6,6	(4,3-10,0)	427
	2018	5,9	(3,7-8,2)	5,5	(3,8-8,0)	503

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B266 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoge bloeddruk in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA06_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	33,5	(26,2-40,8)	33,6	(26,8-41,3)	213
	Vrouwen	37,1	(30,9-43,3)	36,7	(30,9-43,0)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	32,9	(27,3-38,6)	33,0	(27,6-38,8)	291
	75 +	38,4	(31,1-45,7)	38,2	(31,3-45,6)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	35,8	(22,8-48,7)	34,1	(23,0-47,2)	66
	Lager secundair	40,0	(26,8-53,2)	39,4	(27,6-52,6)	59
	Hoger secundair	34,7	(24,4-45,0)	34,2	(25,0-44,7)	99
	Hoger onderwijs	35,2	(28,7-41,6)	35,5	(29,2-42,2)	267
JAAR	**1997**	26,8	(20,2-33,4)	26,7	(20,7-33,7)	565
	2001	31,1	(26,8-35,4)	31,1	(27,0-35,5)	540
	2004	34,0	(30,4-37,7)	34,0	(30,4-37,8)	952
	2008	35,7	(31,2-40,1)	35,8	(31,4-40,4)	725
	2013	40,4	(34,8-46,1)	40,5	(35,0-46,2)	427
	2018	35,6	(31,0-40,2)	35,6	(31,2-40,3)	503

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B267 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoge bloeddruk dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet te hebben gevolgd, Brussels Gewest

MA06_30		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	25,7	(13,5-37,8)	25,5	(15,5-39,0)	72
	Vrouwen	20,4	(12,1-28,7)	20,6	(13,6-30,1)	104
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	24,1	(13,7-34,4)	23,9	(15,3-35,3)	96
	75 +	21,0	(11,4-30,5)	21,4	(13,4-32,6)	80
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	34,4	(11,4-57,4)	37,4	(18,2-61,5)	24
	Lager secundair	18,5	(0,0-42,4)	18,9	(5,4-48,7)	21
	Hoger secundair	30,5	(12,6-48,3)	31,6	(17,1-50,8)	34
	Hoger onderwijs	17,0	(9,1-25,0)	16,6	(10,1-26,1)	93
JAAR	**2001**	28,3	(20,6-36,0)	28,5	(21,4-36,9)	153
	2008	32,9	(23,8-42,0)	32,9	(24,5-42,6)	162
	2013	40,3	(31,4-49,3)	40,6	(32,0-49,8)	168
	2018	22,4	(15,5-29,4)	22,7	(16,5-30,4)	176

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B268 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoge bloeddruk dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden geneesmiddelen te hebben genomen, Brussels Gewest

MA06_40		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	91,9	(83,6-100,0)	91,9	(80,0-97,0)	72
	Vrouwen	94,0	(89,4-98,5)	94,3	(87,6-97,5)	104
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	94,3	(89,5-99,1)	94,4	(87,0-97,7)	96
	75 +	92,1	(84,7-99,6)	91,9	(80,1-97,0)	80
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	91,9	(80,1-100,0)	92,4	(69,4-98,5)	24
	Lager secundair	97,2	(91,3-100,0)	97,5	(81,2-99,7)	21
	Hoger secundair	91,7	(78,3-100,0)	91,9	(69,7-98,2)	34
	Hoger onderwijs	93,1	(86,4-99,8)	93,5	(84,4-97,4)	93
JAAR	**1997**	84,5	(72,4-96,6)	84,8	(70,4-92,9)	149
	2001	86,6	(81,2-92,0)	86,8	(80,5-91,4)	158
	2008	80,0	(72,7-87,3)	80,4	(72,2-86,6)	160
	2013	92,8	(88,7-96,8)	92,9	(87,9-96,0)	168
	2018	93,1	(88,6-97,7)	93,4	(87,3-96,6)	176

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B269 Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoge bloeddruk volgens de behandeling van de aandoening, Brussels Gewest

MA06_50		Geen behandeling	Enkel dieet	Medicamenteuze behandeling	N
GESLACHT	**Mannen**	7,1	1,0	91,9	72
	Vrouwen	6,0	0.0	94,0	104
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	4,9	0,8	94,3	96
	75 +	7,9	0.0	92,1	80
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	8,1	0.0	91,9	24
	Lager secundair	2,8	0.0	97,2	21
	Hoger secundair	8,3	0.0	91,7	34
	Hoger onderwijs	6,1	0,8	93,1	93
JAAR	**2001**	10,3	2,8	86,9	157
	2008	18,2	0,8	81,0	159
	2013	5,7	1,5	92,8	168
	2018	6,5	0,4	93,1	176

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

Tabel B270 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder methoog cholesterolgehalte in het bloed in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA07_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	31,7	(24,4-39,0)	31,4	(24,7-39,1)	213
	Vrouwen	34,0	(28,0-40,0)	34,3	(28,6-40,5)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	35,8	(29,7-41,9)	35,8	(30,0-42,1)	291
	75 +	30,2	(22,6-37,7)	30,0	(23,0-38,0)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	36,9	(23,3-50,6)	37,8	(25,6-51,9)	66
	Lager secundair	33,1	(18,2-48,1)	33,5	(21,1-48,8)	59
	Hoger secundair	31,7	(22,0-41,4)	31,5	(22,9-41,7)	99
	Hoger onderwijs	33,4	(26,5-40,3)	33,1	(26,4-40,7)	267
JAAR	**2013**	39,1	(33,2-44,9)	39,1	(33,5-45,0)	426
	2018	33,0	(28,2-37,8)	33,0	(28,3-38,1)	503

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B271 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet te hebben gevolgd, Brussels Gewest

MA07_30		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	41,3	(27,1-55,5)	41,9	(28,6-56,5)	67
	Vrouwen	33,4	(22,9-43,9)	33,2	(23,9-43,9)	99
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	34,7	(24,0-45,4)	34,4	(24,7-45,6)	101
	75 +	38,8	(22,6-54,9)	39,8	(25,3-56,4)	65
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	38,4	(15,6-61,2)	39,7	(20,3-62,9)	25
	Lager secundair	44,6	(13,7-75,6)	44,7	(20,5-71,7)	17
	Hoger secundair	35,9	(18,0-53,7)	36,7	(21,3-55,3)	33
	Hoger onderwijs	34,7	(20,5-48,8)	34,7	(22,4-49,4)	89
JAAR	**2013**	43,6	(34,4-52,9)	44,0	(35,1-53,2)	157
	2018	36,5	(27,2-45,8)	36,8	(28,0-46,5)	166

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B272 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden geneesmiddelen te hebben genomen, Brussels Gewest

MA07_40		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	85,2	(76,5-93,9)	86,5	(74,8-93,3)	67
	Vrouwen	78,5	(69,9-87,2)	78,6	(68,6-86,1)	99
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	77,4	(68,3-86,4)	77,5	(67,5-85,1)	101
	75 +	85,8	(75,3-96,3)	86,9	(73,1-94,2)	65
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	90,4	(78,3-100,0)	91,5	(74,2-97,6)	25
	Lager secundair	91,4	(78,1-100,0)	91,7	(71,0-98,0)	17
	Hoger secundair	80,6	(65,5-95,7)	82,7	(64,8-92,5)	33
	Hoger onderwijs	75,6	(64,6-86,7)	76,8	(63,2-86,4)	89
JAAR	**2013**	82,3	(74,2-90,4)	83,0	(73,4-89,6)	157
	2018	81,2	(74,4-88,0)	81,9	(74,1-87,6)	166

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B273 Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed volgens de behandeling van de aandoening, Brussels Gewest

MA07_50		Geen behandeling	Enkel dieet	Medicamenteuze behandeling	N
GESLACHT	**Mannen**	11,2	3,6	85,2	67
	Vrouwen	18,1	3,4	78,5	99
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	17,5	5,1	77,4	101
	75 +	12,7	1,5	85,8	65
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	5,1	4,6	90,4	25
	Lager secundair	8,6	0.0	91,4	17
	Hoger secundair	19,4	0.0	80,6	33
	Hoger onderwijs	19,0	5,4	75,6	89
JAAR	**2013**	12,8	4,9	82,3	157
	2018	15,3	3,5	81,2	166

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

Tabel B274 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beroerte in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA08_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	3,0	(1,0-5,1)	3,0	(1,5-5,8)	213
	Vrouwen	1,2	(0,1-2,3)	1,2	(0,5-3,0)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	2,3	(0,7-3,9)	2,1	(1,0-4,2)	291
	75 +	1,6	(0,2-3,0)	1,6	(0,6-3,9)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	0,7	(0,0-2,1)	0,7	(0,1-5,0)	66
	Lager secundair	4,2	(0,0-8,6)	3,9	(1,4-10,6)	59
	Hoger secundair	1,5	(0,0-3,7)	1,5	(0,3-6,7)	99
	Hoger onderwijs	2,0	(0,5-3,5)	1,8	(0,8-4,0)	267
JAAR	**1997**	5,5	(0,4-10,5)	5,5	(2,2-12,8)	565
	2001	3,0	(1,6-4,5)	2,9	(1,8-4,8)	537
	2004	2,7	(1,6-3,8)	2,6	(1,7-3,9)	950
	2008	7,0	(4,6-9,3)	6,7	(4,6-9,5)	731
	2013	2,3	(0,8-3,7)	2,2	(1,2-4,1)	427
	2018	2,0	(0,9-3,0)	1,9	(1,1-3,3)	503

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B275 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met vernauwing van de bloedvaten in de buik of de benen in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA09_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	5,2	(2,2-8,3)	5,2	(2,8-9,3)	213
	Vrouwen	4,1	(1,7-6,4)	3,9	(2,3-6,6)	287
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	3,7	(1,6-5,8)	3,6	(2,1-6,3)	289
	75 +	5,4	(2,4-8,5)	5,5	(3,1-9,5)	211
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	9,6	(1,6-17,6)	9,4	(4,0-20,4)	66
	Lager secundair	4,7	(0,0-9,7)	4,6	(1,6-12,6)	59
	Hoger secundair	3,0	(0,0-6,4)	3,0	(1,0-9,0)	98
	Hoger onderwijs	3,9	(1,4-6,4)	3,8	(2,0-7,3)	265
JAAR	**2013**	7,8	(4,5-11,1)	7,5	(5,0-11,2)	424
	2018	4,5	(2,6-6,5)	4,3	(2,7-6,7)	500

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B276 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met reumatoïde artritis in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA10_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	10,0	(5,6-14,4)	9,9	(6,3-15,1)	213
	Vrouwen	13,5	(8,9-18,1)	12,8	(9,1-17,7)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	9,1	(5,6-12,6)	9,1	(6,2-13,2)	291
	75 +	15,0	(9,4-20,6)	14,7	(10,0-21,0)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	15,9	(6,5-25,4)	14,7	(7,9-25,7)	66
	Lager secundair	16,3	(4,7-28,0)	15,8	(7,7-29,5)	59
	Hoger secundair	15,4	(7,1-23,8)	14,9	(8,6-24,8)	99
	Hoger onderwijs	7,4	(3,9-11,0)	7,5	(4,6-12,0)	267
JAAR	**1997**	20,4	(13,6-27,2)	19,6	(13,5-27,6)	565
	2001	23,2	(19,1-27,3)	22,2	(18,5-26,4)	537
	2004	21,6	(18,5-24,7)	20,8	(17,9-24,0)	945
	2008	17,6	(14,1-21,2)	16,8	(13,5-20,7)	723
	2013	17,8	(13,2-22,3)	17,1	(13,1-22,1)	427
	2018	12,0	(8,7-15,3)	11,6	(8,7-15,1)	503

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B277 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met artrose in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA11_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	25,5	(18,7-32,4)	25,3	(19,0-32,8)	213
	Vrouwen	49,6	(43,2-56,1)	48,5	(42,1-54,8)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	30,1	(23,8-36,3)	29,3	(23,2-36,1)	291
	75 +	49,7	(42,1-57,2)	47,7	(40,1-55,4)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	44,3	(29,3-59,3)	36,3	(23,6-51,1)	66
	Lager secundair	40,9	(25,9-55,9)	37,4	(24,9-51,8)	59
	Hoger secundair	31,2	(21,4-41,1)	26,9	(18,7-37,1)	99
	Hoger onderwijs	41,1	(33,9-48,2)	41,8	(34,5-49,5)	267
JAAR	**1997**	27,4	(21,9-32,9)	25,5	(20,2-31,6)	565
	2001	37,7	(33,1-42,3)	35,1	(30,7-39,9)	541
	2004	31,8	(28,4-35,3)	29,5	(26,1-33,2)	949
	2008	40,3	(35,9-44,7)	38,0	(33,5-42,7)	706
	2013	41,2	(35,7-46,8)	39,6	(34,3-45,1)	427
	2018	39,7	(34,6-44,8)	38,2	(33,4-43,3)	503

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B278 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met een lage rugprobleem in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA12_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	24,0	(17,2-30,8)	24,0	(17,8-31,4)	213
	Vrouwen	31,9	(26,0-37,7)	31,9	(26,4-38,0)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	28,9	(22,4-35,3)	28,8	(22,7-35,8)	291
	75 +	28,4	(21,8-35,0)	27,6	(21,6-34,6)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	33,6	(20,3-46,9)	32,5	(20,9-46,8)	66
	Lager secundair	35,2	(19,0-51,5)	35,0	(21,0-52,2)	59
	Hoger secundair	24,6	(14,8-34,3)	23,7	(15,5-34,3)	99
	Hoger onderwijs	28,4	(22,1-34,6)	28,4	(22,6-35,0)	267
JAAR	**2008**	29,8	(25,5-34,1)	29,0	(24,8-33,6)	715
	2013	34,3	(28,8-39,8)	33,8	(28,5-39,5)	427
	2018	28,6	(24,0-33,2)	28,2	(23,8-33,0)	503

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B279 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met een nekprobleem in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA13_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	7,0	(3,8-10,2)	7,1	(4,4-11,0)	213
	Vrouwen	16,8	(12,4-21,3)	16,7	(12,8-21,6)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	11,8	(8,1-15,6)	11,1	(7,9-15,3)	291
	75 +	13,8	(9,2-18,4)	12,1	(8,5-17,1)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	13,7	(4,6-22,9)	11,4	(5,5-22,0)	66
	Lager secundair	17,8	(7,7-28,0)	16,4	(9,0-27,8)	59
	Hoger secundair	7,6	(2,4-12,8)	6,4	(3,0-12,9)	99
	Hoger onderwijs	13,0	(9,0-17,1)	12,4	(9,0-16,9)	267
JAAR	**2008**	18,8	(15,4-22,2)	17,6	(14,5-21,3)	729
	2013	22,5	(17,8-27,2)	21,4	(17,0-26,7)	427
	2018	12,8	(9,9-15,7)	12,1	(9,6-15,2)	503

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B280 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA14_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	18,9	(12,9-24,9)	18,9	(13,6-25,7)	213
	Vrouwen	16,6	(12,0-21,1)	16,6	(12,5-21,6)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	17,7	(12,8-22,5)	17,6	(13,2-23,0)	291
	75 +	17,4	(11,7-23,1)	17,5	(12,5-24,1)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	25,4	(14,1-36,7)	26,1	(16,4-38,8)	66
	Lager secundair	16,0	(5,0-27,0)	16,0	(7,8-30,0)	59
	Hoger secundair	18,9	(9,8-28,0)	19,2	(11,7-30,0)	99
	Hoger onderwijs	15,3	(10,3-20,3)	15,1	(10,8-20,7)	267
JAAR	**1997**	8,0	(4,3-11,7)	8,0	(5,1-12,5)	565
	2001	8,8	(6,3-11,2)	8,9	(6,7-11,6)	525
	2004	11,4	(9,0-13,9)	11,5	(9,3-14,3)	956
	2008	14,3	(10,9-17,6)	14,4	(11,4-18,1)	723
	2013	17,7	(13,4-22,0)	17,8	(13,9-22,5)	427
	2018	17,5	(13,8-21,3)	17,6	(14,1-21,7)	503

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B281 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet volgde, Brussels Gewest

MA14_30		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	50,0	(31,5-68,6)	49,9	(32,8-67,0)	38
	Vrouwen	54,4	(39,2-69,6)	54,4	(39,5-68,6)	49
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	51,5	(36,2-66,9)	51,4	(36,7-65,8)	51
	75 +	53,5	(35,6-71,3)	53,7	(36,6-69,9)	36
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	60,0	(32,1-87,9)	59,1	(32,6-81,2)	17
	Lager secundair	52,1	(10,5-93,7)	52,3	(20,9-81,9)	11
	Hoger secundair	49,3	(25,8-72,8)	49,3	(28,7-70,1)	18
	Hoger onderwijs	51,1	(33,0-69,3)	51,5	(34,4-68,3)	39
JAAR	**2001**	67,0	(53,1-80,8)	66,8	(52,3-78,7)	52
	2008	59,6	(45,6-73,6)	59,7	(45,4-72,6)	72
	2013	79,6	(69,8-89,3)	80,0	(68,7-87,9)	77
	2018	52,5	(41,0-63,9)	52,6	(41,2-63,7)	87

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B282 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden medicamenteus behandeld werd, Brussels Gewest

MA14_40		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	78,4	(60,9-96,0)	80,7	(62,1-91,5)	38
	Vrouwen	92,8	(85,7-100,0)	93,5	(81,6-97,9)	49
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	92,4	(84,7-100,0)	93,1	(80,4-97,8)	51
	75 +	80,5	(64,6-96,3)	82,9	(66,2-92,3)	36
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	88,7	(71,9-100,0)	89,9	(56,1-98,4)	17
	Lager secundair	100	(100,0-100,0)	100	(100,0-100,0)	11
	Hoger secundair	87,5	(71,4-100,0)	90,8	(68,7-97,8)	18
	Hoger onderwijs	83,2	(66,6-99,9)	90,2	(74,7-96,7)	39
JAAR	**2001**	87,8	(78,5-97,2)	87,9	(74,6-94,7)	52
	2008	82,2	(71,9-92,4)	83,4	(70,2-91,5)	72
	2013	89,4	(78,6-100,0)	91,1	(79,4-96,4)	77
	2018	86,5	(77,7-95,3)	87,7	(78,0-93,5)	87

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B283 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden insuline gebruikte, Brussels Gewest

MA14_50		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	33,0	(15,4-50,6)	32,8	(18,6-51,0)	38
	Vrouwen	12,0	(1,8-22,2)	12,0	(5,0-26,0)	49
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	19,3	(8,1-30,6)	18,3	(9,6-32,0)	51
	75 +	23,2	(6,8-39,7)	20,5	(9,0-40,2)	36
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	25,9	(0,6-51,2)	30,4	(10,8-61,1)	17
	Lager secundair	32,6	(2,1-63,1)	30,2	(8,7-66,2)	11
	Hoger secundair	17,1	(0,0-38,0)	13,6	(4,0-37,1)	18
	Hoger onderwijs	16,2	(1,5-31,0)	10,0	(3,6-24,4)	39
JAAR	**2001**	26,9	(13,8-39,9)	27,2	(16,4-41,7)	52
	2008	21,4	(10,1-32,7)	21,0	(12,2-33,9)	72
	2013	34,3	(21,0-47,6)	33,5	(21,6-47,9)	77
	2018	21,3	(11,5-31,0)	21,1	(13,2-31,9)	87

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B284 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden orale antidiabetica gebruikte, Brussels Gewest

MA14_60		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	69,0	(49,5-88,4)	71,4	(52,1-85,2)	38
	Vrouwen	86,7	(76,0-97,5)	87,6	(72,7-94,9)	49
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	87,2	(76,9-97,4)	87,8	(73,3-95,0)	51
	75 +	70,4	(52,1-88,6)	72,4	(53,5-85,7)	36
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	78,0	(52,5-100,0)	79,3	(42,3-95,2)	17
	Lager secundair	100	(100,0-100,0)	100	(100,0-100,0)	11
	Hoger secundair	81,2	(62,4-100,0)	85,8	(59,6-96,1)	18
	Hoger onderwijs	76,8	(57,7-95,9)	86,2	(70,7-94,1)	39
JAAR	**2001**	74,3	(61,4-87,1)	74,4	(59,3-85,2)	52
	2008	69,1	(56,1-82,1)	70,1	(55,5-81,6)	72
	2013	83,1	(71,4-94,8)	84,9	(73,0-92,1)	77
	2018	78,9	(68,2-89,6)	80,2	(68,9-88,1)	87

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B285 Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes volgens de behandeling van de aandoening, Brussels Gewest

MA14_70		Geen behandeling	Enkel dieet	Orale antidiabetica	Insuline	N
GESLACHT	**Mannen**	8,0	13,5	45,4	33,0	38
	Vrouwen	3,8	3,4	80,8	12,0	49
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	3,9	3,7	73,0	19,3	51
	75 +	7,4	12,1	57,2	23,2	36
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	11,3	0.0	62,8	25,9	17
	Lager secundair	0.0	0.0	67,4	32,6	11
	Hoger secundair	5,1	7,5	70,4	17,1	18
	Hoger onderwijs	5,3	11,4	67,0	16,2	39
JAAR	**2001**	4,0	8,2	61,0	26,9	52
	2008	15,5	2,4	60,8	21,4	72
	2013	1,3	9,3	55,1	34,3	77
	2018	5,6	7,9	65,2	21,3	87

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

Tabel B286 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met allergie in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA15_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	8,7	(4,3-13,2)	8,8	(5,3-14,2)	213
	Vrouwen	23,9	(17,9-29,9)	23,6	(18,4-29,8)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	15,5	(11,0-20,1)	14,3	(10,5-19,2)	291
	75 +	19,8	(12,4-27,2)	17,2	(11,1-25,6)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	20,8	(7,0-34,6)	16,3	(8,3-29,5)	66
	Lager secundair	17,0	(5,1-29,0)	14,7	(7,3-27,5)	59
	Hoger secundair	18,0	(9,2-26,8)	14,9	(8,9-23,8)	99
	Hoger onderwijs	17,2	(11,0-23,3)	16,3	(10,8-23,9)	267
JAAR	**2001**	15,4	(11,9-19,0)	14,7	(11,7-18,5)	534
	2004	13,8	(11,3-16,3)	13,2	(10,9-15,9)	959
	2008	12,5	(9,6-15,4)	12,0	(9,4-15,2)	727
	2013	15,3	(11,3-19,3)	14,8	(11,2-19,3)	426
	2018	17,6	(13,3-22,0)	17,1	(13,3-21,7)	503

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B287 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met een maagzweer in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA16_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	3,4	(0,5-6,2)	3,3	(1,4-7,8)	213
	Vrouwen	7,0	(3,8-10,2)	7,0	(4,4-11,0)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	5,7	(3,0-8,3)	5,4	(3,4-8,6)	291
	75 +	5,3	(1,7-8,9)	4,8	(2,2-9,9)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	12,4	(2,5-22,3)	11,2	(5,1-22,8)	66
	Lager secundair	2,9	(0,0-7,0)	2,7	(0,7-10,3)	59
	Hoger secundair	2,5	(0,0-5,6)	2,2	(0,7-7,4)	99
	Hoger onderwijs	5,7	(2,6-8,8)	5,4	(2,9-10,0)	267
JAAR	**1997**	7,1	(4,0-10,2)	7,1	(4,5-10,9)	565
	2001	9,5	(6,5-12,5)	9,5	(6,9-12,9)	540
	2004	8,3	(6,3-10,3)	8,4	(6,5-10,6)	953
	2008	9,4	(6,7-12,1)	9,5	(7,0-12,6)	732
	2013	6,6	(3,5-9,6)	6,6	(4,1-10,4)	427
	2018	5,5	(3,2-7,8)	5,5	(3,6-8,2)	503

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B288 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met leverlijden in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA17_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	2,1	(0,4-3,7)	1,9	(0,8-4,7)	213
	Vrouwen	0,7	(0,0-1,7)	0,6	(0,2-2,2)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	0,8	(0,0-1,7)	0,7	(0,2-2,0)	291
	75 +	1,7	(0,2-3,3)	1,6	(0,6-4,6)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	0,0	.	.	.	66
	Lager secundair	2,1	(0,0-5,2)	1,9	(0,4-8,7)	59
	Hoger secundair	0,0	.	.	.	99
	Hoger onderwijs	1,5	(0,1-2,9)	1,4	(0,5-3,7)	267
JAAR	**2001**	1,7	(0,4-3,0)	1,7	(0,8-3,6)	540
	2004	2,0	(1,0-3,1)	2,1	(1,2-3,4)	955
	2008	1,5	(0,4-2,5)	1,5	(0,7-2,9)	734
	2013	1,2	(0,0-2,4)	1,2	(0,4-3,4)	426
	2018	1,3	(0,4-2,2)	1,3	(0,6-2,6)	503

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B289 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met kanker in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA18_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,9	(0,2-3,7)	1,3	(0,4-3,9)	213
	Vrouwen	3,1	(1,1-5,1)	2,3	(1,1-4,9)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	4,5	(2,0-7,0)	4,4	(2,5-7,5)	291
	75 +	0,7	(0,0-1,7)	0,6	(0,2-2,7)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	3,7	(0,0-8,1)	3,4	(0,9-11,5)	66
	Lager secundair	0,0	.	.	.	59
	Hoger secundair	3,6	(0,0-7,2)	2,5	(0,9-6,6)	99
	Hoger onderwijs	2,4	(0,6-4,3)	1,6	(0,6-4,2)	267
JAAR	**1997**	5,3	(0,5-10,1)	5,2	(2,1-11,9)	564
	2001	4,2	(2,5-6,0)	4,3	(2,8-6,4)	539
	2004	3,3	(2,0-4,6)	3,3	(2,2-4,9)	947
	2008	4,4	(2,5-6,3)	4,4	(2,9-6,9)	733
	2013	6,9	(3,7-10,0)	6,8	(4,3-10,7)	426
	2018	2,6	(1,3-4,0)	2,6	(1,5-4,3)	503

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B290 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ernstige hoofdpijn zoals migraine in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA19_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,4	(0,0-3,0)	1,4	(0,4-4,3)	213
	Vrouwen	5,4	(2,8-8,1)	5,4	(3,3-8,6)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	3,3	(1,2-5,4)	2,7	(1,3-5,8)	291
	75 +	4,3	(1,7-6,9)	3,3	(1,6-6,4)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	7,0	(0,7-13,3)	4,9	(1,4-15,8)	66
	Lager secundair	2,6	(0,0-6,5)	2,1	(0,4-10,0)	59
	Hoger secundair	3,2	(0,0-6,8)	2,3	(0,7-7,5)	99
	Hoger onderwijs	3,6	(1,3-5,8)	3,1	(1,7-5,6)	267
JAAR	**1997**	14,7	(8,7-20,7)	13,6	(8,8-20,4)	565
	2001	10,6	(7,8-13,5)	9,9	(7,5-13,0)	540
	2004	8,2	(6,1-10,2)	7,6	(5,8-9,8)	952
	2008	7,1	(4,7-9,4)	6,6	(4,7-9,2)	725
	2013	10,5	(6,9-14,0)	9,9	(6,8-14,1)	425
	2018	3,8	(2,1-5,4)	3,5	(2,2-5,5)	503

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B291 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met urinaire incontinentie in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA20_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	9,2	(4,9-13,4)	8,4	(5,1-13,5)	213
	Vrouwen	14,0	(9,3-18,6)	12,0	(8,5-16,6)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	6,4	(3,5-9,3)	6,3	(4,0-9,9)	291
	75 +	17,8	(12,0-23,5)	17,2	(12,3-23,5)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	14,0	(4,8-23,1)	10,0	(4,6-20,5)	66
	Lager secundair	11,9	(2,4-21,5)	9,6	(3,9-21,6)	59
	Hoger secundair	8,8	(2,0-15,5)	7,3	(3,3-15,1)	99
	Hoger onderwijs	11,3	(6,9-15,6)	10,5	(7,1-15,3)	267
JAAR	**2008**	12,8	(10,1-15,5)	11,0	(8,6-14,1)	724
	2013	19,5	(14,9-24,0)	17,6	(13,5-22,6)	426
	2018	12,0	(8,7-15,2)	10,7	(8,0-14,0)	503

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B292 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met depressie in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA21_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	3,4	(1,1-5,8)	3,4	(1,7-6,5)	213
	Vrouwen	10,9	(7,2-14,7)	11,0	(7,8-15,4)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	8,6	(5,2-11,9)	7,6	(4,8-11,7)	291
	75 +	7,1	(3,5-10,6)	5,7	(3,4-9,4)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	6,1	(0,5-11,7)	4,7	(1,9-11,5)	66
	Lager secundair	9,9	(0,8-18,9)	8,6	(3,5-19,8)	59
	Hoger secundair	9,0	(3,0-14,9)	7,0	(3,6-13,4)	99
	Hoger onderwijs	7,7	(4,5-11,0)	6,8	(4,2-10,8)	267
JAAR	**1997**	8,0	(4,7-11,4)	7,5	(4,8-11,4)	565
	2001	12,9	(9,6-16,1)	12,0	(9,2-15,4)	541
	2004	7,9	(5,9-9,9)	7,4	(5,7-9,6)	952
	2008	9,1	(6,5-11,6)	8,5	(6,3-11,3)	725
	2013	8,2	(5,3-11,1)	7,7	(5,4-11,0)	426
	2018	7,8	(5,4-10,3)	7,4	(5,4-10,1)	503

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B293 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met schildklierlijden in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA22_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	6,7	(3,4-10,1)	6,7	(4,0-10,9)	213
	Vrouwen	24,1	(18,5-29,8)	24,2	(19,1-30,2)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	16,7	(12,3-21,2)	14,7	(10,8-19,6)	291
	75 +	17,2	(11,5-22,9)	13,7	(9,4-19,7)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	23,3	(11,0-35,7)	17,6	(9,2-31,2)	66
	Lager secundair	20,4	(8,9-31,8)	17,1	(9,1-29,8)	59
	Hoger secundair	10,9	(4,7-17,2)	7,8	(4,1-14,4)	99
	Hoger onderwijs	16,4	(11,7-21,1)	14,1	(10,0-19,5)	267
JAAR	**1997**	5,6	(2,5-8,7)	4,0	(2,4-6,7)	565
	2001	6,5	(4,2-8,8)	4,8	(3,2-7,1)	540
	2004	8,5	(6,5-10,4)	6,4	(4,9-8,3)	954
	2008	8,7	(6,1-11,3)	6,7	(4,8-9,2)	733
	2013	11,3	(7,9-14,6)	8,9	(6,5-12,0)	426
	2018	16,9	(13,4-20,5)	13,9	(10,9-17,7)	503

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B294 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met cataract in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA2301_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	11,7	(6,8-16,5)	11,6	(7,7-17,2)	212
	Vrouwen	12,1	(8,1-16,1)	11,7	(8,3-16,3)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	9,9	(6,3-13,4)	9,9	(6,8-14,1)	291
	75 +	14,0	(8,7-19,3)	14,0	(9,5-20,3)	211
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	10,7	(2,8-18,6)	9,6	(4,3-20,1)	65
	Lager secundair	10,1	(2,3-17,8)	9,5	(4,3-19,7)	59
	Hoger secundair	8,8	(3,0-14,6)	8,5	(4,3-16,0)	99
	Hoger onderwijs	14,4	(9,3-19,5)	14,5	(10,2-20,2)	267
JAAR	**1997**	19,7	(13,9-25,4)	19,1	(14,3-25,0)	565
	2001	16,5	(12,8-20,2)	15,2	(11,9-19,1)	540
	2004	15,7	(13,0-18,4)	14,6	(12,2-17,5)	951
	2008	14,7	(11,6-17,8)	13,3	(10,5-16,7)	723
	2013	13,5	(9,5-17,5)	12,5	(9,2-16,9)	426
	2018	11,9	(8,7-15,1)	11,1	(8,3-14,5)	502

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B295 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met glaucoom in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA2302_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	3,2	(0,9-5,4)	2,8	(1,3-6,1)	212
	Vrouwen	7,5	(3,8-11,2)	6,2	(3,8-10,0)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	2,8	(0,9-4,7)	2,6	(1,3-5,3)	291
	75 +	8,7	(4,4-13,1)	7,8	(4,8-12,6)	211
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	4,8	(0,0-10,1)	2,7	(0,7-9,9)	65
	Lager secundair	5,2	(0,0-13,0)	3,6	(0,8-14,7)	59
	Hoger secundair	6,9	(0,4-13,4)	4,9	(2,0-11,7)	99
	Hoger onderwijs	5,9	(2,8-9,0)	5,1	(2,9-8,8)	267
JAAR	**1997**	5,7	(0,9-10,5)	5,6	(2,3-13,3)	565
	2001	6,2	(4,2-8,2)	6,0	(4,3-8,3)	538
	2004	7,8	(5,9-9,7)	7,6	(5,8-9,8)	950
	2008	7,5	(4,8-10,2)	7,2	(5,0-10,5)	726
	2013	2,6	(0,8-4,3)	2,5	(1,3-4,9)	426
	2018	5,7	(3,3-8,1)	5,6	(3,7-8,3)	502

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B296 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetische retinopathie in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA2303_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,9	(0,3-3,5)	1,5	(0,6-4,0)	212
	Vrouwen	4,9	(1,9-7,9)	3,7	(1,9-7,0)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	1,4	(0,0-2,8)	1,3	(0,5-3,5)	291
	75 +	6,0	(2,5-9,6)	5,3	(3,0-9,2)	211
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	2,0	(0,0-5,1)	1,0	(0,2-4,9)	65
	Lager secundair	3,5	(0,0-10,6)	2,1	(0,3-12,9)	59
	Hoger secundair	7,4	(1,1-13,8)	4,9	(2,1-10,9)	99
	Hoger onderwijs	2,9	(0,9-4,8)	2,2	(0,9-5,4)	267
JAAR	**2013**	1,2	(0,1-2,3)	1,0	(0,3-3,0)	426
	2018	3,7	(1,8-5,5)	3,2	(1,9-5,1)	502

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B297 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met maculadegeneratie in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA2304_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,4	(0,0-1,2)	0,4	(0,1-2,5)	212
	Vrouwen	0,4	(0,0-1,2)	0,7	(0,2-3,5)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	0,0	.	.	.	291
	75 +	0,8	(0,0-1,9)	.	.	211
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	0,0	.	.	.	65
	Lager secundair	0,0	.	.	.	59
	Hoger secundair	1,2	(0,0-3,6)	1,0	(0,2-4,8)	99
	Hoger onderwijs	0,3	(0,0-0,9)	0,7	(0,1-3,5)	267
JAAR	**2013**	2,9	(1,3-4,6)	2,4	(1,3-4,7)	426
	2018	0,4	(0,0-0,9)	0,5	(0,2-1,7)	502

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B298 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ziekte van Parkinson in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA24_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	3,9	(1,3-6,5)	3,8	(2,0-7,3)	213
	Vrouwen	0,7	(0,0-1,4)	0,6	(0,2-2,1)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	1,6	(0,3-2,9)	1,1	(0,4-2,9)	291
	75 +	2,4	(0,4-4,4)	1,9	(0,8-4,4)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	2,1	(0,0-5,2)	1,6	(0,3-9,6)	66
	Lager secundair	1,1	(0,0-3,3)	0,8	(0,1-5,8)	59
	Hoger secundair	1,0	(0,0-3,0)	0,8	(0,1-5,0)	99
	Hoger onderwijs	2,7	(0,8-4,6)	1,8	(0,8-3,7)	267
JAAR	**1997**	1,3	(0,5-2,2)	1,3	(0,7-2,4)	565
	2001	2,0	(0,9-3,1)	1,8	(1,0-3,2)	539
	2004	2,0	(1,1-2,9)	1,8	(1,1-2,9)	954
	2008	1,9	(0,7-3,0)	1,6	(0,8-3,2)	729
	2013	1,5	(0,3-2,8)	1,4	(0,6-3,2)	426
	2018	2,0	(0,8-3,2)	1,8	(1,0-3,2)	503

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B299 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met epilepsie in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA25_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	2,2	(0,0-4,9)	2,1	(0,7-6,7)	213
	Vrouwen	0,6	(0,0-1,4)	0,6	(0,1-2,8)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	1,1	(0,0-2,3)	0,8	(0,2-4,0)	291
	75 +	1,4	(0,0-3,5)	1,2	(0,4-4,3)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	0,0	.	.	.	66
	Lager secundair	1,5	(0,0-4,4)	1,2	(0,2-9,4)	59
	Hoger secundair	0,0	.	.	.	99
	Hoger onderwijs	2,0	(0,0-4,3)	1,6	(0,5-5,0)	267
JAAR	**1997**	0,4	(0,0-0,9)	0,5	(0,2-1,4)	565
	2001	1,7	(0,3-3,1)	1,6	(0,7-3,8)	539
	2004	0,5	(0,0-1,0)	0,5	(0,1-1,4)	956
	2008	0,8	(0,1-1,6)	0,8	(0,3-2,0)	732
	2013	0,8	(0,0-1,9)	1,0	(0,3-3,2)	426
	2018	1,2	(0,0-2,4)	1,2	(0,4-3,4)	503

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B300 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met langdurige vermoeidheid in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA26_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	7,5	(3,3-11,7)	7,4	(4,3-12,5)	213
	Vrouwen	11,1	(7,0-15,3)	10,5	(7,1-15,2)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	7,0	(3,9-10,1)	7,0	(4,5-10,7)	291
	75 +	12,4	(7,1-17,6)	11,9	(7,5-18,4)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	12,9	(3,5-22,3)	10,7	(5,1-21,3)	66
	Lager secundair	4,2	(0,0-9,2)	3,7	(1,2-11,5)	59
	Hoger secundair	14,8	(6,4-23,3)	13,6	(7,1-24,6)	99
	Hoger onderwijs	8,4	(4,2-12,5)	8,3	(5,1-13,2)	267
JAAR	**2001**	11,6	(8,4-14,8)	11,0	(8,4-14,4)	539
	2004	10,4	(8,1-12,6)	9,9	(7,9-12,3)	950
	2008	10,9	(8,0-13,7)	10,3	(7,8-13,5)	723
	2013	11,9	(8,2-15,7)	11,5	(8,3-15,7)	426
	2018	9,6	(6,6-12,7)	9,3	(6,8-12,7)	503

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B301 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met osteoporose in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA27_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	3,7	(0,6-6,9)	3,5	(1,5-7,9)	213
	Vrouwen	14,1	(9,9-18,4)	12,9	(9,3-17,5)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	6,1	(3,3-8,8)	5,2	(3,1-8,4)	291
	75 +	13,7	(8,7-18,8)	11,0	(6,7-17,6)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	4,3	(0,0-9,4)	2,3	(0,7-7,3)	66
	Lager secundair	16,9	(5,2-28,6)	12,0	(4,7-27,2)	59
	Hoger secundair	8,0	(2,3-13,8)	5,2	(2,1-12,1)	99
	Hoger onderwijs	10,6	(6,6-14,6)	8,8	(6,0-12,8)	267
JAAR	**1997**	15,0	(10,2-19,8)	10,5	(7,6-14,4)	565
	2001	19,0	(15,4-22,7)	13,5	(10,6-17,0)	540
	2004	15,5	(12,7-18,2)	10,9	(8,8-13,5)	945
	2008	16,7	(13,2-20,2)	11,7	(8,9-15,4)	714
	2013	12,5	(9,2-15,9)	8,8	(6,5-11,9)	425
	2018	9,8	(7,0-12,7)	6,9	(4,9-9,6)	503

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B302 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met gebroken heup in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA28_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,1	(0,0-2,5)	1,1	(0,4-3,4)	213
	Vrouwen	2,0	(0,3-3,6)	1,8	(0,8-4,3)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	1,1	(0,0-2,3)	1,1	(0,4-3,0)	291
	75 +	2,1	(0,2-4,1)	2,0	(0,8-5,0)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	1,6	(0,0-4,0)	1,3	(0,2-7,8)	66
	Lager secundair	1,6	(0,0-4,9)	1,4	(0,2-10,5)	59
	Hoger secundair	1,2	(0,0-3,6)	1,0	(0,2-6,5)	99
	Hoger onderwijs	1,1	(0,0-2,5)	1,1	(0,3-3,6)	267
JAAR	**2001**	3,6	(1,8-5,4)	3,2	(1,8-5,4)	539
	2004	1,6	(0,4-2,8)	1,4	(0,6-3,3)	953
	2008	2,9	(1,6-4,2)	2,5	(1,6-4,1)	731
	2013	1,5	(0,1-2,9)	1,4	(0,5-3,5)	426
	2018	1,6	(0,5-2,7)	1,5	(0,7-2,9)	503

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B303 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met darmziekte, langer dan 3 maanden in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA29_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	3,5	(0,5-6,5)	3,5	(1,5-7,8)	213
	Vrouwen	6,8	(3,8-9,7)	6,4	(4,0-10,1)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	4,1	(1,8-6,4)	4,0	(2,3-6,8)	291
	75 +	6,8	(3,2-10,4)	6,2	(3,3-11,4)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	8,1	(0,6-15,6)	6,5	(2,5-15,8)	66
	Lager secundair	9,9	(0,8-19,0)	8,8	(3,2-22,1)	59
	Hoger secundair	2,2	(0,0-4,8)	1,9	(0,6-6,0)	99
	Hoger onderwijs	5,0	(2,3-7,6)	4,8	(2,8-8,1)	267
JAAR	**1997**	8,6	(4,4-12,8)	8,3	(5,1-13,3)	564
	2001	5,9	(3,7-8,0)	5,6	(3,9-8,0)	539
	2004	7,1	(5,2-9,1)	6,9	(5,2-9,0)	953
	2008	8,6	(6,3-10,9)	8,3	(6,2-10,9)	727
	2013	7,1	(4,0-10,1)	6,8	(4,3-10,6)	426
	2018	5,4	(3,3-7,6)	5,3	(3,5-7,7)	503

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B304 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met nierstenen in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA30_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	2,3	(0,0-5,0)	2,3	(0,8-6,6)	213
	Vrouwen	0,4	(0,0-1,2)	0,4	(0,1-2,3)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	0,9	(0,0-1,9)	0,6	(0,2-2,2)	291
	75 +	1,5	(0,0-3,7)	1,1	(0,2-5,5)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	1,7	(0,0-5,0)	1,3	(0,1-15,1)	66
	Lager secundair	3,7	(0,0-11,0)	2,5	(0,6-10,3)	59
	Hoger secundair	0,0	.	.	.	99
	Hoger onderwijs	0,9	(0,0-1,9)	0,6	(0,1-2,5)	267
JAAR	**1997**	1,6	(0,0-3,2)	1,4	(0,5-3,8)	565
	2001	2,3	(1,0-3,6)	2,0	(1,1-3,6)	539
	2004	1,4	(0,6-2,2)	1,2	(0,7-2,3)	954
	2008	2,3	(0,8-3,7)	2,0	(1,0-3,7)	732
	2013	1,6	(0,0-3,4)	1,4	(0,5-4,0)	426
	2018	1,2	(0,0-2,4)	1,0	(0,4-2,7)	503

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B305 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ernstige nierziekte behalve nierstenen in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA31_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	4,0	(1,4-6,6)	4,0	(2,1-7,6)	213
	Vrouwen	3,0	(0,5-5,6)	3,0	(1,3-6,8)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	3,1	(0,8-5,4)	3,1	(1,4-6,5)	291
	75 +	3,8	(0,9-6,6)	3,8	(1,8-8,0)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	3,2	(0,0-7,8)	3,2	(0,8-11,4)	66
	Lager secundair	3,8	(0,0-8,5)	3,7	(1,1-11,9)	59
	Hoger secundair	3,5	(0,0-7,3)	3,6	(1,2-9,8)	99
	Hoger onderwijs	3,5	(0,7-6,3)	3,5	(1,4-8,1)	267
JAAR	**1997**	6,2	(0,0-12,8)	5,7	(2,3-13,4)	565
	2001	1,2	(0,1-2,3)	1,1	(0,4-2,9)	538
	2004	1,2	(0,4-2,0)	1,1	(0,6-2,1)	953
	2008	2,2	(0,8-3,6)	1,9	(1,0-3,7)	731
	2013	2,9	(1,1-4,7)	2,5	(1,3-4,8)	426
	2018	3,4	(1,6-5,3)	3,0	(1,6-5,5)	503

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B306 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met chronische blaasontsteking in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA32_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,5	(0,0-3,2)	1,3	(0,4-3,9)	213
	Vrouwen	3,6	(1,2-6,1)	2,9	(1,3-6,2)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	1,2	(0,0-2,5)	1,2	(0,4-3,1)	291
	75 +	4,3	(1,3-7,3)	3,8	(1,8-8,2)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	3,2	(0,0-7,8)	2,0	(0,5-7,6)	66
	Lager secundair	8,7	(0,0-17,4)	6,5	(2,3-17,0)	59
	Hoger secundair	2,4	(0,0-5,8)	1,8	(0,4-8,0)	99
	Hoger onderwijs	1,3	(0,0-2,7)	1,2	(0,4-3,3)	267
JAAR	**1997**	3,6	(1,5-5,6)	3,6	(2,0-6,3)	565
	2001	4,7	(2,7-6,8)	4,7	(3,0-7,2)	540
	2004	4,4	(2,9-5,8)	4,3	(3,1-6,0)	953
	2008	4,4	(2,5-6,2)	4,3	(2,8-6,7)	730
	2013	5,2	(2,4-8,1)	5,2	(3,0-8,9)	426
	2018	2,8	(1,1-4,4)	2,7	(1,5-4,9)	503

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B307 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ernstige of chronische huidaandoening in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA33_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	5,4	(1,4-9,5)	5,4	(2,5-11,3)	213
	Vrouwen	7,5	(3,9-11,1)	7,3	(4,6-11,5)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	5,8	(2,2-9,4)	5,8	(3,0-10,8)	291
	75 +	7,5	(3,4-11,5)	7,2	(4,2-12,1)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	6,6	(0,0-14,3)	6,5	(2,1-18,8)	66
	Lager secundair	7,5	(0,0-18,3)	7,5	(1,7-28,1)	59
	Hoger secundair	10,8	(3,7-18,0)	10,8	(5,6-19,5)	99
	Hoger onderwijs	3,9	(1,6-6,1)	3,9	(2,2-6,8)	267
JAAR	**1997**	4,9	(2,0-7,9)	5,0	(2,7-8,9)	565
	2001	6,0	(3,5-8,4)	6,0	(3,9-8,9)	540
	2004	5,0	(3,4-6,5)	5,0	(3,6-6,8)	949
	2008	1,5	(0,6-2,3)	1,6	(0,9-2,8)	733
	2013	5,2	(2,8-7,6)	5,2	(3,3-8,1)	426
	2018	6,6	(4,0-9,3)	6,6	(4,4-9,8)	503

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B308 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met galstenen of galblaasontsteking in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA34_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,6	(0,0-1,4)	0,6	(0,1-2,7)	213
	Vrouwen	1,1	(0,0-2,2)	0,9	(0,4-2,4)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	0,5	(0,0-1,2)	0,5	(0,1-2,2)	291
	75 +	1,3	(0,0-2,6)	1,2	(0,5-3,0)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	0,0	.	.	.	66
	Lager secundair	0,8	(0,0-2,3)	0,5	(0,0-5,8)	59
	Hoger secundair	1,0	(0,0-2,9)	0,7	(0,1-4,7)	99
	Hoger onderwijs	1,2	(0,0-2,3)	1,0	(0,3-3,0)	267
JAAR	**1997**	3,1	(0,9-5,3)	3,0	(1,4-6,2)	565
	2001	2,3	(0,9-3,7)	2,2	(1,2-4,0)	540
	2004	2,3	(1,2-3,3)	2,2	(1,3-3,5)	946
	2008	1,3	(0,3-2,2)	1,2	(0,6-2,6)	729
	2013	1,8	(0,5-3,1)	1,7	(0,8-3,6)	426
	2018	0,9	(0,2-1,6)	0,8	(0,4-1,9)	503

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B309 Percentage van de mannelijke bevolking van 65 jaar en ouder met prostaatklachten in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

MA35_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
LEEFTIJDSGROEP						
	65 - 74	12,7	(6,6-18,9)	12,7	(7,8-20,1)	129
	75 +	30,0	(18,9-41,1)	30,0	(20,3-41,9)	84
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	28,5	(6,0-51,0)	23,2	(8,8-48,5)	22
	Lager secundair	21,9	(0,7-43,1)	21,4	(8,2-45,3)	23
	Hoger secundair	11,7	(0,0-23,6)	10,7	(3,5-28,3)	36
	Hoger onderwijs	21,5	(13,6-29,3)	20,2	(13,6-29,0)	128
JAAR	**1997**	8,6	(4,8-12,3)	8,7	(5,6-13,3)	246
	2001	18,5	(13,0-24,0)	18,4	(13,6-24,5)	214
	2004	19,1	(14,4-23,8)	19,0	(14,7-24,2)	372
	2008	19,6	(13,3-25,9)	19,4	(13,8-26,6)	243
	2013	21,8	(14,4-29,3)	21,6	(15,1-30,0)	172
	2018	20,3	(14,3-26,4)	20,2	(15,0-26,8)	213

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B310 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens aantal aandoeningen waaraan ze lijden °, Brussels Gewest

MA_1		Geen	1	2	3 of meer	N
GESLACHT	**Mannen**	73,4	18,2	5,6	2,8	1167
	Vrouwen	64,3	22,5	9,7	3,5	1344
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	88,2	11,3	0,2	0,3	230
	25 - 34	91,6	7,2	0,8	0,4	447
	35 - 44	81,7	14,7	2,9	0,7	516
	45 - 54	64,5	26,4	7,7	1,5	439
	55 - 64	42,9	37,1	13,9	6,1	377
	65 - 74	32,6	36,1	21,5	9,9	290
	75 +	24,8	32,9	28,1	14,2	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	59,0	20,5	12,5	8,0	227
	Lager secundair	54,6	29,0	13,2	3,1	222
	Hoger secundair	70,8	20,4	6,3	2,6	609
	Hoger onderwijs	72,0	18,9	6,5	2,6	1400
JAAR	**1997**	67,7	22,4	6,6	3,4	2558
	2001	67,2	21,7	7,9	3,2	2351
	2004	69,5	19,5	7,9	3,2	2875
	2013	68,5	19,1	7,8	4,6	2530
	2018	68,7	20,4	7,7	3,2	2511

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

° op een totaal van 6 chronische aandoeningen: chronisch longlijden, hartlijden, diabetes, artritis/artrose, hypertensie, kanker

Tabel B311 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met multimorbiditeit *, Brussels Gewest

MA_2		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	8,4	(6,8-10,0)	5,5	(4,0-7,3)	1167
	Vrouwen	13,2	(11,3-15,1)	8,0	(6,0-10,5)	1344
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,5	(0,0-1,3)	0,5	(0,1-2,1)	230
	25 - 34	1,2	(0,1-2,3)	1,2	(0,5-3,0)	447
	35 - 44	3,6	(2,0-5,2)	3,6	(2,3-5,5)	516
	45 - 54	9,1	(5,9-12,3)	9,1	(6,4-12,8)	439
	55 - 64	19,9	(15,5-24,4)	19,7	(15,6-24,5)	377
	65 - 74	31,4	(25,6-37,1)	30,9	(25,6-36,7)	290
	75 +	42,3	(34,6-50,0)	41,0	(33,5-49,0)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	20,5	(14,8-26,2)	10,2	(6,6-15,6)	227
	Lager secundair	16,3	(10,9-21,8)	8,7	(5,3-14,0)	222
	Hoger secundair	8,9	(6,6-11,2)	6,4	(4,5-9,1)	609
	Hoger onderwijs	9,2	(7,4-10,9)	5,6	(4,1-7,4)	1400
JAAR	**1997**	10,0	(8,2-11,8)	6,7	(5,3-8,4)	2558
	2001	11,1	(9,7-12,6)	7,1	(5,9-8,4)	2351
	2004	11,0	(9,8-12,3)	7,4	(6,3-8,6)	2875
	2013	12,4	(10,8-14,1)	9,2	(7,7-10,8)	2530
	2018	10,9	(9,5-12,2)	7,6	(6,5-8,9)	2511

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)
Meer dan één van de volgende aandoeningen: chronisch longlijden, hartlijden, diabetes, artritis/artrose, hypertensie, kanker

Tabel B312 Gemiddeld aantal chronische aandoeningen bij personen van 15 jaar en ouder (op een totaal van 25 aandoeningen°), Brussels Gewest

MA_3		Gemiddelde (Ruw)	95% BI gemid	Gemiddelde (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,9	(0,8-1,0)	1,1	(1,0-1,2)	1166
	Vrouwen	1,5	(1,4-1,6)	1,6	(1,5-1,7)	1343
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,6	(0,4-0,7)	0,6	(0,4-0,7)	230
	25 - 34	0,6	(0,5-0,7)	0,6	(0,5-0,7)	447
	35 - 44	0,9	(0,8-1,0)	0,9	(0,8-1,0)	516
	45 - 54	1,2	(1,1-1,4)	1,3	(1,1-1,4)	438
	55 - 64	2,0	(1,7-2,3)	2,0	(1,7-2,2)	377
	65 - 74	2,1	(1,9-2,4)	2,1	(1,8-2,3)	290
	75 +	2,8	(2,4-3,1)	2,7	(2,4-3,0)	211
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	1,6	(1,3-1,9)	1,6	(1,3-1,9)	226
	Lager secundair	1,6	(1,2-1,9)	1,6	(1,3-1,9)	222
	Hoger secundair	1,1	(0,9-1,2)	1,3	(1,2-1,5)	609
	Hoger onderwijs	1,1	(1,0-1,2)	1,3	(1,2-1,4)	1399
JAAR	**2001**	1,3	(1,3-1,4)	1,5	(1,4-1,5)	2317
	2004	1,2	(1,2-1,3)	1,4	(1,3-1,5)	2765
	2013	1,3	(1,2-1,4)	1,4	(1,3-1,5)	2527
	2018	1,2	(1,1-1,3)	1,4	(1,3-1,4)	2509

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

° Astma, chronisch longlijden, hartlijden, hoge bloeddruk, beroerte, artritis/artrose, diabetes, allergie, maagzweer, chronische darmproblemen, leverlijden, galstenen/ontsteking van de galblaas, kanker, ernstige hoofdpijn, depressie, schildklierlijden, glaucoom, cataract, ziekte van Parkinson, epilepsie, ernstig nierlijden/nierstenen, chronische blaasontsteking, chronische vermoeidheid, osteoporose, ernstige huidziekte

Tabel B313 Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder volgens aantal aandoeningen waaraan ze lijden °, Brussels Gewest

MA_10		Geen	1	2	3 of meer	N
GESLACHT	**Mannen**	36,0	33,0	19,0	12,0	212
	Vrouwen	23,6	35,6	28,8	12,0	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	32,6	36,1	21,5	9,9	290
	75 +	24,8	32,9	28,1	14,2	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	23,3	33,1	19,3	24,4	66
	Lager secundair	22,6	35,2	36,3	5,8	59
	Hoger secundair	34,0	34,4	21,0	10,6	99
	Hoger onderwijs	29,9	34,6	24,5	11,0	266
JAAR	**1997**	35,0	35,7	17,6	11,8	564
	2001	30,1	37,5	20,5	11,9	511
	2004	31,8	34,9	22,3	11,1	917
	2013	28,3	34,2	20,9	16,6	426
	2018	28,7	34,5	24,8	12,0	502

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
° op een totaal van 6 chronische aandoeningen: chronisch longlijden, hartlijden, diabetes, artritis/artrose, hypertensie, kanker

Tabel B314 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met multimorbiditeit *, Brussels Gewest

MA_20		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	31,0	(23,8-38,2)	31,1	(24,4-38,6)	212
	Vrouwen	40,8	(34,4-47,1)	40,0	(34,0-46,4)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	31,4	(25,6-37,1)	31,3	(26,0-37,2)	290
	75 +	42,3	(34,6-50,0)	41,6	(34,0-49,5)	212
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	43,7	(30,0-57,3)	40,1	(27,8-53,7)	66
	Lager secundair	42,2	(27,3-57,1)	40,9	(28,0-55,1)	59
	Hoger secundair	31,6	(21,1-42,1)	30,1	(21,0-41,2)	99
	Hoger onderwijs	35,5	(28,7-42,3)	35,9	(29,4-43,1)	266
JAAR	**1997**	29,4	(21,2-37,5)	29,2	(21,6-38,2)	564
	2001	32,4	(27,8-36,9)	31,9	(27,5-36,6)	511
	2004	33,3	(29,7-37,0)	32,9	(29,4-36,7)	917
	2013	37,5	(32,0-42,9)	37,2	(31,9-42,7)	426
	2018	36,8	(31,9-41,6)	36,5	(31,9-41,4)	502

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)
Meer dan één van de volgende aandoeningen: chronisch longlijden, hartlijden, diabetes, artritis/artrose, hypertensie, kanker

Tabel B315 Gemiddeld aantal chronische aandoeningen bij personen van 65 jaar en ouder (op een totaal van 25 aandoeningen°), Brussels Gewest

MA_30		Gemiddelde (Ruw)	95% BI gemid	Gemiddelde (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,9	(1,6-2,2)	1,9	(1,7-2,2)	211
	Vrouwen	2,8	(2,5-3,1)	2,8	(2,5-3,0)	290
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	2,1	(1,9-2,4)	2,1	(1,9-2,4)	290
	75 +	2,8	(2,4-3,1)	2,7	(2,4-3,0)	211
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	2,9	(2,1-3,8)	2,7	(1,9-3,5)	65
	Lager secundair	2,6	(2,0-3,2)	2,5	(2,0-3,1)	59
	Hoger secundair	2,2	(1,7-2,7)	2,1	(1,7-2,6)	99
	Hoger onderwijs	2,3	(2,1-2,6)	2,4	(2,1-2,6)	266
JAAR	**2001**	2,6	(2,4-2,8)	2,6	(2,3-2,8)	502
	2004	2,4	(2,2-2,5)	2,3	(2,2-2,5)	869
	2013	2,6	(2,3-2,9)	2,5	(2,2-2,9)	424
	2018	2,4	(2,2-2,6)	2,4	(2,2-2,6)	501

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

° Astma, chronisch longlijden, hartlijden, hoge bloeddruk, beroerte, artritis/artrose, diabetes, allergie, maagzweer, chronische darmproblemen, leverlijden, galstenen/ontsteking van de galblaas, kanker, ernstige hoofdpijn, depressie, schildklierlijden, glaucoom, cataract, ziekte van Parkinson, epilepsie, ernstig nierlijden/nierstenen, chronische blaasontsteking, chronische vermoeidheid, osteoporose, ernstige huidziekte

Tabel B316 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een zelfgerapporteerde chronische ziekte of aandoening, Waals Gewest

MA_SH02		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	28,7	(25,2-32,2)	27,7	(24,2-31,6)	1382
	Vrouwen	36,3	(32,8-39,8)	34,5	(31,0-38,3)	1530
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	13,6	(8,3-18,9)	13,6	(9,1-19,9)	305
	25 - 34	22,9	(16,0-29,9)	22,7	(16,6-30,4)	335
	35 - 44	28,5	(22,0-35,1)	28,4	(22,5-35,2)	437
	45 - 54	32,2	(26,1-38,2)	32,0	(26,3-38,2)	556
	55 - 64	40,7	(34,2-47,1)	40,4	(34,2-47,0)	550
	65 - 74	45,4	(39,0-51,9)	45,2	(38,7-51,8)	409
	75 +	50,4	(42,9-57,9)	49,7	(42,3-57,1)	320
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	44,8	(35,4-54,3)	34,4	(24,7-45,5)	219
	Lager secundair	32,3	(25,8-38,9)	27,5	(22,0-33,6)	447
	Hoger secundair	33,5	(28,4-38,6)	33,3	(28,0-39,0)	884
	Hoger onderwijs	29,8	(25,8-33,7)	29,3	(25,6-33,3)	1281
JAAR	**2001**	32,5	(30,4-34,7)	32,3	(30,2-34,5)	3671
	2004	31,0	(28,8-33,3)	30,7	(28,5-33,1)	3442
	2008	32,1	(29,8-34,4)	30,7	(28,4-33,0)	2622
	2013	32,3	(29,6-35,0)	30,5	(27,8-33,3)	2526
	2018	32,7	(30,0-35,4)	30,7	(28,0-33,5)	2912

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B317 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met astma in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA01_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	6,2	(4,4-8,0)	5,9	(4,5-7,8)	1735
	Vrouwen	8,4	(6,5-10,3)	8,1	(6,4-10,2)	1865
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	4,7	(2,2-7,2)	4,7	(2,8-7,8)	449
	25 - 34	8,4	(4,4-12,4)	8,4	(5,1-13,4)	439
	35 - 44	9,8	(5,5-14,0)	9,7	(6,2-14,9)	528
	45 - 54	4,6	(2,6-6,7)	4,6	(2,9-7,1)	647
	55 - 64	9,9	(6,1-13,8)	9,8	(6,6-14,3)	637
	65 - 74	7,6	(4,6-10,6)	7,5	(5,0-10,9)	479
	75 +	6,1	(3,1-9,1)	5,8	(3,5-9,5)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	10,6	(5,9-15,3)	10,8	(6,7-16,8)	291
	Lager secundair	6,7	(3,4-9,9)	6,4	(3,9-10,4)	595
	Hoger secundair	8,2	(5,5-10,9)	7,7	(5,6-10,6)	1059
	Hoger onderwijs	6,3	(4,6-8,0)	5,8	(4,4-7,6)	1556
JAAR	**2001**	6,1	(5,1-7,2)	6,1	(5,2-7,3)	4141
	2004	6,1	(4,9-7,2)	6,0	(5,0-7,3)	4232
	2008	5,9	(4,9-6,8)	5,8	(4,9-6,9)	3396
	2013	5,6	(4,7-6,6)	5,6	(4,7-6,7)	3590
	2018	7,3	(6,0-8,6)	7,2	(6,1-8,6)	3600

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B318 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met chronisch longlijden in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA02_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	3,8	(2,7-4,8)	3,2	(2,4-4,3)	1735
	Vrouwen	6,6	(5,0-8,2)	5,1	(3,6-7,1)	1865
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	1,2	(0,0-2,7)	1,2	(0,3-4,0)	449
	25 - 34	2,2	(0,6-3,8)	2,1	(1,0-4,4)	439
	35 - 44	3,5	(1,0-6,0)	3,5	(1,7-6,8)	528
	45 - 54	3,4	(1,6-5,1)	3,3	(1,9-5,4)	647
	55 - 64	7,8	(5,0-10,5)	7,5	(5,2-10,7)	637
	65 - 74	9,5	(6,1-12,8)	9,2	(6,4-13,0)	479
	75 +	13,1	(8,3-17,9)	12,2	(8,4-17,4)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	14,6	(8,9-20,3)	8,1	(4,7-13,5)	291
	Lager secundair	7,3	(4,4-10,1)	5,0	(3,3-7,6)	595
	Hoger secundair	5,5	(3,6-7,5)	4,8	(3,1-7,4)	1059
	Hoger onderwijs	2,8	(1,7-3,9)	2,5	(1,7-3,6)	1556
JAAR	**2001**	8,1	(7,0-9,1)	7,5	(6,5-8,6)	4140
	2004	7,9	(6,8-9,0)	7,3	(6,3-8,5)	4230
	2008	5,0	(4,1-5,9)	4,5	(3,7-5,5)	3393
	2013	5,2	(4,3-6,2)	4,7	(3,9-5,6)	3590
	2018	5,2	(4,2-6,2)	4,6	(3,8-5,6)	3600

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B319 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hartinfarct in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA03_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,0	(0,5-1,6)	0,8	(0,4-1,8)	1736
	Vrouwen	1,0	(0,5-1,5)	0,8	(0,3-1,7)	1865
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	449
	25 - 34	0,0	.	.	.	439
	35 - 44	0,4	(0,0-1,1)	0,4	(0,1-2,5)	528
	45 - 54	0,4	(0,0-1,0)	0,4	(0,1-2,0)	647
	55 - 64	2,0	(0,7-3,3)	2,0	(1,0-3,9)	638
	65 - 74	3,2	(1,2-5,1)	3,2	(1,7-5,7)	479
	75 +	2,1	(0,3-4,0)	2,2	(0,9-5,1)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	3,2	(0,6-5,7)	1,5	(0,6-3,9)	291
	Lager secundair	1,3	(0,3-2,3)	0,8	(0,3-2,2)	595
	Hoger secundair	0,7	(0,2-1,3)	0,6	(0,3-1,2)	1059
	Hoger onderwijs	0,8	(0,2-1,4)	0,9	(0,3-2,3)	1557
JAAR	**2008**	0,8	(0,5-1,1)	0,5	(0,3-0,8)	3396
	2013	1,4	(0,9-2,0)	0,8	(0,5-1,4)	3589
	2018	1,0	(0,6-1,4)	0,6	(0,3-1,3)	3601

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B320 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met coronaire hartziekte in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA04_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,3	(0,7-2,0)	0,7	(0,4-1,2)	1736
	Vrouwen	1,4	(0,8-2,0)	0,7	(0,3-1,4)	1865
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	449
	25 - 34	0,3	(0,0-0,7)	0,3	(0,0-1,8)	439
	35 - 44	0,2	(0,0-0,7)	0,2	(0,0-1,7)	528
	45 - 54	0,1	(0,0-0,3)	0,1	(0,0-0,6)	647
	55 - 64	2,3	(0,9-3,7)	2,3	(1,2-4,3)	638
	65 - 74	3,6	(1,5-5,8)	3,6	(2,0-6,5)	479
	75 +	5,0	(2,5-7,5)	5,0	(3,0-8,4)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	5,5	(2,3-8,7)	1,4	(0,6-3,2)	291
	Lager secundair	1,4	(0,3-2,4)	0,5	(0,2-1,4)	595
	Hoger secundair	1,0	(0,3-1,8)	0,6	(0,2-1,5)	1059
	Hoger onderwijs	0,9	(0,3-1,4)	0,7	(0,3-1,3)	1557
JAAR	**2008**	2,3	(1,7-2,9)	1,2	(0,8-1,7)	3396
	2013	1,8	(1,3-2,4)	0,9	(0,6-1,4)	3590
	2018	1,4	(0,9-1,8)	0,7	(0,4-1,1)	3601

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B321 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ernstige hartziekte (uitgezonderd hartinfarct of coronaire hartziekte) in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA05_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	3,4	(2,2-4,6)	1,5	(0,9-2,3)	1736
	Vrouwen	2,4	(1,5-3,3)	0,9	(0,5-1,6)	1864
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	(0,0-0,1)	0,0	(0,0-0,1)	449
	25 - 34	0,3	(0,0-0,8)	0,3	(0,0-1,8)	439
	35 - 44	1,2	(0,1-2,3)	1,2	(0,4-3,0)	528
	45 - 54	2,5	(0,7-4,3)	2,4	(1,2-5,1)	647
	55 - 64	4,8	(2,3-7,2)	4,7	(2,8-7,8)	638
	65 - 74	7,9	(3,8-12,0)	7,8	(4,7-12,7)	479
	75 +	6,0	(3,4-8,6)	6,2	(4,0-9,5)	420
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	5,4	(2,2-8,6)	1,2	(0,5-2,6)	291
	Lager secundair	3,7	(2,0-5,5)	1,1	(0,6-2,2)	595
	Hoger secundair	2,5	(1,5-3,6)	1,0	(0,5-1,9)	1059
	Hoger onderwijs	2,1	(0,9-3,3)	0,9	(0,5-1,6)	1556
JAAR	**2013**	1,9	(1,4-2,5)	1,0	(0,7-1,5)	3589
	2018	2,9	(2,1-3,7)	1,5	(1,0-2,2)	3600

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B322 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoge bloeddruk in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA06_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	17,2	(14,8-19,5)	12,0	(9,6-15,0)	1736
	Vrouwen	19,5	(16,9-22,0)	12,3	(10,1-14,9)	1862
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,7	(0,0-1,4)	0,7	(0,2-2,0)	449
	25 - 34	5,3	(2,0-8,6)	5,3	(2,8-9,8)	439
	35 - 44	9,8	(6,3-13,3)	9,8	(6,8-13,9)	528
	45 - 54	16,3	(12,5-20,0)	16,3	(12,9-20,4)	645
	55 - 64	30,6	(25,3-35,8)	30,6	(25,6-36,0)	638
	65 - 74	37,7	(32,0-43,5)	37,7	(32,2-43,6)	479
	75 +	39,6	(32,5-46,8)	39,6	(32,7-46,8)	420
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	25,4	(18,4-32,3)	9,8	(6,6-14,1)	291
	Lager secundair	24,7	(19,7-29,7)	14,1	(10,7-18,4)	593
	Hoger secundair	17,3	(14,1-20,4)	12,5	(9,7-16,0)	1059
	Hoger onderwijs	15,3	(12,8-17,9)	11,4	(9,1-14,2)	1556
JAAR	**1997**	12,9	(11,0-14,7)	11,3	(9,7-13,2)	3000
	2001	14,5	(13,0-16,0)	11,0	(9,7-12,3)	4133
	2004	16,0	(14,4-17,5)	12,3	(10,8-13,9)	4231
	2008	16,9	(15,4-18,5)	12,9	(11,5-14,5)	3379
	2013	15,3	(13,8-16,9)	11,1	(9,9-12,5)	3590
	2018	18,4	(16,6-20,2)	13,5	(12,0-15,1)	3598

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B323 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoge bloeddruk dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet te hebben gevolgd, Waals Gewest

MA06_3		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	13,6	(9,1-18,0)	16,1	(10,3-24,4)	343
	Vrouwen	24,6	(18,0-31,2)	28,9	(19,5-40,5)	349
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	6
	25 - 34	17,2	(1,7-32,8)	19,0	(5,8-47,0)	20
	35 - 44	18,3	(3,7-33,0)	19,8	(8,6-39,3)	49
	45 - 54	19,0	(9,6-28,4)	18,7	(11,3-29,4)	105
	55 - 64	25,7	(15,0-36,5)	24,2	(15,8-35,1)	168
	65 - 74	17,4	(10,2-24,7)	16,1	(10,2-24,5)	187
	75 +	16,4	(8,0-24,8)	14,2	(8,1-23,5)	157
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	16,8	(5,1-28,5)	19,2	(8,1-39,0)	81
	Lager secundair	28,1	(17,7-38,5)	30,0	(18,1-45,5)	139
	Hoger secundair	13,7	(6,5-21,0)	14,8	(7,8-26,4)	190
	Hoger onderwijs	21,4	(13,7-29,2)	24,7	(16,0-36,1)	250
JAAR	**2001**	22,8	(18,2-27,4)	20,8	(15,9-26,8)	555
	2008	25,1	(20,3-29,8)	23,0	(17,6-29,5)	445
	2013	19,3	(14,5-24,1)	17,3	(12,6-23,3)	583
	2018	19,6	(15,3-24,0)	18,1	(13,3-24,0)	692

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B324 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoge bloeddruk dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden geneesmiddelen te hebben genomen, Waals Gewest

MA06_4		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	84,4	(78,0-90,9)	76,0	(65,5-84,1)	343
	Vrouwen	87,7	(83,3-92,1)	71,2	(58,0-81,5)	349
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	14,1	(0,0-77,7)	13,0	(1,5-59,4)	6
	25 - 34	38,9	(7,8-70,0)	37,6	(14,8-67,7)	20
	35 - 44	64,1	(44,4-83,9)	63,1	(43,0-79,6)	49
	45 - 54	84,1	(75,1-93,1)	84,1	(73,1-91,1)	105
	55 - 64	92,5	(87,9-97,2)	92,7	(86,4-96,2)	168
	65 - 74	93,3	(89,0-97,7)	93,5	(87,9-96,6)	187
	75 +	92,3	(86,2-98,5)	92,7	(84,4-96,7)	157
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	94,1	(88,2-100,0)	78,3	(50,0-92,9)	81
	Lager secundair	86,9	(78,9-94,9)	70,7	(51,3-84,6)	139
	Hoger secundair	82,7	(73,5-91,8)	67,8	(52,1-80,3)	190
	Hoger onderwijs	86,6	(81,1-92,2)	77,9	(65,4-86,8)	250
JAAR	**1997**	79,5	(73,8-85,1)	72,7	(65,2-79,0)	422
	2001	77,7	(72,7-82,8)	64,9	(56,9-72,3)	591
	2008	80,7	(75,7-85,8)	71,4	(62,8-78,7)	442
	2013	92,8	(89,7-96,0)	87,4	(80,8-91,9)	583
	2018	86,3	(82,4-90,1)	76,6	(69,9-82,2)	692

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B325 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoge bloeddruk volgens de behandeling van de aandoening, Waals Gewest

MA06_5		Geen behandeling	Enkel dieet	Medicamenteuze behandeling	N
GESLACHT	**Mannen**	14,3	1,2	84,4	343
	Vrouwen	9,5	2,8	87,7	349
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	85,9	0.0	14,1	6
	25 - 34	50,0	11,1	38,9	20
	35 - 44	34,4	1,5	64,1	49
	45 - 54	9,9	6,0	84,1	105
	55 - 64	6,9	0,6	92,5	168
	65 - 74	5,9	0,8	93,3	187
	75 +	6,5	1,2	92,3	157
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	5,9	0.0	94,1	81
	Lager secundair	10,1	3,0	86,9	139
	Hoger secundair	16,1	1,2	82,7	190
	Hoger onderwijs	10,4	3,0	86,6	250
JAAR	**2001**	14,8	2,4	82,9	562
	2008	18,3	1,0	80,7	442
	2013	5,6	1,6	92,8	583
	2018	11,6	2,1	86,3	692

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

Tabel B326 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA07_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	18,5	(15,7-21,2)	14,1	(11,4-17,4)	1730
	Vrouwen	17,5	(15,0-19,9)	12,0	(9,4-15,1)	1862
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	1,2	(0,0-2,5)	1,2	(0,4-3,5)	448
	25 - 34	4,9	(2,2-7,5)	4,8	(2,8-8,3)	439
	35 - 44	12,0	(8,2-15,7)	11,9	(8,6-16,1)	526
	45 - 54	21,4	(15,8-27,0)	21,4	(16,4-27,4)	644
	55 - 64	27,1	(22,4-31,8)	27,1	(22,7-32,0)	636
	65 - 74	35,9	(29,9-41,8)	35,9	(30,2-42,0)	479
	75 +	31,3	(24,7-37,9)	31,8	(25,6-38,7)	420
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	28,6	(21,1-36,1)	15,2	(10,2-22,0)	290
	Lager secundair	20,5	(16,1-24,9)	12,9	(9,7-17,0)	595
	Hoger secundair	16,2	(12,9-19,5)	12,5	(9,6-16,2)	1055
	Hoger onderwijs	16,1	(13,3-18,9)	12,7	(9,9-16,1)	1553
JAAR	**2013**	15,7	(14,1-17,4)	10,8	(9,2-12,6)	3580
	2018	18,0	(16,1-19,8)	12,4	(10,4-14,6)	3592

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B327 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet te hebben gevolgd, Waals Gewest

MA07_3		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	19,6	(13,8-25,3)	18,0	(11,5-27,0)	320
	Vrouwen	26,6	(20,1-33,1)	25,0	(16,9-35,2)	323
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	14,4	(0,0-100,0)	12,1	(1,5-56,1)	6
	25 - 34	23,6	(0,0-52,4)	23,8	(7,4-54,9)	23
	35 - 44	27,6	(11,9-43,3)	28,4	(15,7-45,6)	51
	45 - 54	17,6	(8,2-27,1)	18,2	(10,7-29,2)	113
	55 - 64	26,7	(18,0-35,5)	26,5	(18,7-36,0)	161
	65 - 74	23,8	(14,8-32,7)	23,5	(15,7-33,5)	170
	75 +	21,1	(9,9-32,3)	20,0	(11,4-32,7)	119
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	18,7	(5,9-31,4)	16,8	(7,3-34,0)	78
	Lager secundair	27,8	(17,2-38,4)	26,6	(15,7-41,3)	134
	Hoger secundair	21,0	(12,1-30,0)	19,2	(10,8-31,6)	164
	Hoger onderwijs	22,0	(15,2-28,8)	20,9	(13,5-30,8)	245
JAAR	**2013**	28,9	(23,7-34,1)	27,5	(20,9-35,4)	573
	2018	23,1	(18,6-27,6)	22,1	(16,3-29,3)	643

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B328 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden geneesmiddelen te hebben genomen, Waals Gewest

MA07_4		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	65,8	(57,3-74,3)	44,1	(31,8-57,1)	320
	Vrouwen	63,5	(56,2-70,8)	37,8	(27,6-49,3)	323
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,9	(0,9-0,9)	1,0	(0,1-9,0)	6
	25 - 34	31,4	(0,4-62,4)	31,0	(11,8-60,3)	23
	35 - 44	40,5	(23,0-57,9)	39,7	(24,9-56,8)	51
	45 - 54	50,5	(34,5-66,5)	49,7	(34,7-64,7)	113
	55 - 64	77,1	(68,6-85,7)	77,3	(67,3-84,9)	161
	65 - 74	75,4	(65,7-85,0)	75,5	(64,8-83,7)	170
	75 +	75,0	(63,3-86,7)	75,7	(62,6-85,3)	119
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	74,0	(60,1-88,0)	44,0	(26,7-63,0)	78
	Lager secundair	62,7	(50,1-75,3)	37,3	(22,7-54,7)	134
	Hoger secundair	72,2	(62,0-82,5)	51,1	(35,4-66,5)	164
	Hoger onderwijs	56,8	(46,7-66,8)	34,3	(23,7-46,7)	245
JAAR	**2013**	73,2	(68,3-78,1)	55,4	(45,8-64,7)	573
	2018	64,6	(58,9-70,3)	45,1	(35,7-54,9)	643

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B329 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed volgens de behandeling van de aandoening, Waals Gewest

MA07_5		Geen behandeling	Enkel dieet	Medicamenteuze behandeling	N
GESLACHT	**Mannen**	31,8	2,4	65,8	320
	Vrouwen	29,4	7,1	63,5	323
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	85,6	13,5	0,9	6
	25 - 34	58,9	9,7	31,4	23
	35 - 44	49,3	10,2	40,5	51
	45 - 54	45,1	4,4	50,5	113
	55 - 64	18,4	4,5	77,1	161
	65 - 74	22,1	2,5	75,4	170
	75 +	21,4	3,6	75,0	119
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	26,0	0.0	74,0	78
	Lager secundair	31,7	5,6	62,7	134
	Hoger secundair	26,0	1,8	72,2	164
	Hoger onderwijs	36,1	7,1	56,8	245
JAAR	**2013**	20,6	6,2	73,2	573
	2018	30,6	4,8	64,6	643

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

Tabel B330 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met beroerte in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA08_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,3	(0,7-2,0)	1,0	(0,5-2,0)	1736
	Vrouwen	0,9	(0,4-1,4)	0,6	(0,3-1,4)	1865
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	449
	25 - 34	0,0	.	.	.	439
	35 - 44	0,1	(0,0-0,4)	0,1	(0,0-0,9)	528
	45 - 54	1,2	(0,0-2,3)	1,1	(0,4-3,0)	647
	55 - 64	1,8	(0,4-3,2)	1,8	(0,8-3,8)	638
	65 - 74	1,3	(0,2-2,3)	1,2	(0,5-2,9)	479
	75 +	4,4	(1,9-6,9)	4,6	(2,6-7,9)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	4,4	(1,2-7,7)	1,6	(0,7-4,0)	291
	Lager secundair	1,0	(0,2-1,9)	0,6	(0,2-1,5)	595
	Hoger secundair	0,6	(0,1-1,1)	0,4	(0,2-1,1)	1059
	Hoger onderwijs	0,9	(0,3-1,6)	1,0	(0,4-2,4)	1557
JAAR	**1997**	1,1	(0,3-1,9)	1,0	(0,5-2,0)	2999
	2001	1,0	(0,6-1,3)	0,8	(0,5-1,3)	4141
	2004	1,0	(0,6-1,3)	0,7	(0,5-1,0)	4227
	2008	1,4	(1,0-1,8)	0,9	(0,6-1,4)	3393
	2013	1,4	(0,9-1,9)	0,9	(0,6-1,4)	3590
	2018	1,1	(0,7-1,5)	0,8	(0,5-1,3)	3601

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B331 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met vernauwing van de bloedvaten in de buik of de benen in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA09_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	2,1	(1,2-3,0)	1,4	(0,8-2,3)	1734
	Vrouwen	1,8	(1,0-2,5)	1,1	(0,6-2,0)	1865
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	449
	25 - 34	0,1	(0,0-0,3)	0,1	(0,0-0,7)	438
	35 - 44	0,8	(0,0-2,0)	0,8	(0,2-3,2)	528
	45 - 54	2,5	(0,6-4,4)	2,5	(1,1-5,3)	647
	55 - 64	2,8	(1,2-4,4)	2,8	(1,6-4,9)	638
	65 - 74	3,1	(1,2-4,9)	3,1	(1,6-5,6)	479
	75 +	5,6	(3,1-8,2)	5,7	(3,6-9,0)	420
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	6,0	(2,4-9,6)	2,5	(1,0-6,0)	291
	Lager secundair	2,8	(1,0-4,7)	1,5	(0,7-3,3)	594
	Hoger secundair	1,2	(0,5-1,9)	0,8	(0,4-1,6)	1058
	Hoger onderwijs	1,5	(0,8-2,3)	1,2	(0,6-2,2)	1557
JAAR	**2013**	1,7	(1,1-2,3)	1,0	(0,7-1,5)	3584
	2018	1,9	(1,4-2,5)	1,2	(0,7-1,8)	3599

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B332 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met reumatoïde artritis in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA10_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	4,1	(2,9-5,4)	2,8	(1,9-4,1)	1733
	Vrouwen	7,4	(5,9-8,8)	4,5	(3,2-6,2)	1863
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,5	(0,0-1,0)	0,5	(0,1-1,6)	449
	25 - 34	0,7	(0,0-1,8)	0,7	(0,2-2,9)	439
	35 - 44	3,5	(1,4-5,6)	3,4	(1,9-6,2)	528
	45 - 54	7,2	(4,3-10,1)	7,0	(4,6-10,6)	645
	55 - 64	7,6	(5,0-10,2)	7,3	(5,2-10,3)	636
	65 - 74	9,8	(6,1-13,4)	9,5	(6,5-13,5)	479
	75 +	15,6	(11,0-20,1)	14,5	(10,7-19,5)	420
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	11,9	(7,1-16,8)	4,7	(2,7-8,0)	291
	Lager secundair	7,5	(4,8-10,1)	3,8	(2,3-6,2)	594
	Hoger secundair	6,4	(4,4-8,3)	4,4	(2,9-6,8)	1057
	Hoger onderwijs	3,9	(2,7-5,1)	2,7	(1,9-3,9)	1555
JAAR	**1997**	9,0	(7,1-10,8)	7,2	(5,7-8,9)	2996
	2001	8,6	(7,5-9,7)	5,6	(4,7-6,6)	4140
	2004	7,6	(6,5-8,7)	5,0	(4,1-6,0)	4219
	2008	7,9	(6,8-9,0)	5,1	(4,3-6,0)	3373
	2013	7,3	(6,1-8,5)	4,5	(3,7-5,5)	3588
	2018	5,8	(4,8-6,8)	3,5	(2,8-4,3)	3596

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B333 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met artrose in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA11_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	15,8	(13,3-18,3)	10,0	(7,8-12,7)	1735
	Vrouwen	25,4	(22,6-28,3)	15,9	(12,9-19,5)	1865
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	1,0	(0,0-2,2)	1,0	(0,3-3,1)	449
	25 - 34	2,2	(0,6-3,9)	2,2	(1,0-4,6)	439
	35 - 44	10,2	(5,6-14,9)	10,1	(6,3-15,7)	528
	45 - 54	22,1	(16,8-27,3)	21,6	(16,8-27,5)	647
	55 - 64	32,4	(26,8-38,0)	32,0	(26,6-37,9)	637
	65 - 74	43,6	(37,1-50,1)	43,2	(36,7-50,1)	479
	75 +	48,0	(41,1-55,0)	46,3	(39,5-53,3)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	39,8	(31,6-47,9)	16,4	(10,6-24,5)	291
	Lager secundair	21,8	(17,0-26,5)	10,3	(7,3-14,3)	595
	Hoger secundair	21,4	(17,8-25,1)	15,2	(11,9-19,2)	1058
	Hoger onderwijs	16,7	(13,4-19,9)	11,4	(8,8-14,8)	1557
JAAR	**1997**	10,5	(9,0-11,9)	7,6	(6,4-9,0)	2997
	2001	14,6	(13,1-16,2)	9,1	(8,0-10,4)	4133
	2004	13,4	(12,0-14,7)	8,2	(7,1-9,5)	4217
	2008	18,3	(16,6-20,0)	12,1	(10,6-13,7)	3346
	2013	17,4	(15,5-19,2)	10,8	(9,4-12,3)	3584
	2018	20,8	(18,7-22,9)	13,3	(11,6-15,3)	3600

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B334 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een lage rugprobleem in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA12_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	20,8	(17,9-23,7)	20,5	(17,5-23,8)	1734
	Vrouwen	24,8	(21,9-27,7)	23,4	(20,6-26,5)	1864
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	9,5	(4,8-14,2)	9,5	(5,7-15,4)	448
	25 - 34	15,0	(10,1-20,0)	15,1	(10,7-20,8)	439
	35 - 44	24,0	(17,8-30,1)	24,0	(18,4-30,7)	528
	45 - 54	27,0	(21,8-32,2)	26,9	(22,0-32,5)	646
	55 - 64	25,4	(20,2-30,5)	25,3	(20,5-30,8)	637
	65 - 74	27,8	(22,1-33,5)	27,7	(22,5-33,6)	479
	75 +	36,6	(29,9-43,3)	36,1	(29,8-43,0)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	32,6	(23,5-41,7)	26,3	(18,1-36,5)	291
	Lager secundair	24,6	(19,8-29,3)	22,0	(17,7-27,0)	595
	Hoger secundair	24,9	(20,9-28,8)	25,1	(21,1-29,5)	1058
	Hoger onderwijs	19,2	(16,0-22,4)	19,0	(15,9-22,6)	1555
JAAR	**2008**	19,0	(17,2-20,8)	18,0	(16,3-19,9)	3348
	2013	17,0	(15,2-18,8)	15,8	(14,1-17,6)	3588
	2018	22,9	(20,7-25,0)	21,5	(19,3-23,9)	3598

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B335 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een nekprobleem in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA13_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	9,7	(7,6-11,7)	9,2	(7,3-11,6)	1734
	Vrouwen	18,7	(16,2-21,3)	17,4	(14,9-20,4)	1865
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	6,0	(1,5-10,4)	5,8	(2,6-12,1)	448
	25 - 34	7,3	(4,3-10,4)	7,1	(4,6-10,8)	439
	35 - 44	14,3	(9,3-19,3)	13,9	(9,7-19,4)	528
	45 - 54	17,0	(12,7-21,2)	16,3	(12,5-20,9)	647
	55 - 64	17,7	(13,8-21,5)	16,9	(13,4-21,1)	637
	65 - 74	20,0	(13,8-26,2)	19,1	(13,7-26,1)	479
	75 +	21,5	(16,1-26,9)	19,5	(14,6-25,4)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	17,1	(11,1-23,2)	12,4	(8,2-18,3)	291
	Lager secundair	14,7	(10,7-18,8)	12,0	(8,8-16,2)	595
	Hoger secundair	16,3	(13,1-19,4)	15,6	(12,4-19,4)	1058
	Hoger onderwijs	12,2	(9,6-14,9)	11,4	(8,9-14,4)	1556
JAAR	**2008**	11,7	(10,3-13,0)	10,0	(8,7-11,5)	3371
	2013	10,5	(9,1-12,0)	8,8	(7,6-10,2)	3589
	2018	14,3	(12,6-16,1)	12,1	(10,3-14,2)	3599

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B336 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA14_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	6,1	(4,7-7,5)	2,9	(2,0-4,2)	1734
	Vrouwen	7,0	(5,3-8,8)	3,0	(2,0-4,5)	1865
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	(0,0-0,1)	0,0	(0,0-0,3)	449
	25 - 34	1,5	(0,1-2,9)	1,5	(0,6-3,8)	439
	35 - 44	2,2	(0,6-3,8)	2,2	(1,1-4,4)	527
	45 - 54	5,4	(2,8-8,0)	5,4	(3,3-8,7)	647
	55 - 64	12,5	(8,5-16,5)	12,5	(9,0-17,0)	637
	65 - 74	15,3	(11,2-19,5)	15,3	(11,6-20,0)	479
	75 +	13,1	(8,6-17,5)	13,0	(9,2-18,1)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	12,2	(7,4-17,1)	3,5	(2,0-6,0)	291
	Lager secundair	8,9	(5,6-12,2)	3,3	(2,0-5,4)	595
	Hoger secundair	7,8	(5,5-10,1)	3,9	(2,6-5,8)	1057
	Hoger onderwijs	3,7	(2,5-4,8)	1,8	(1,2-2,8)	1557
JAAR	**1997**	3,6	(2,6-4,5)	2,6	(1,9-3,4)	3000
	2001	4,8	(3,9-5,6)	3,0	(2,4-3,7)	4104
	2004	5,0	(4,2-5,9)	3,2	(2,6-3,9)	4233
	2008	4,4	(3,6-5,1)	2,7	(2,2-3,3)	3375
	2013	5,7	(4,7-6,7)	3,4	(2,8-4,2)	3590
	2018	6,6	(5,4-7,7)	3,9	(3,1-4,7)	3599

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B337 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet volgde, Waals Gewest

MA14_3		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	46,2	(35,3-57,0)	81,6	(71,0-89,0)	121
	Vrouwen	59,9	(47,7-72,0)	88,6	(80,4-93,7)	112
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	1
	25 - 34	30,3	(0,0-100,0)	28,1	(5,3-73,3)	5
	35 - 44	65,9	(20,6-100,0)	63,3	(26,2-89,4)	11
	45 - 54	54,7	(28,2-81,3)	55,1	(31,1-76,9)	26
	55 - 64	64,4	(49,2-79,7)	63,8	(48,2-77,0)	63
	65 - 74	48,5	(33,5-63,6)	48,9	(34,0-64,0)	75
	75 +	44,3	(25,6-63,0)	43,1	(26,0-62,0)	52
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	49,7	(28,9-70,5)	84,9	(64,1-94,7)	37
	Lager secundair	49,1	(29,5-68,7)	82,8	(66,4-92,1)	50
	Hoger secundair	46,4	(29,9-62,9)	79,7	(66,7-88,5)	82
	Hoger onderwijs	64,5	(49,8-79,2)	90,3	(80,7-95,4)	53
JAAR	**2001**	67,2	(58,4-76,0)	71,3	(59,1-81,0)	177
	2008	65,4	(56,5-74,4)	70,3	(57,8-80,3)	174
	2013	48,2	(39,1-57,2)	53,8	(41,4-65,7)	225
	2018	53,7	(45,2-62,2)	58,0	(45,4-69,7)	233

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B338 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden medicamenteus behandeld werd, Waals Gewest

MA14_4		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	94,0	(88,2-99,9)	98,3	(95,7-99,3)	121
	Vrouwen	91,6	(86,5-96,6)	97,7	(94,5-99,1)	112
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	100	.	.	.	1
	25 - 34	63,5	(0,0-100,0)	64,7	(20,2-93,0)	5
	35 - 44	95,4	(83,6-100,0)	95,7	(72,3-99,5)	11
	45 - 54	92,9	(80,9-100,0)	93,0	(70,1-98,7)	26
	55 - 64	93,6	(86,4-100,0)	93,8	(80,0-98,3)	63
	65 - 74	95,9	(90,0-100,0)	95,9	(84,5-99,0)	75
	75 +	91,0	(82,7-99,3)	91,2	(78,1-96,8)	52
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	93,1	(91,9-94,4)	98,3	(91,0-99,7)	37
	Lager secundair	94,6	(87,2-100,0)	98,5	(93,5-99,7)	50
	Hoger secundair	90,9	(82,9-98,9)	97,4	(93,4-99,0)	82
	Hoger onderwijs	93,8	(86,2-100,0)	98,2	(93,9-99,5)	53
JAAR	**2001**	90,0	(84,3-95,6)	86,7	(77,2-92,7)	180
	2008	88,9	(82,7-95,1)	85,6	(74,8-92,3)	173
	2013	93,8	(90,1-97,4)	92,4	(85,7-96,1)	225
	2018	92,7	(88,7-96,6)	90,4	(82,0-95,1)	233

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B339 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden insuline gebruikte, Waals Gewest

MA14_5		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	22,8	(13,2-32,3)	65,8	(49,7-79,0)	121
	Vrouwen	25,0	(13,7-36,3)	68,3	(50,7-81,9)	112
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	100	.	.	.	1
	25 - 34	30,3	(0,0-100,0)	29,9	(6,0-73,9)	5
	35 - 44	19,7	(0,0-65,1)	19,3	(2,8-66,6)	11
	45 - 54	23,1	(0,1-46,2)	23,2	(8,7-48,9)	26
	55 - 64	30,5	(13,1-47,8)	30,3	(16,5-48,9)	63
	65 - 74	19,2	(7,7-30,8)	19,3	(10,2-33,3)	75
	75 +	20,3	(5,9-34,8)	20,2	(9,4-38,3)	52
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	24,1	(5,1-43,1)	34,9	(13,4-65,0)	37
	Lager secundair	24,8	(8,0-41,5)	31,4	(15,1-54,2)	50
	Hoger secundair	23,1	(9,9-36,3)	25,8	(14,6-41,3)	82
	Hoger onderwijs	23,3	(8,9-37,7)	30,2	(15,3-50,9)	53
JAAR	**2001**	45,4	(36,1-54,7)	54,8	(42,3-66,7)	178
	2008	31,5	(22,7-40,3)	40,2	(28,2-53,4)	174
	2013	27,2	(18,8-35,5)	35,9	(24,9-48,6)	225
	2018	24,0	(16,6-31,4)	31,6	(21,3-44,0)	233

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B340 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden orale antidiabetica gebruikte, Waals Gewest

MA14_6		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	85,6	(76,9-94,3)	96,5	(92,8-98,3)	121
	Vrouwen	80,0	(69,6-90,5)	95,1	(89,1-97,9)	112
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	100	.	.	.	1
	25 - 34	33,2	(0,0-100,0)	34,4	(4,9-84,3)	5
	35 - 44	95,4	(83,6-100,0)	95,7	(72,5-99,5)	11
	45 - 54	81,7	(62,8-100,0)	81,8	(58,0-93,6)	26
	55 - 64	76,9	(60,4-93,5)	77,5	(58,1-89,5)	63
	65 - 74	92,2	(83,6-100,0)	92,2	(78,2-97,5)	75
	75 +	84,4	(71,5-97,3)	84,9	(66,8-94,0)	52
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	85,5	(70,8-100,0)	94,6	(80,1-98,7)	37
	Lager secundair	77,8	(62,1-93,5)	93,2	(82,9-97,5)	50
	Hoger secundair	80,1	(66,5-93,7)	95,4	(89,0-98,2)	82
	Hoger onderwijs	87,4	(75,7-99,0)	96,9	(92,1-98,8)	53
JAAR	**2001**	69,9	(60,7-79,1)	65,7	(52,8-76,6)	180
	2008	71,2	(62,4-80,0)	67,1	(53,7-78,2)	172
	2013	80,3	(72,3-88,3)	77,9	(67,3-85,8)	224
	2018	82,5	(75,7-89,4)	80,1	(69,2-87,8)	233

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B341 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetes volgens de behandeling van de aandoening, Waals Gewest

MA14_7		Geen behandeling	Enkel dieet	Orale antidiabetica	Insuline	N
GESLACHT	**Mannen**	5,7	0,3	71,3	22,8	121
	Vrouwen	5,2	3,3	66,5	25,0	112
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0.0	0.0	0.0	100,0	1
	25 - 34	36,5	0.0	33,2	30,3	5
	35 - 44	4,6	0.0	75,7	19,7	11
	45 - 54	7,1	0.0	69,8	23,1	26
	55 - 64	4,7	1,6	63,2	30,5	63
	65 - 74	0,2	3,9	76,7	19,2	75
	75 +	7,0	2,0	70,6	20,3	52
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	6,9	0.0	69,0	24,1	37
	Lager secundair	4,8	0,6	69,8	24,8	50
	Hoger secundair	5,3	3,9	67,8	23,1	82
	Hoger onderwijs	6,2	0.0	70,5	23,3	53
JAAR	**2001**	4,8	5,4	44,4	45,4	178
	2008	3,6	7,5	57,3	31,6	173
	2013	4,1	2,2	66,6	27,2	225
	2018	5,4	1,9	68,7	24,0	233

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

Tabel B342 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met allergie in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA15_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	16,1	(13,4-18,9)	15,5	(13,1-18,4)	1736
	Vrouwen	19,0	(16,4-21,5)	18,8	(16,4-21,5)	1864
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	22,2	(16,4-28,1)	22,3	(17,0-28,8)	449
	25 - 34	17,9	(12,8-23,0)	17,9	(13,3-23,8)	439
	35 - 44	20,1	(15,1-25,2)	20,2	(15,6-25,7)	528
	45 - 54	17,2	(13,1-21,3)	17,1	(13,4-21,6)	647
	55 - 64	14,2	(10,5-18,0)	14,1	(10,8-18,3)	638
	65 - 74	18,7	(13,9-23,6)	18,6	(14,3-23,9)	479
	75 +	11,2	(7,1-15,2)	10,8	(7,5-15,5)	420
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	16,9	(10,2-23,7)	19,2	(12,6-28,0)	291
	Lager secundair	11,2	(7,7-14,8)	11,4	(8,3-15,4)	594
	Hoger secundair	20,3	(16,5-24,1)	19,7	(16,2-23,7)	1059
	Hoger onderwijs	18,1	(15,6-20,7)	17,2	(14,9-19,9)	1557
JAAR	**2001**	13,7	(12,3-15,1)	13,3	(12,0-14,8)	4141
	2004	13,7	(12,2-15,2)	13,3	(11,9-14,8)	4227
	2008	12,6	(11,1-14,0)	12,3	(10,9-13,8)	3375
	2013	12,1	(10,6-13,7)	11,9	(10,4-13,5)	3590
	2018	17,6	(15,8-19,4)	17,3	(15,6-19,2)	3600

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B343 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een maagzweer in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA16_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	4,8	(3,3-6,3)	4,4	(3,1-6,2)	1735
	Vrouwen	8,1	(6,0-10,3)	7,4	(5,6-9,7)	1865
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	3,9	(0,4-7,5)	3,8	(1,5-9,5)	449
	25 - 34	2,4	(0,4-4,5)	2,4	(1,1-5,4)	438
	35 - 44	9,6	(4,9-14,4)	9,5	(5,8-15,1)	528
	45 - 54	5,8	(3,3-8,3)	5,6	(3,6-8,7)	647
	55 - 64	10,5	(6,1-14,9)	10,1	(6,7-15,1)	638
	65 - 74	6,2	(3,3-9,2)	6,0	(3,7-9,5)	479
	75 +	7,0	(3,3-10,6)	6,4	(3,7-10,7)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	5,8	(1,9-9,7)	4,7	(2,3-9,4)	291
	Lager secundair	7,3	(4,3-10,3)	6,4	(4,2-9,8)	594
	Hoger secundair	8,3	(5,4-11,2)	7,5	(5,1-11,0)	1059
	Hoger onderwijs	5,1	(3,0-7,2)	4,4	(3,0-6,6)	1557
JAAR	**1997**	4,6	(3,4-5,7)	4,4	(3,4-5,7)	3000
	2001	5,9	(4,9-6,9)	5,3	(4,5-6,3)	4142
	2004	5,4	(4,5-6,3)	4,8	(4,0-5,8)	4227
	2008	6,0	(5,0-7,0)	5,4	(4,5-6,4)	3388
	2013	4,8	(3,7-5,9)	4,2	(3,3-5,3)	3589
	2018	6,5	(5,1-7,9)	5,7	(4,5-7,3)	3600

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B344 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met leverlijden in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA17_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,7	(0,2-1,2)	0,6	(0,3-1,1)	1736
	Vrouwen	0,8	(0,3-1,3)	0,7	(0,4-1,4)	1865
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	449
	25 - 34	0,4	(0,0-1,1)	0,4	(0,0-2,6)	439
	35 - 44	0,2	(0,0-0,5)	0,2	(0,0-0,9)	528
	45 - 54	0,7	(0,0-1,5)	0,7	(0,2-2,2)	647
	55 - 64	2,2	(0,7-3,7)	2,1	(1,1-4,3)	638
	65 - 74	1,1	(0,1-2,1)	1,1	(0,4-2,8)	479
	75 +	0,9	(0,0-1,7)	0,8	(0,3-2,3)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	0,5	(0,0-1,4)	0,3	(0,0-2,1)	291
	Lager secundair	1,1	(0,1-2,1)	0,8	(0,3-2,0)	595
	Hoger secundair	0,6	(0,2-1,1)	0,5	(0,2-1,0)	1059
	Hoger onderwijs	0,8	(0,2-1,4)	0,8	(0,4-1,6)	1557
JAAR	**2001**	1,1	(0,6-1,6)	1,2	(0,7-1,9)	4135
	2004	1,2	(0,7-1,6)	1,1	(0,7-1,6)	4231
	2008	0,7	(0,3-1,0)	0,7	(0,4-1,1)	3399
	2013	0,4	(0,2-0,6)	0,4	(0,2-0,7)	3590
	2018	0,8	(0,4-1,1)	0,8	(0,5-1,2)	3601

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B345 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met kanker in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA18_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	2,0	(1,2-2,8)	1,1	(0,7-1,9)	1736
	Vrouwen	2,9	(1,9-3,9)	1,5	(0,9-2,4)	1865
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,3	(0,0-1,0)	0,3	(0,0-2,4)	449
	25 - 34	0,1	(0,0-0,3)	0,1	(0,0-0,7)	439
	35 - 44	0,8	(0,1-1,6)	0,8	(0,4-2,0)	528
	45 - 54	2,0	(0,6-3,5)	2,0	(1,0-4,0)	647
	55 - 64	3,9	(1,8-5,9)	3,8	(2,3-6,4)	638
	65 - 74	5,5	(3,0-8,1)	5,4	(3,4-8,5)	479
	75 +	6,7	(3,1-10,3)	6,5	(3,6-11,2)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	6,7	(2,6-10,7)	2,0	(0,9-4,5)	291
	Lager secundair	2,0	(0,3-3,7)	0,8	(0,3-2,0)	595
	Hoger secundair	2,0	(1,1-2,9)	1,2	(0,6-2,2)	1059
	Hoger onderwijs	2,3	(1,4-3,3)	1,4	(0,9-2,3)	1557
JAAR	**1997**	1,3	(0,7-1,8)	1,0	(0,6-1,5)	2998
	2001	2,0	(1,4-2,6)	1,3	(0,9-1,8)	4138
	2004	1,0	(0,6-1,3)	0,7	(0,4-1,0)	4217
	2008	2,0	(1,4-2,5)	1,2	(0,9-1,7)	3399
	2013	1,8	(1,2-2,4)	1,1	(0,8-1,6)	3589
	2018	2,5	(1,8-3,1)	1,5	(1,1-2,0)	3601

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B346 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ernstige hoofdpijn zoals migraine in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA19_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	6,8	(4,8-8,8)	6,3	(4,7-8,6)	1736
	Vrouwen	10,9	(8,8-13,0)	10,6	(8,8-12,7)	1864
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	8,7	(4,2-13,2)	8,6	(4,9-14,5)	449
	25 - 34	11,2	(7,2-15,1)	11,0	(7,6-15,8)	439
	35 - 44	13,4	(8,5-18,4)	13,3	(9,1-18,8)	528
	45 - 54	9,5	(6,7-12,4)	9,2	(6,8-12,4)	646
	55 - 64	6,2	(3,6-8,8)	6,0	(3,9-9,1)	638
	65 - 74	6,3	(2,5-10,2)	6,1	(3,2-11,2)	479
	75 +	5,5	(3,0-7,9)	5,0	(3,1-7,8)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	8,9	(4,7-13,1)	10,9	(6,7-17,1)	291
	Lager secundair	7,1	(4,2-10,0)	7,0	(4,6-10,6)	595
	Hoger secundair	12,4	(9,1-15,6)	11,3	(8,6-14,9)	1059
	Hoger onderwijs	7,4	(5,2-9,5)	6,2	(4,6-8,5)	1556
JAAR	**1997**	15,9	(14,1-17,8)	14,1	(12,4-16,0)	2997
	2001	13,4	(12,0-14,8)	12,0	(10,7-13,3)	4136
	2004	12,7	(11,1-14,3)	11,3	(9,8-12,9)	4232
	2008	9,5	(8,3-10,8)	8,4	(7,4-9,7)	3373
	2013	8,9	(7,4-10,4)	8,0	(6,7-9,5)	3590
	2018	8,9	(7,4-10,4)	8,1	(6,7-9,6)	3600

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B347 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met urinaire incontinentie in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA20_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	2,9	(1,7-4,2)	2,3	(1,5-3,7)	1736
	Vrouwen	6,0	(4,6-7,5)	4,2	(2,8-6,1)	1865
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	1,0	(0,0-2,5)	1,0	(0,2-4,0)	449
	25 - 34	2,7	(0,0-5,6)	2,7	(0,9-7,8)	439
	35 - 44	2,1	(0,5-3,8)	2,1	(1,0-4,4)	528
	45 - 54	3,1	(1,2-5,1)	3,0	(1,6-5,5)	647
	55 - 64	2,5	(1,0-4,1)	2,4	(1,3-4,4)	638
	65 - 74	6,9	(3,7-10,1)	6,6	(4,1-10,3)	479
	75 +	19,4	(14,1-24,6)	17,9	(13,1-24,0)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	11,8	(6,1-17,5)	4,1	(2,2-7,8)	291
	Lager secundair	7,6	(3,8-11,3)	4,2	(2,1-8,2)	595
	Hoger secundair	3,9	(2,3-5,5)	3,3	(2,0-5,4)	1059
	Hoger onderwijs	2,4	(1,5-3,4)	2,1	(1,4-3,3)	1557
JAAR	**2008**	3,3	(2,6-3,9)	2,1	(1,6-2,8)	3382
	2013	3,3	(2,4-4,2)	2,1	(1,6-2,9)	3590
	2018	4,5	(3,5-5,5)	2,9	(2,1-4,1)	3601

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B348 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met depressie in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA21_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	5,7	(3,9-7,6)	5,3	(3,8-7,5)	1735
	Vrouwen	10,9	(9,0-12,8)	10,3	(8,5-12,4)	1864
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	3,7	(0,9-6,5)	3,6	(1,6-7,7)	449
	25 - 34	7,7	(3,2-12,1)	7,4	(4,0-13,3)	439
	35 - 44	10,2	(6,8-13,5)	9,9	(7,0-13,8)	528
	45 - 54	12,4	(8,9-15,9)	11,9	(8,9-15,7)	646
	55 - 64	10,2	(6,9-13,6)	9,7	(6,9-13,6)	637
	65 - 74	5,7	(2,8-8,6)	5,3	(3,2-8,8)	479
	75 +	6,9	(3,6-10,3)	6,1	(3,8-9,8)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	12,5	(6,9-18,1)	13,8	(8,4-21,7)	291
	Lager secundair	9,8	(6,1-13,6)	9,1	(5,9-13,7)	595
	Hoger secundair	9,2	(6,4-11,9)	8,2	(5,7-11,6)	1058
	Hoger onderwijs	6,2	(4,6-7,9)	5,2	(3,9-6,9)	1556
JAAR	**1997**	8,3	(6,9-9,7)	7,7	(6,5-9,2)	3000
	2001	8,0	(6,8-9,1)	7,2	(6,2-8,4)	4136
	2004	7,5	(6,3-8,6)	6,7	(5,7-7,9)	4227
	2008	7,4	(6,3-8,6)	6,7	(5,7-7,8)	3374
	2013	7,6	(6,3-9,0)	6,9	(5,7-8,2)	3590
	2018	8,4	(7,0-9,7)	7,6	(6,3-9,0)	3599

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B349 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met schildklierlijden in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA22_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	5,3	(3,4-7,2)	5,2	(3,5-7,6)	1735
	Vrouwen	16,2	(13,9-18,6)	15,5	(13,3-18,1)	1863
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	5,9	(1,7-10,2)	5,3	(2,4-11,2)	448
	25 - 34	7,2	(3,4-11,1)	6,4	(3,5-11,4)	439
	35 - 44	9,7	(6,4-13,1)	8,8	(6,0-12,7)	526
	45 - 54	11,3	(7,7-14,8)	9,9	(7,1-13,6)	647
	55 - 64	12,0	(8,6-15,5)	10,5	(7,7-14,3)	638
	65 - 74	16,8	(11,7-21,8)	14,8	(10,5-20,5)	479
	75 +	16,8	(11,7-21,9)	13,5	(9,5-18,8)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	14,5	(8,6-20,3)	9,9	(5,7-16,8)	291
	Lager secundair	10,8	(6,1-15,4)	8,2	(4,6-14,3)	594
	Hoger secundair	10,7	(8,1-13,2)	9,7	(7,4-12,5)	1058
	Hoger onderwijs	10,2	(8,0-12,5)	9,0	(6,9-11,7)	1556
JAAR	**1997**	4,4	(3,1-5,7)	3,6	(2,6-4,9)	2999
	2001	6,5	(5,4-7,7)	5,0	(4,2-6,0)	4139
	2004	7,5	(6,4-8,5)	5,7	(4,9-6,7)	4234
	2008	6,5	(5,5-7,6)	5,0	(4,2-6,0)	3387
	2013	8,8	(7,5-10,1)	6,8	(5,8-8,0)	3588
	2018	10,9	(9,4-12,5)	8,5	(7,1-10,2)	3598

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B350 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met cataract in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA2301_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	2,4	(1,3-3,4)	1,0	(0,5-2,1)	1736
	Vrouwen	4,2	(2,8-5,6)	1,4	(0,7-2,9)	1865
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	449
	25 - 34	0,0	.	.	.	439
	35 - 44	0,0	.	.	.	528
	45 - 54	0,7	(0,0-1,5)	0,6	(0,2-2,1)	647
	55 - 64	3,6	(0,7-6,4)	3,5	(1,6-7,5)	638
	65 - 74	9,4	(5,0-13,9)	9,3	(5,6-15,0)	479
	75 +	15,6	(10,6-20,7)	15,0	(10,8-20,4)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	6,4	(2,7-10,2)	0,7	(0,3-1,8)	291
	Lager secundair	4,2	(1,8-6,6)	0,9	(0,4-2,0)	595
	Hoger secundair	2,1	(0,6-3,6)	0,8	(0,3-1,9)	1059
	Hoger onderwijs	3,2	(1,8-4,6)	1,7	(0,8-3,5)	1557
JAAR	**1997**	1,6	(0,8-2,4)	0,8	(0,5-1,2)	3000
	2001	2,5	(1,8-3,1)	0,9	(0,6-1,3)	4135
	2004	3,2	(2,5-3,9)	1,2	(0,8-1,6)	4223
	2008	2,8	(2,2-3,4)	0,9	(0,6-1,3)	3382
	2013	2,5	(1,8-3,3)	0,8	(0,5-1,2)	3590
	2018	3,3	(2,4-4,2)	1,1	(0,7-1,7)	3601

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B351 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met glaucoom in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA2302_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,0	(0,4-1,7)	0,8	(0,4-1,8)	1736
	Vrouwen	1,5	(0,7-2,3)	1,0	(0,5-2,0)	1865
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	449
	25 - 34	0,0	.	.	.	439
	35 - 44	0,0	.	.	.	528
	45 - 54	2,1	(0,4-3,8)	2,1	(0,9-4,7)	647
	55 - 64	1,3	(0,2-2,4)	1,3	(0,6-3,0)	638
	65 - 74	2,1	(0,6-3,5)	2,0	(1,0-4,2)	479
	75 +	4,8	(1,5-8,1)	4,7	(2,4-8,9)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	1,0	(0,0-2,2)	0,3	(0,1-1,0)	291
	Lager secundair	1,6	(0,1-3,2)	0,7	(0,3-1,8)	595
	Hoger secundair	1,1	(0,4-1,8)	0,7	(0,3-1,5)	1059
	Hoger onderwijs	1,4	(0,5-2,2)	1,2	(0,5-2,8)	1557
JAAR	**1997**	1,6	(0,8-2,4)	1,3	(0,8-2,2)	2999
	2001	3,1	(2,4-3,7)	2,2	(1,6-3,1)	4132
	2004	2,4	(1,8-3,0)	1,7	(1,2-2,3)	4220
	2008	1,8	(1,3-2,2)	1,2	(0,9-1,7)	3386
	2013	1,0	(0,6-1,5)	0,7	(0,4-1,1)	3590
	2018	1,3	(0,8-1,8)	0,9	(0,6-1,5)	3601

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B352 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met maculadegeneratie in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA2303_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,5	(0,2-0,8)	0,3	(0,2-0,7)	1736
	Vrouwen	0,6	(0,2-1,1)	0,4	(0,1-0,9)	1865
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	449
	25 - 34	0,0	.	.	.	439
	35 - 44	0,4	(0,0-1,3)	0,4	(0,1-3,0)	528
	45 - 54	0,1	(0,0-0,2)	0,1	(0,0-0,5)	647
	55 - 64	0,1	(0,0-0,2)	0,1	(0,0-0,3)	638
	65 - 74	1,1	(0,0-2,3)	1,1	(0,3-3,4)	479
	75 +	3,6	(1,5-5,7)	3,6	(1,9-6,5)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	1,2	(0,0-2,5)	0,0	(0,0-0,1)	291
	Lager secundair	0,7	(0,0-1,5)	0,0	(0,0-0,1)	595
	Hoger secundair	0,3	(0,0-0,6)	0,0	(0,0-0,1)	1059
	Hoger onderwijs	0,5	(0,0-0,9)	0,1	(0,0-0,2)	1557
JAAR	**2013**	0,9	(0,5-1,4)	0,6	(0,3-1,0)	3590
	2018	0,6	(0,3-0,9)	0,4	(0,2-0,9)	3601

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B353 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met diabetische retinopathie in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA2304_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,1	(0,0-0,2)	0,2	(0,0-0,8)	1736
	Vrouwen	0,5	(0,0-1,3)	0,6	(0,3-1,4)	1865
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	449
	25 - 34	0,0	.	.	.	439
	35 - 44	0,0	.	.	.	528
	45 - 54	0,0	.	.	.	647
	55 - 64	1,3	(0,0-3,7)	1,1	(0,2-5,5)	638
	65 - 74	0,3	(0,0-0,8)	0,2	(0,0-1,9)	479
	75 +	0,5	(0,0-1,5)	0,4	(0,1-2,6)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	0,0	.	.	.	291
	Lager secundair	0,2	(0,0-0,6)	0,1	(0,0-1,3)	595
	Hoger secundair	0,8	(0,0-2,2)	0,7	(0,3-1,6)	1059
	Hoger onderwijs	0,0	.	.	.	1557
JAAR	**2013**	0,1	(0,0-0,2)	0,2	(0,1-0,5)	3590
	2018	0,3	(0,0-0,7)	0,4	(0,2-1,0)	3601

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B354 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ziekte van Parkinson in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA24_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,3	(0,0-0,6)	0,2	(0,1-0,5)	1736
	Vrouwen	0,5	(0,2-0,8)	0,3	(0,1-0,6)	1865
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	449
	25 - 34	0,0	.	.	.	439
	35 - 44	0,0	.	.	.	528
	45 - 54	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,1)	647
	55 - 64	0,2	(0,0-0,5)	0,2	(0,1-0,7)	638
	65 - 74	1,1	(0,0-2,2)	1,0	(0,4-2,9)	479
	75 +	2,2	(0,4-4,0)	2,2	(0,9-5,2)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	1,8	(0,0-3,9)	0,1	(0,0-0,2)	291
	Lager secundair	1,2	(0,3-2,1)	0,1	(0,0-0,1)	595
	Hoger secundair	0,1	(0,0-0,2)	0,0	(0,0-0,0)	1059
	Hoger onderwijs	0,1	(0,0-0,2)	0,0	(0,0-0,1)	1557
JAAR	**1997**	0,3	(0,1-0,5)	0,3	(0,2-0,6)	3000
	2001	0,2	(0,1-0,4)	0,4	(0,1-1,0)	4133
	2004	0,3	(0,2-0,4)	0,4	(0,2-0,9)	4225
	2008	0,2	(0,1-0,4)	0,2	(0,1-0,4)	3399
	2013	0,3	(0,1-0,6)	0,3	(0,2-0,6)	3590
	2018	0,4	(0,2-0,6)	0,4	(0,2-0,8)	3601

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B355 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met epilepsie in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA25_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,3	(0,6-2,1)	1,2	(0,7-2,2)	1736
	Vrouwen	0,8	(0,3-1,3)	0,7	(0,3-1,3)	1865
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,6	(0,0-1,4)	0,5	(0,1-2,1)	449
	25 - 34	0,9	(0,0-2,3)	0,9	(0,2-3,8)	439
	35 - 44	1,8	(0,3-3,3)	1,7	(0,7-4,1)	528
	45 - 54	0,7	(0,0-1,4)	0,7	(0,2-1,9)	647
	55 - 64	1,3	(0,1-2,5)	1,2	(0,5-3,1)	638
	65 - 74	0,5	(0,0-1,2)	0,5	(0,1-2,1)	479
	75 +	1,7	(0,0-3,4)	1,7	(0,6-4,7)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	4,9	(0,7-9,0)	4,8	(1,7-12,7)	291
	Lager secundair	1,0	(0,0-2,0)	0,9	(0,3-2,5)	595
	Hoger secundair	1,0	(0,3-1,7)	0,8	(0,4-1,8)	1059
	Hoger onderwijs	0,4	(0,0-0,7)	0,3	(0,1-0,8)	1557
JAAR	**1997**	0,7	(0,4-1,0)	0,7	(0,4-1,1)	2999
	2001	0,7	(0,4-0,9)	0,6	(0,4-1,0)	4136
	2004	0,9	(0,5-1,2)	0,8	(0,5-1,3)	4225
	2008	0,8	(0,4-1,2)	0,8	(0,5-1,2)	3402
	2013	0,8	(0,3-1,3)	0,8	(0,4-1,5)	3590
	2018	1,0	(0,6-1,5)	1,0	(0,7-1,6)	3601

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B356 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met langdurige vermoeidheid in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA26_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	7,3	(5,3-9,2)	6,9	(5,2-9,2)	1734
	Vrouwen	10,1	(7,9-12,2)	9,5	(7,6-11,9)	1864
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	3,7	(0,8-6,6)	3,7	(1,7-8,1)	448
	25 - 34	7,7	(3,7-11,7)	7,7	(4,5-12,8)	439
	35 - 44	11,3	(6,6-16,0)	11,3	(7,4-16,8)	528
	45 - 54	11,8	(8,1-15,4)	11,6	(8,5-15,6)	646
	55 - 64	10,1	(6,7-13,5)	9,9	(7,1-13,8)	637
	65 - 74	6,2	(3,4-9,0)	6,1	(3,8-9,5)	479
	75 +	9,2	(5,1-13,3)	8,8	(5,6-13,6)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	10,4	(4,9-15,9)	10,3	(5,9-17,2)	291
	Lager secundair	9,7	(5,9-13,5)	9,1	(6,0-13,7)	595
	Hoger secundair	10,0	(7,1-13,0)	9,6	(6,9-13,2)	1058
	Hoger onderwijs	6,9	(4,9-9,0)	6,3	(4,7-8,4)	1555
JAAR	**2001**	7,2	(6,1-8,4)	6,6	(5,6-7,8)	4135
	2004	6,5	(5,4-7,5)	5,8	(4,9-6,9)	4231
	2008	4,1	(3,2-4,9)	3,6	(2,9-4,5)	3383
	2013	4,8	(3,9-5,8)	4,3	(3,5-5,3)	3589
	2018	8,7	(7,2-10,2)	8,0	(6,5-9,6)	3598

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B357 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met osteoporose in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA27_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,5	(0,1-0,9)	0,1	(0,1-0,3)	1736
	Vrouwen	4,8	(3,4-6,1)	1,2	(0,8-2,0)	1863
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	449
	25 - 34	0,0	(0,0-0,1)	0,0	(0,0-0,1)	439
	35 - 44	0,0	(0,0-0,1)	0,0	(0,0-0,1)	528
	45 - 54	1,1	(0,0-2,3)	0,7	(0,2-2,4)	647
	55 - 64	5,7	(2,9-8,6)	3,6	(2,0-6,4)	637
	65 - 74	8,0	(4,6-11,5)	5,1	(3,1-8,2)	479
	75 +	6,8	(4,0-9,6)	3,7	(2,1-6,3)	420
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	4,3	(1,0-7,6)	0,3	(0,1-0,9)	290
	Lager secundair	2,3	(1,0-3,7)	0,2	(0,1-0,5)	595
	Hoger secundair	2,9	(1,4-4,4)	0,5	(0,3-0,9)	1058
	Hoger onderwijs	2,2	(1,3-3,2)	0,5	(0,2-1,0)	1557
JAAR	**1997**	3,3	(2,5-4,1)	1,4	(1,0-2,1)	3000
	2001	5,1	(4,1-6,1)	1,8	(1,3-2,6)	4142
	2004	4,9	(4,1-5,6)	1,7	(1,3-2,3)	4212
	2008	4,8	(4,0-5,7)	1,7	(1,2-2,3)	3369
	2013	4,6	(3,7-5,6)	1,5	(1,1-2,1)	3584
	2018	2,7	(2,0-3,4)	0,8	(0,6-1,2)	3599

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B358 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met gebroken heup in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA28_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,7	(0,0-1,5)	0,4	(0,1-1,1)	1736
	Vrouwen	0,8	(0,3-1,3)	0,4	(0,2-1,0)	1865
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	449
	25 - 34	0,0	.	.	.	439
	35 - 44	0,1	(0,0-0,4)	0,1	(0,0-1,0)	528
	45 - 54	0,1	(0,0-0,2)	0,1	(0,0-0,5)	647
	55 - 64	0,3	(0,0-0,6)	0,3	(0,1-0,8)	638
	65 - 74	3,3	(0,0-6,9)	3,3	(1,1-9,5)	479
	75 +	2,7	(0,4-5,1)	2,8	(1,2-6,4)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	3,2	(0,1-6,4)	0,7	(0,2-2,2)	291
	Lager secundair	0,4	(0,0-0,9)	0,1	(0,0-0,5)	595
	Hoger secundair	0,3	(0,0-0,6)	0,1	(0,0-0,6)	1059
	Hoger onderwijs	0,7	(0,0-1,6)	0,6	(0,2-1,4)	1557
JAAR	**2001**	0,7	(0,4-1,0)	0,6	(0,3-0,9)	4141
	2004	0,5	(0,3-0,8)	0,4	(0,2-0,8)	4231
	2008	0,6	(0,4-0,9)	0,4	(0,2-0,7)	3397
	2013	0,6	(0,3-1,0)	0,4	(0,3-0,8)	3590
	2018	0,7	(0,2-1,2)	0,5	(0,3-1,0)	3601

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B359 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met darmziekte, langer dan 3 maanden in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA29_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	2,3	(1,3-3,3)	2,0	(1,3-3,0)	1736
	Vrouwen	5,6	(4,1-7,1)	4,6	(3,4-6,1)	1864
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	4,3	(1,1-7,6)	4,1	(1,9-8,9)	449
	25 - 34	0,6	(0,0-1,1)	0,5	(0,2-1,4)	439
	35 - 44	4,1	(1,9-6,3)	3,8	(2,2-6,7)	528
	45 - 54	3,1	(1,1-5,0)	2,8	(1,5-5,2)	646
	55 - 64	6,2	(3,0-9,4)	5,7	(3,5-9,3)	638
	65 - 74	3,7	(1,7-5,7)	3,4	(2,0-5,7)	479
	75 +	7,0	(3,5-10,4)	5,9	(3,5-9,9)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	9,1	(4,2-13,9)	5,7	(3,0-10,6)	291
	Lager secundair	3,0	(1,1-4,8)	2,2	(1,1-4,3)	595
	Hoger secundair	4,2	(2,4-5,9)	3,3	(2,1-5,2)	1059
	Hoger onderwijs	3,1	(1,8-4,4)	2,5	(1,7-3,6)	1556
JAAR	**1997**	3,5	(2,7-4,4)	3,5	(2,7-4,5)	3000
	2001	4,0	(3,2-4,8)	3,6	(3,0-4,5)	4135
	2004	3,8	(3,0-4,7)	3,5	(2,8-4,4)	4230
	2008	3,2	(2,5-3,9)	2,9	(2,3-3,6)	3402
	2013	2,7	(2,0-3,4)	2,4	(1,8-3,2)	3590
	2018	4,0	(3,1-5,0)	3,6	(2,8-4,6)	3600

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B360 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met nierstenen in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA30_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,3	(0,6-2,1)	1,1	(0,6-2,0)	1736
	Vrouwen	1,1	(0,5-1,8)	0,9	(0,5-1,8)	1865
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,2	(0,0-0,7)	0,2	(0,0-1,6)	449
	25 - 34	0,8	(0,0-1,9)	0,8	(0,2-3,1)	439
	35 - 44	1,4	(0,0-2,8)	1,4	(0,5-3,7)	528
	45 - 54	2,6	(0,6-4,6)	2,6	(1,2-5,5)	647
	55 - 64	1,2	(0,1-2,2)	1,2	(0,5-2,9)	638
	65 - 74	1,0	(0,0-2,3)	1,0	(0,3-3,3)	479
	75 +	1,2	(0,0-2,5)	1,2	(0,4-3,4)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	1,4	(0,0-3,6)	1,1	(0,2-7,8)	291
	Lager secundair	0,3	(0,0-0,6)	0,2	(0,1-0,8)	595
	Hoger secundair	1,1	(0,4-1,8)	1,0	(0,4-2,0)	1059
	Hoger onderwijs	1,4	(0,6-2,2)	1,2	(0,7-2,2)	1557
JAAR	**1997**	0,8	(0,3-1,2)	0,7	(0,4-1,3)	3000
	2001	0,8	(0,5-1,1)	0,7	(0,5-1,0)	4134
	2004	1,0	(0,6-1,4)	0,9	(0,6-1,3)	4231
	2008	0,7	(0,3-1,0)	0,6	(0,4-1,0)	3396
	2013	0,6	(0,3-0,9)	0,5	(0,3-0,9)	3590
	2018	1,2	(0,7-1,7)	1,1	(0,7-1,6)	3601

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B361 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ernstige nierziekte behalve nierstenen in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA31_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,6	(0,2-1,0)	0,4	(0,2-0,9)	1736
	Vrouwen	2,2	(1,3-3,0)	1,6	(1,0-2,7)	1865
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	449
	25 - 34	1,9	(0,4-3,4)	1,6	(0,7-3,6)	439
	35 - 44	1,3	(0,2-2,4)	1,1	(0,4-2,7)	528
	45 - 54	2,8	(1,0-4,6)	2,3	(1,3-4,2)	647
	55 - 64	0,1	(0,0-0,4)	0,1	(0,0-0,6)	638
	65 - 74	2,5	(0,6-4,5)	2,0	(0,9-4,5)	479
	75 +	1,6	(0,2-2,9)	1,1	(0,4-2,8)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	3,4	(0,9-5,9)	2,4	(1,0-5,6)	291
	Lager secundair	1,3	(0,0-2,6)	0,7	(0,2-2,0)	595
	Hoger secundair	1,3	(0,5-2,2)	0,8	(0,4-1,6)	1059
	Hoger onderwijs	1,3	(0,6-2,0)	0,8	(0,4-1,4)	1557
JAAR	**1997**	0,7	(0,4-1,1)	0,7	(0,4-1,1)	3000
	2001	1,0	(0,5-1,4)	0,9	(0,6-1,3)	4134
	2004	0,6	(0,3-0,9)	0,5	(0,3-0,8)	4235
	2008	0,8	(0,5-1,2)	0,7	(0,5-1,2)	3400
	2013	0,7	(0,3-1,1)	0,6	(0,3-1,1)	3589
	2018	1,4	(0,9-1,9)	1,3	(0,9-1,9)	3601

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B362 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met chronische blaasontsteking in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA32_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,7	(0,3-1,1)	0,7	(0,4-1,3)	1736
	Vrouwen	2,8	(1,7-3,8)	2,4	(1,6-3,6)	1865
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	1,6	(0,0-3,2)	1,4	(0,5-3,6)	449
	25 - 34	1,7	(0,2-3,2)	1,5	(0,6-3,5)	439
	35 - 44	1,1	(0,0-2,3)	1,0	(0,3-2,7)	528
	45 - 54	1,8	(0,4-3,1)	1,5	(0,7-3,1)	647
	55 - 64	1,0	(0,1-2,0)	0,8	(0,3-2,1)	638
	65 - 74	1,0	(0,0-2,0)	0,8	(0,2-2,6)	479
	75 +	5,5	(2,3-8,7)	4,1	(2,1-7,7)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	1,3	(0,1-2,5)	0,5	(0,2-1,3)	291
	Lager secundair	2,2	(0,4-3,9)	1,2	(0,5-2,6)	595
	Hoger secundair	2,1	(0,9-3,3)	1,6	(0,9-2,9)	1059
	Hoger onderwijs	1,0	(0,4-1,6)	0,8	(0,4-1,5)	1557
JAAR	**1997**	2,5	(1,7-3,3)	2,3	(1,7-3,2)	3000
	2001	2,4	(1,8-3,0)	2,0	(1,6-2,6)	4135
	2004	3,0	(2,4-3,7)	2,6	(2,1-3,3)	4228
	2008	1,5	(1,1-2,0)	1,3	(0,9-1,8)	3397
	2013	2,0	(1,3-2,6)	1,7	(1,2-2,3)	3590
	2018	1,8	(1,2-2,4)	1,5	(1,1-2,1)	3601

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B363 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met ernstige of chronische huidaandoening in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA33_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	2,8	(1,8-3,8)	2,7	(1,9-3,9)	1736
	Vrouwen	4,3	(2,6-6,0)	4,3	(2,9-6,3)	1864
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	3,2	(0,9-5,6)	3,2	(1,5-6,6)	449
	25 - 34	4,0	(0,1-7,8)	3,9	(1,5-9,9)	439
	35 - 44	4,3	(1,8-6,7)	4,2	(2,3-7,5)	528
	45 - 54	2,6	(1,2-3,9)	2,5	(1,5-4,2)	646
	55 - 64	3,6	(0,8-6,5)	3,5	(1,6-7,4)	638
	65 - 74	4,1	(1,9-6,3)	4,0	(2,3-6,7)	479
	75 +	3,4	(0,8-6,0)	3,1	(1,4-6,7)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	3,1	(0,6-5,5)	2,8	(1,2-6,5)	291
	Lager secundair	2,1	(0,4-3,8)	1,9	(0,8-4,5)	595
	Hoger secundair	4,4	(2,3-6,4)	4,3	(2,7-6,7)	1059
	Hoger onderwijs	3,7	(2,1-5,4)	3,6	(2,4-5,3)	1556
JAAR	**1997**	4,1	(3,1-5,2)	4,2	(3,2-5,4)	2998
	2001	3,5	(2,9-4,2)	3,5	(2,9-4,2)	4131
	2004	4,0	(3,1-4,9)	3,9	(3,2-4,9)	4229
	2008	3,0	(2,3-3,7)	2,9	(2,3-3,7)	3400
	2013	2,5	(1,8-3,2)	2,5	(1,9-3,3)	3590
	2018	3,6	(2,6-4,6)	3,5	(2,6-4,6)	3600

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B364 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met galstenen of galblaasontsteking in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA34_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,6	(0,1-1,1)	0,5	(0,2-1,1)	1736
	Vrouwen	1,0	(0,5-1,4)	0,9	(0,5-1,6)	1865
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,0	.	.	.	449
	25 - 34	0,4	(0,0-0,9)	0,4	(0,1-1,4)	439
	35 - 44	0,8	(0,0-2,1)	0,8	(0,2-3,5)	528
	45 - 54	1,5	(0,4-2,5)	1,4	(0,7-2,9)	647
	55 - 64	0,3	(0,0-0,6)	0,2	(0,1-0,9)	638
	65 - 74	1,3	(0,0-2,6)	1,2	(0,4-3,5)	479
	75 +	1,4	(0,1-2,8)	1,3	(0,5-3,3)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	1,1	(0,0-3,4)	0,8	(0,1-9,4)	291
	Lager secundair	0,9	(0,0-1,9)	0,7	(0,2-1,8)	595
	Hoger secundair	0,8	(0,3-1,4)	0,7	(0,4-1,3)	1059
	Hoger onderwijs	0,7	(0,2-1,1)	0,7	(0,3-1,5)	1557
JAAR	**1997**	0,7	(0,4-1,1)	0,7	(0,5-1,1)	3000
	2001	0,9	(0,6-1,2)	0,8	(0,5-1,3)	4142
	2004	1,5	(1,0-2,0)	1,3	(0,9-1,8)	4229
	2008	0,6	(0,3-0,9)	0,5	(0,3-0,8)	3394
	2013	0,7	(0,3-1,2)	0,6	(0,3-1,1)	3589
	2018	0,8	(0,4-1,1)	0,7	(0,4-1,1)	3601

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B365 Percentage van de mannelijke bevolking van 15 jaar en ouder met prostaatklachten in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA35_1		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
LEEFTIJDSGROEP						
	15 - 24	0,0	.	.	.	218
	25 - 34	0,0	.	.	.	207
	35 - 44	1,7	(0,0-3,8)	1,7	(0,5-6,0)	260
	45 - 54	1,3	(0,0-2,8)	1,3	(0,4-4,1)	312
	55 - 64	3,8	(1,1-6,5)	3,8	(1,9-7,6)	325
	65 - 74	13,1	(6,8-19,4)	13,1	(8,0-20,7)	234
	75 +	28,5	(19,4-37,6)	28,5	(20,4-38,3)	176
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	8,8	(2,1-15,6)	1,3	(0,5-3,3)	131
	Lager secundair	6,4	(2,8-9,9)	2,1	(0,9-4,9)	275
	Hoger secundair	4,3	(2,3-6,4)	2,3	(1,2-4,2)	521
	Hoger onderwijs	3,7	(2,0-5,4)	2,1	(1,1-4,0)	758
JAAR	**2001**	4,6	(3,6-5,7)	2,2	(1,6-3,1)	1998
	2004	4,1	(3,1-5,1)	2,1	(1,5-3,1)	1910
	2008	3,9	(2,7-5,1)	1,8	(1,2-2,8)	1507
	2013	3,9	(2,8-5,0)	1,7	(1,2-2,5)	1722
	2018	4,7	(3,4-5,9)	2,1	(1,4-3,1)	1732

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B366 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met astma in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA01_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	4,5	(2,0-7,0)	4,4	(2,4-7,9)	412
	Vrouwen	8,6	(5,4-11,8)	8,6	(5,9-12,4)	488
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	7,6	(4,6-10,6)	7,4	(5,0-10,7)	479
	75 +	6,1	(3,1-9,1)	5,5	(3,2-9,4)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	12,6	(6,3-19,0)	12,9	(7,5-21,3)	177
	Lager secundair	3,3	(0,2-6,4)	2,9	(1,2-7,2)	214
	Hoger secundair	5,6	(1,7-9,5)	5,0	(2,3-10,5)	210
	Hoger onderwijs	7,1	(3,3-10,9)	6,4	(3,8-10,5)	264
JAAR	**2001**	8,8	(6,1-11,5)	8,8	(6,4-11,9)	894
	2004	7,8	(5,6-10,0)	7,7	(5,8-10,2)	1281
	2008	5,0	(3,3-6,8)	5,1	(3,6-7,2)	1013
	2013	4,3	(2,6-5,9)	4,3	(2,9-6,2)	854
	2018	6,9	(4,8-9,0)	6,9	(5,0-9,3)	900

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B367 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met chronisch longlijden in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA02_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	9,8	(6,1-13,6)	9,9	(6,7-14,4)	412
	Vrouwen	12,1	(8,0-16,2)	11,9	(8,5-16,4)	488
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	9,5	(6,1-12,8)	9,5	(6,6-13,3)	479
	75 +	13,1	(8,3-17,9)	12,9	(9,0-18,2)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	17,7	(10,0-25,3)	16,9	(10,7-25,8)	177
	Lager secundair	13,6	(6,5-20,7)	13,3	(7,9-21,6)	214
	Hoger secundair	8,5	(3,8-13,3)	8,6	(4,8-14,7)	210
	Hoger onderwijs	7,2	(3,3-11,2)	7,4	(4,2-12,7)	264
JAAR	**2001**	15,2	(12,4-18,0)	15,2	(12,6-18,3)	895
	2004	14,0	(11,2-16,8)	14,1	(11,5-17,1)	1282
	2008	9,4	(7,0-11,9)	9,3	(7,2-12,0)	1011
	2013	7,6	(5,5-9,8)	7,5	(5,6-9,9)	854
	2018	11,2	(8,3-14,0)	11,0	(8,5-14,2)	900

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B368 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hartinfarct in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA03_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	2,7	(0,6-4,7)	2,5	(1,1-5,8)	412
	Vrouwen	2,7	(1,0-4,4)	2,7	(1,4-5,1)	488
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	3,2	(1,2-5,1)	3,2	(1,7-5,7)	479
	75 +	2,1	(0,3-4,0)	2,1	(0,9-5,1)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	5,0	(0,7-9,3)	5,6	(2,4-12,7)	177
	Lager secundair	1,8	(0,0-3,9)	1,7	(0,5-5,7)	214
	Hoger secundair	2,4	(0,0-5,2)	2,2	(0,7-6,5)	210
	Hoger onderwijs	2,3	(0,3-4,3)	2,0	(0,8-4,9)	264
JAAR	**2008**	2,2	(1,1-3,2)	2,1	(1,3-3,4)	1009
	2013	4,7	(2,4-7,0)	4,6	(2,8-7,4)	853
	2018	2,7	(1,4-4,0)	2,6	(1,6-4,3)	900

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B369 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met coronaire hartziekte in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA04_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	5,1	(2,1-8,1)	5,2	(2,9-9,1)	412
	Vrouwen	3,7	(1,8-5,5)	3,6	(2,1-6,0)	488
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	3,6	(1,5-5,8)	3,5	(1,9-6,4)	479
	75 +	5,0	(2,5-7,5)	5,1	(3,1-8,3)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	7,9	(2,8-13,0)	7,4	(3,7-14,2)	177
	Lager secundair	3,0	(0,3-5,6)	2,9	(1,1-7,4)	214
	Hoger secundair	3,5	(0,5-6,5)	3,5	(1,5-8,3)	210
	Hoger onderwijs	2,8	(0,7-4,9)	2,9	(1,3-6,1)	264
JAAR	**2008**	6,6	(4,6-8,7)	6,2	(4,4-8,7)	1009
	2013	6,3	(4,0-8,7)	5,9	(4,1-8,6)	854
	2018	4,3	(2,6-5,9)	4,0	(2,7-6,0)	900

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B370 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ernstige hartziekte (uitgezonderd hartinfarct of coronaire hartziekte) in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA05_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	10,3	(5,1-15,4)	10,1	(6,2-16,1)	412
	Vrouwen	4,6	(2,5-6,7)	4,6	(2,9-7,2)	487
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	7,9	(3,8-12,0)	7,2	(4,4-11,6)	479
	75 +	6,0	(3,4-8,6)	5,9	(3,8-9,2)	420
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	8,0	(2,8-13,1)	8,2	(4,2-15,3)	177
	Lager secundair	6,0	(2,4-9,7)	6,0	(3,2-11,0)	214
	Hoger secundair	7,9	(3,4-12,4)	7,1	(4,0-12,6)	210
	Hoger onderwijs	6,7	(0,5-13,0)	5,8	(2,6-12,5)	263
JAAR	**2013**	5,3	(3,5-7,0)	4,9	(3,5-6,8)	854
	2018	7,0	(4,5-9,5)	6,5	(4,5-9,4)	899

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B371 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoge bloeddruk in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA06_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	34,0	(27,8-40,1)	34,0	(28,1-40,5)	412
	Vrouwen	42,0	(36,0-48,0)	42,0	(36,2-48,0)	487
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	37,7	(32,0-43,5)	37,9	(32,3-43,8)	479
	75 +	39,6	(32,5-46,8)	39,0	(32,2-46,2)	420
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	35,1	(24,5-45,7)	34,1	(24,5-45,2)	177
	Lager secundair	41,0	(30,8-51,1)	40,1	(30,8-50,2)	213
	Hoger secundair	35,2	(26,8-43,6)	35,3	(27,4-44,0)	210
	Hoger onderwijs	41,0	(33,0-49,1)	41,7	(33,7-50,0)	264
JAAR	**1997**	34,5	(28,0-40,9)	34,4	(28,4-41,0)	638
	2001	32,2	(27,8-36,6)	31,7	(27,6-36,1)	889
	2004	33,1	(29,4-36,8)	32,6	(29,0-36,4)	1281
	2008	38,7	(34,4-42,9)	38,0	(33,8-42,4)	1000
	2013	32,0	(27,8-36,2)	31,5	(27,5-35,8)	854
	2018	38,6	(34,1-43,1)	38,4	(34,0-43,0)	899

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B372 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoge bloeddruk dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet te hebben gevolgd, Waals Gewest

MA06_30		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	14,0	(7,1-21,0)	13,9	(8,3-22,5)	153
	Vrouwen	18,6	(11,3-26,0)	18,7	(12,4-27,1)	191
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	17,4	(10,2-24,7)	17,2	(11,2-25,6)	187
	75 +	16,4	(8,0-24,8)	15,7	(9,2-25,3)	157
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	10,4	(0,0-20,9)	9,4	(3,0-25,6)	67
	Lager secundair	14,6	(4,6-24,6)	13,2	(6,5-25,0)	76
	Hoger secundair	17,7	(3,4-32,0)	17,2	(7,4-35,0)	77
	Hoger onderwijs	23,0	(12,8-33,2)	23,3	(14,4-35,3)	107
JAAR	**2001**	23,8	(16,2-31,4)	23,2	(16,5-31,6)	251
	2008	27,5	(20,3-34,6)	26,9	(20,5-34,6)	247
	2013	20,0	(13,4-26,5)	19,7	(13,8-27,2)	269
	2018	16,9	(11,5-22,4)	16,7	(11,9-22,8)	344

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B373 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoge bloeddruk dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden geneesmiddelen te hebben genomen, Waals Gewest

MA06_40		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	96,1	(93,2-99,1)	96,1	(91,6-98,3)	153
	Vrouwen	90,9	(85,4-96,5)	90,9	(83,9-95,1)	191
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	93,3	(89,0-97,7)	93,9	(88,9-96,7)	187
	75 +	92,3	(86,2-98,5)	93,5	(85,9-97,2)	157
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	95,6	(89,5-100,0)	96,6	(86,4-99,2)	67
	Lager secundair	88,3	(77,0-99,5)	90,5	(77,6-96,3)	76
	Hoger secundair	97,0	(93,5-100,0)	97,3	(90,7-99,2)	77
	Hoger onderwijs	91,8	(86,1-97,5)	92,0	(84,5-96,0)	107
JAAR	**1997**	94,6	(89,7-99,5)	95,3	(89,0-98,1)	194
	2001	82,2	(74,9-89,6)	83,5	(75,5-89,3)	269
	2008	87,8	(82,5-93,1)	88,4	(82,0-92,8)	246
	2013	97,1	(94,9-99,3)	97,2	(94,1-98,7)	269
	2018	92,9	(89,2-96,5)	93,3	(89,0-96,0)	344

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B374 Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoge bloeddruk volgens de behandeling van de aandoening, Waals Gewest

MA06_50		Geen behandeling	Enkel dieet	Medicamenteuze behandeling	N
GESLACHT	**Mannen**	3,0	0,9	96,1	153
	Vrouwen	8,1	1,0	90,9	191
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	5,9	0,8	93,3	187
	75 +	6,5	1,2	92,3	157
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	4,4	0.0	95,6	67
	Lager secundair	10,2	1,5	88,3	76
	Hoger secundair	3,0	0.0	97,0	77
	Hoger onderwijs	6,5	1,7	91,8	107
JAAR	**2001**	11,2	0,3	88,5	256
	2008	11,9	0,3	87,8	246
	2013	2,9	0.0	97,1	269
	2018	6,2	1,0	92,9	344

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

Tabel B375 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder methoog cholesterolgehalte in het bloed in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA07_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	34,2	(27,5-41,0)	33,9	(27,6-40,9)	411
	Vrouwen	33,4	(27,6-39,1)	33,5	(28,0-39,5)	488
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	35,9	(29,9-41,8)	35,8	(30,2-41,9)	479
	75 +	31,3	(24,7-37,9)	31,3	(25,2-38,2)	420
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	33,1	(22,7-43,4)	34,2	(24,4-45,5)	177
	Lager secundair	30,1	(21,9-38,4)	30,4	(22,8-39,2)	214
	Hoger secundair	39,0	(30,5-47,6)	38,7	(30,7-47,4)	209
	Hoger onderwijs	32,4	(23,7-41,0)	31,6	(23,6-40,9)	264
JAAR	**2013**	31,6	(27,1-36,2)	31,7	(27,4-36,3)	853
	2018	33,7	(29,3-38,1)	33,6	(29,3-38,2)	899

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B376 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet te hebben gevolgd, Waals Gewest

MA07_30		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	19,6	(10,7-28,5)	19,2	(11,9-29,6)	131
	Vrouwen	24,9	(15,5-34,2)	24,9	(16,7-35,3)	158
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	23,8	(14,8-32,7)	23,9	(16,1-33,9)	170
	75 +	21,1	(9,9-32,3)	20,5	(11,8-33,2)	119
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	20,5	(2,3-38,7)	19,6	(7,6-42,0)	50
	Lager secundair	17,0	(3,4-30,6)	16,4	(7,2-33,3)	68
	Hoger secundair	17,0	(4,2-29,8)	16,9	(7,5-33,7)	70
	Hoger onderwijs	30,7	(17,1-44,4)	31,6	(19,4-47,0)	89
JAAR	**2013**	24,1	(16,7-31,6)	24,0	(17,4-32,2)	251
	2018	22,6	(15,7-29,5)	22,5	(16,3-30,2)	289

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B377 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed dat aangeeft hiervoor in de afgelopen 12 maanden geneesmiddelen te hebben genomen, Waals Gewest

MA07_40		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	80,6	(69,7-91,5)	80,7	(67,6-89,3)	131
	Vrouwen	71,2	(61,1-81,3)	71,2	(60,3-80,1)	158
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	75,4	(65,7-85,0)	75,3	(64,4-83,7)	170
	75 +	75,0	(63,3-86,7)	76,1	(62,8-85,7)	119
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	79,3	(62,5-96,1)	80,3	(60,3-91,6)	50
	Lager secundair	60,4	(42,5-78,2)	61,4	(42,9-77,2)	68
	Hoger secundair	77,3	(63,4-91,1)	77,9	(61,1-88,8)	70
	Hoger onderwijs	81,1	(69,7-92,6)	80,6	(66,6-89,7)	89
JAAR	**2013**	86,5	(81,4-91,6)	87,0	(81,0-91,2)	251
	2018	75,2	(67,8-82,6)	75,6	(67,4-82,3)	289

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B378 Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder met hoog cholesterolgehalte in het bloed volgens de behandeling van de aandoening, Waals Gewest

MA07_50		Geen behandeling	Enkel dieet	Medicamenteuze behandeling	N
GESLACHT	**Mannen**	17,8	1,6	80,6	131
	Vrouwen	24,7	4,1	71,2	158
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	22,1	2,5	75,4	170
	75 +	21,4	3,6	75,0	119
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	20,7	0.0	79,3	50
	Lager secundair	32,2	7,4	60,4	68
	Hoger secundair	22,7	0.0	77,3	70
	Hoger onderwijs	14,2	4,7	81,1	89
JAAR	**2013**	10,9	2,6	86,5	251
	2018	21,8	3,0	75,2	289

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

Tabel B379 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beroerte in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA08_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	3,2	(0,9-5,5)	2,9	(1,4-5,6)	412
	Vrouwen	2,4	(0,8-3,9)	1,9	(0,8-4,0)	488
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	1,3	(0,2-2,3)	1,2	(0,5-3,0)	479
	75 +	4,4	(1,9-6,9)	4,5	(2,5-7,7)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	6,6	(1,8-11,5)	4,9	(2,3-10,3)	177
	Lager secundair	3,0	(0,4-5,6)	2,7	(1,0-7,0)	214
	Hoger secundair	1,3	(0,0-3,2)	1,2	(0,3-4,8)	210
	Hoger onderwijs	1,3	(0,0-2,7)	1,2	(0,4-3,7)	264
JAAR	**1997**	5,3	(0,4-10,1)	5,2	(2,2-12,0)	638
	2001	3,0	(1,7-4,4)	2,6	(1,6-4,1)	893
	2004	3,0	(1,7-4,3)	2,5	(1,6-4,0)	1279
	2008	3,3	(2,0-4,6)	2,6	(1,7-4,0)	1009
	2013	3,9	(2,1-5,7)	3,1	(1,9-5,2)	854
	2018	2,7	(1,4-4,0)	2,3	(1,4-3,7)	900

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B380 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met vernauwing van de bloedvaten in de buik of de benen in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA09_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	4,4	(1,9-6,9)	4,4	(2,5-7,5)	411
	Vrouwen	4,2	(2,1-6,2)	3,9	(2,2-6,7)	488
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	3,1	(1,2-4,9)	3,0	(1,6-5,7)	479
	75 +	5,6	(3,1-8,2)	5,7	(3,5-8,9)	420
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	7,4	(2,5-12,2)	6,5	(3,3-12,5)	177
	Lager secundair	3,6	(0,7-6,6)	3,5	(1,5-8,1)	213
	Hoger secundair	3,4	(0,6-6,3)	3,4	(1,5-7,9)	210
	Hoger onderwijs	3,6	(1,1-6,0)	3,7	(1,8-7,4)	264
JAAR	**2013**	4,6	(2,6-6,6)	4,3	(2,7-6,9)	849
	2018	4,3	(2,7-5,8)	4,1	(2,8-6,0)	899

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B381 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met reumatoïde artritis in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA10_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	6,5	(3,4-9,6)	6,5	(4,1-10,3)	411
	Vrouwen	16,8	(12,4-21,2)	16,3	(12,3-21,4)	488
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	9,8	(6,1-13,4)	9,1	(6,3-13,1)	479
	75 +	15,6	(11,0-20,1)	13,6	(9,6-18,9)	420
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	14,4	(7,1-21,7)	11,3	(6,4-19,1)	177
	Lager secundair	10,6	(6,0-15,2)	8,5	(5,1-13,8)	213
	Hoger secundair	13,5	(7,6-19,4)	12,3	(7,7-19,2)	210
	Hoger onderwijs	11,9	(6,4-17,5)	11,7	(7,2-18,2)	264
JAAR	**1997**	26,8	(19,2-34,4)	26,2	(19,5-34,2)	638
	2001	19,4	(15,9-22,8)	18,0	(14,9-21,6)	893
	2004	20,8	(17,2-24,4)	19,6	(16,3-23,3)	1273
	2008	22,3	(18,8-25,8)	20,6	(17,4-24,3)	996
	2013	17,4	(13,6-21,2)	16,1	(12,8-20,0)	853
	2018	12,5	(9,6-15,3)	11,6	(9,1-14,6)	899

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B382 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met artrose in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA11_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	38,3	(31,6-45,1)	38,5	(32,0-45,5)	412
	Vrouwen	51,0	(45,0-57,1)	50,9	(44,9-56,9)	488
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	43,6	(37,1-50,1)	43,9	(37,3-50,7)	479
	75 +	48,0	(41,1-55,0)	47,0	(40,2-54,0)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	46,2	(35,9-56,6)	44,1	(34,4-54,3)	177
	Lager secundair	35,1	(25,7-44,5)	33,4	(24,8-43,3)	214
	Hoger secundair	54,1	(46,0-62,3)	54,6	(46,0-62,9)	210
	Hoger onderwijs	45,9	(37,0-54,8)	47,2	(38,1-56,4)	264
JAAR	**1997**	32,5	(27,0-38,0)	31,9	(26,5-37,9)	638
	2001	38,4	(33,9-43,0)	37,0	(32,7-41,5)	890
	2004	32,8	(29,2-36,3)	31,4	(27,9-35,2)	1278
	2008	43,0	(38,8-47,2)	41,5	(37,4-45,8)	979
	2013	41,7	(36,7-46,8)	40,5	(35,7-45,5)	850
	2018	45,7	(41,0-50,4)	45,1	(40,1-50,2)	900

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B383 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met een lage rugprobleem in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA12_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	23,4	(17,7-29,2)	23,7	(18,4-30,0)	412
	Vrouwen	38,1	(32,2-44,0)	37,7	(31,9-43,8)	488
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	27,8	(22,1-33,5)	27,7	(22,4-33,8)	479
	75 +	36,6	(29,9-43,3)	35,1	(28,7-42,2)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	34,3	(23,8-44,8)	31,3	(22,0-42,4)	177
	Lager secundair	33,6	(25,1-42,1)	31,6	(23,5-41,0)	214
	Hoger secundair	33,2	(25,0-41,5)	33,2	(25,6-41,9)	210
	Hoger onderwijs	27,6	(19,2-36,1)	28,6	(20,8-37,8)	264
JAAR	**2008**	31,9	(27,4-36,4)	31,2	(26,7-36,0)	985
	2013	29,8	(24,8-34,8)	29,2	(24,5-34,4)	854
	2018	31,9	(27,6-36,3)	31,5	(27,3-36,0)	900

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B384 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met een nekprobleem in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA13_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	16,4	(10,2-22,5)	16,4	(11,2-23,4)	412
	Vrouwen	23,9	(18,6-29,1)	23,8	(18,9-29,5)	488
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	20,0	(13,8-26,2)	20,0	(14,4-27,0)	479
	75 +	21,5	(16,1-26,9)	20,7	(15,7-26,7)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	21,6	(12,7-30,5)	20,6	(13,1-30,9)	177
	Lager secundair	18,0	(10,6-25,3)	17,1	(11,1-25,6)	214
	Hoger secundair	22,0	(14,6-29,4)	21,9	(15,1-30,6)	210
	Hoger onderwijs	20,6	(11,8-29,4)	20,9	(13,3-31,2)	264
JAAR	**2008**	20,7	(16,9-24,4)	20,0	(16,5-24,0)	1001
	2013	17,4	(13,5-21,2)	16,8	(13,4-21,0)	854
	2018	20,7	(16,6-24,8)	20,2	(16,3-24,7)	900

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B385 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA14_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	16,1	(11,4-20,7)	15,9	(11,7-21,2)	412
	Vrouwen	13,0	(9,0-17,0)	13,0	(9,5-17,6)	488
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	15,3	(11,2-19,5)	15,2	(11,5-19,9)	479
	75 +	13,1	(8,6-17,5)	13,2	(9,4-18,3)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	19,5	(11,6-27,4)	20,9	(13,6-30,7)	177
	Lager secundair	15,3	(8,2-22,5)	15,6	(9,7-24,2)	214
	Hoger secundair	16,1	(10,4-21,9)	15,6	(10,9-21,8)	210
	Hoger onderwijs	9,1	(4,6-13,6)	8,4	(5,0-13,8)	264
JAAR	**1997**	9,6	(6,3-12,8)	9,6	(6,7-13,4)	638
	2001	12,5	(9,5-15,4)	12,6	(9,9-15,9)	882
	2004	12,6	(10,0-15,2)	12,7	(10,3-15,5)	1284
	2008	9,8	(7,5-12,1)	9,9	(7,8-12,5)	998
	2013	11,8	(9,2-14,4)	11,9	(9,5-14,7)	854
	2018	14,3	(11,3-17,3)	14,3	(11,5-17,6)	900

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B386 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden een dieet volgde, Waals Gewest

MA14_30		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	45,6	(29,7-61,5)	45,1	(30,1-61,0)	63
	Vrouwen	47,8	(30,7-64,8)	47,8	(32,1-63,9)	64
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	48,5	(33,5-63,6)	48,7	(34,1-63,6)	75
	75 +	44,3	(25,6-63,0)	44,2	(27,5-62,3)	52
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	49,7	(28,4-71,0)	49,4	(27,7-71,3)	32
	Lager secundair	33,7	(6,9-60,5)	33,3	(14,8-58,9)	29
	Hoger secundair	47,8	(26,4-69,3)	48,4	(28,9-68,3)	40
	Hoger onderwijs	57,7	(31,5-84,0)	58,3	(32,5-80,1)	21
JAAR	**2001**	72,4	(60,6-84,2)	72,4	(59,9-82,1)	92
	2008	66,1	(53,8-78,5)	66,0	(53,0-77,0)	98
	2013	42,3	(31,2-53,5)	42,7	(32,1-54,0)	119
	2018	46,7	(35,1-58,3)	46,8	(35,5-58,4)	127

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B387 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden medicamenteus behandeld werd, Waals Gewest

MA14_40		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	97,6	(93,3-100,0)	97,6	(87,2-99,6)	63
	Vrouwen	90,4	(82,2-98,6)	90,9	(77,1-96,7)	64
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	95,9	(90,0-100,0)	96,3	(86,8-99,0)	75
	75 +	91,0	(82,7-99,3)	92,6	(76,7-98,0)	52
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	92,5	(91,2-93,9)	96,8	(88,4-99,2)	32
	Lager secundair	100	(100,0-100,0)	100	(100,0-100,0)	29
	Hoger secundair	88,2	(74,3-100,0)	87,1	(64,4-96,2)	40
	Hoger onderwijs	94,7	(83,0-100,0)	93,7	(53,6-99,5)	21
JAAR	**2001**	96,4	(92,7-100,0)	97,4	(92,4-99,1)	95
	2008	92,9	(85,2-100,0)	94,8	(85,0-98,3)	98
	2013	95,7	(91,5-99,9)	96,1	(89,8-98,6)	119
	2018	93,8	(88,9-98,8)	95,0	(88,2-98,0)	127

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B388 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden insuline gebruikte, Waals Gewest

MA14_50		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	21,6	(9,0-34,2)	21,8	(11,2-38,0)	63
	Vrouwen	18,0	(5,6-30,4)	18,0	(8,8-33,3)	64
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	19,2	(7,7-30,8)	18,9	(9,6-33,8)	75
	75 +	20,3	(5,9-34,8)	20,4	(9,8-37,6)	52
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	26,2	(6,1-46,2)	26,7	(11,3-51,0)	32
	Lager secundair	13,9	(0,0-33,1)	14,1	(3,7-40,8)	29
	Hoger secundair	16,8	(3,7-29,8)	16,1	(6,6-34,1)	40
	Hoger onderwijs	20,9	(0,0-44,8)	20,1	(6,7-47,1)	21
JAAR	**2001**	46,0	(31,9-60,1)	45,5	(32,7-58,9)	93
	2008	37,0	(23,7-50,3)	37,0	(25,1-50,7)	98
	2013	24,6	(15,2-34,1)	24,2	(16,2-34,6)	119
	2018	19,7	(10,9-28,5)	19,7	(12,3-30,0)	127

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B389 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes dat hiervoor in de afgelopen 12 maanden orale antidiabetica gebruikte, Waals Gewest

MA14_60		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	92,9	(83,1-100,0)	92,8	(76,1-98,1)	63
	Vrouwen	85,3	(74,6-95,9)	85,9	(68,8-94,4)	64
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	92,2	(83,6-100,0)	92,2	(79,4-97,3)	75
	75 +	84,4	(71,5-97,3)	85,3	(64,0-95,0)	52
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	84,2	(68,2-100,0)	87,9	(59,6-97,3)	32
	Lager secundair	91,5	(75,3-100,0)	92,8	(60,7-99,1)	29
	Hoger secundair	86,4	(72,6-100,0)	84,2	(62,4-94,5)	40
	Hoger onderwijs	94,7	(83,0-100,0)	93,7	(64,2-99,2)	21
JAAR	**2001**	75,8	(62,9-88,8)	78,5	(65,6-87,5)	95
	2008	73,0	(61,0-85,0)	74,9	(61,6-84,7)	98
	2013	86,2	(78,7-93,7)	86,3	(76,9-92,2)	119
	2018	88,9	(81,6-96,2)	89,4	(79,4-94,8)	127

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B390 Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetes volgens de behandeling van de aandoening, Waals Gewest

MA14_70		Geen behandeling	Enkel dieet	Orale antidiabetica	Insuline	N
GESLACHT	**Mannen**	2,4	0.0	76,0	21,6	63
	Vrouwen	3,7	5,8	72,4	18,0	64
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	0,2	3,9	76,7	19,2	75
	75 +	7,0	2,0	70,6	20,3	52
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	7,5	0.0	66,4	26,2	32
	Lager secundair	0.0	0.0	86,1	13,9	29
	Hoger secundair	0,4	11,4	71,4	16,8	40
	Hoger onderwijs	5,3	0.0	73,8	20,9	21
JAAR	**2001**	1,2	2,4	50,3	46,0	93
	2008	1,3	5,8	55,9	37,0	98
	2013	3,9	0,4	71,1	24,6	119
	2018	3,1	3,1	74,1	19,7	127

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

Tabel B391 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met allergie in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA15_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	9,8	(6,2-13,4)	9,0	(6,1-13,2)	412
	Vrouwen	19,2	(14,5-23,8)	19,0	(14,8-24,1)	487
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	18,7	(13,9-23,6)	18,2	(13,9-23,5)	479
	75 +	11,2	(7,1-15,2)	10,0	(6,7-14,5)	420
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	13,8	(5,8-21,9)	14,2	(8,0-24,0)	177
	Lager secundair	13,1	(6,2-20,1)	11,6	(6,6-19,6)	213
	Hoger secundair	15,5	(9,3-21,6)	13,8	(8,9-20,8)	210
	Hoger onderwijs	18,3	(12,5-24,0)	16,1	(11,1-22,7)	264
JAAR	**2001**	11,5	(8,6-14,5)	10,9	(8,3-14,1)	895
	2004	14,0	(11,2-16,8)	13,2	(10,7-16,2)	1276
	2008	11,5	(8,7-14,2)	11,1	(8,7-14,0)	1009
	2013	10,2	(7,0-13,4)	9,9	(7,1-13,6)	854
	2018	15,2	(12,0-18,4)	14,7	(11,9-18,1)	899

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B392 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met een maagzweer in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA16_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	4,1	(1,7-6,5)	4,1	(2,3-7,3)	412
	Vrouwen	8,4	(5,0-11,8)	8,4	(5,6-12,4)	488
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	6,2	(3,3-9,2)	6,0	(3,7-9,6)	479
	75 +	7,0	(3,3-10,6)	6,3	(3,7-10,6)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	4,5	(0,0-9,4)	4,1	(1,4-11,2)	177
	Lager secundair	10,1	(3,7-16,5)	9,2	(4,7-17,2)	214
	Hoger secundair	9,9	(5,1-14,6)	9,4	(5,6-15,5)	210
	Hoger onderwijs	2,9	(0,7-5,0)	2,8	(1,3-5,9)	264
JAAR	**1997**	7,8	(4,2-11,3)	7,3	(4,5-11,5)	638
	2001	8,5	(5,8-11,2)	8,2	(6,0-11,2)	893
	2004	7,7	(5,7-9,7)	7,4	(5,7-9,7)	1280
	2008	10,3	(7,8-12,8)	10,0	(7,8-12,8)	1009
	2013	10,0	(6,1-13,9)	9,8	(6,7-14,2)	854
	2018	6,6	(4,3-8,9)	6,4	(4,5-9,1)	900

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B393 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met leverlijden in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA17_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,0	(0,0-2,1)	1,0	(0,3-2,9)	412
	Vrouwen	1,0	(0,0-1,9)	1,0	(0,4-2,5)	488
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	1,1	(0,1-2,1)	1,1	(0,4-2,9)	479
	75 +	0,9	(0,0-1,7)	0,9	(0,3-2,4)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	0,0	.	.	.	177
	Lager secundair	2,1	(0,0-4,3)	2,1	(0,8-5,8)	214
	Hoger secundair	1,0	(0,0-2,2)	1,0	(0,3-3,3)	210
	Hoger onderwijs	0,7	(0,0-1,8)	0,7	(0,1-3,3)	264
JAAR	**2001**	2,1	(0,1-4,2)	2,1	(0,8-5,0)	893
	2004	1,6	(0,6-2,6)	1,5	(0,8-2,9)	1281
	2008	0,7	(0,1-1,3)	0,7	(0,3-1,6)	1015
	2013	0,6	(0,0-1,1)	0,5	(0,2-1,6)	854
	2018	1,0	(0,3-1,7)	1,0	(0,5-1,9)	900

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B394 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met kanker in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA18_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	6,9	(3,4-10,5)	7,0	(4,1-11,5)	412
	Vrouwen	5,5	(2,7-8,2)	5,4	(3,2-8,9)	488
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	5,5	(3,0-8,1)	5,4	(3,3-8,7)	479
	75 +	6,7	(3,1-10,3)	6,8	(3,9-11,4)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	8,5	(2,2-14,8)	8,2	(3,9-16,5)	177
	Lager secundair	5,0	(0,0-9,9)	5,0	(1,8-12,9)	214
	Hoger secundair	5,2	(1,8-8,6)	5,2	(2,7-9,9)	210
	Hoger onderwijs	6,4	(3,0-9,8)	6,4	(3,7-10,8)	264
JAAR	**1997**	3,8	(1,5-6,0)	3,9	(2,1-6,9)	638
	2001	5,2	(2,9-7,5)	5,2	(3,3-8,0)	892
	2004	2,0	(1,1-2,9)	2,0	(1,3-3,2)	1273
	2008	5,6	(3,4-7,8)	5,6	(3,7-8,3)	1014
	2013	4,7	(2,5-6,9)	4,7	(2,9-7,4)	854
	2018	6,1	(3,9-8,2)	6,1	(4,2-8,6)	900

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B395 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ernstige hoofdpijn zoals migraine in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA19_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	4,7	(0,3-9,2)	4,6	(1,8-11,2)	412
	Vrouwen	6,8	(4,3-9,4)	6,8	(4,7-9,9)	488
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	6,3	(2,5-10,2)	6,3	(3,3-11,8)	479
	75 +	5,5	(3,0-7,9)	5,2	(3,3-8,3)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	8,4	(3,2-13,5)	8,6	(4,6-15,4)	177
	Lager secundair	4,8	(1,4-8,1)	4,5	(2,2-9,0)	214
	Hoger secundair	5,5	(2,1-8,9)	5,3	(2,9-9,3)	210
	Hoger onderwijs	6,0	(0,0-12,0)	5,7	(2,0-15,1)	264
JAAR	**1997**	11,3	(5,2-17,3)	10,1	(5,6-17,5)	636
	2001	9,9	(7,2-12,5)	9,1	(6,9-11,9)	890
	2004	10,1	(7,8-12,5)	9,3	(7,3-11,7)	1284
	2008	7,1	(5,0-9,2)	6,6	(4,9-8,9)	1001
	2013	8,8	(4,5-13,1)	8,2	(5,0-13,3)	854
	2018	5,9	(3,6-8,3)	5,5	(3,6-8,4)	900

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B396 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met urinaire incontinentie in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA20_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	10,4	(6,6-14,2)	9,9	(6,9-14,1)	412
	Vrouwen	14,4	(10,2-18,5)	12,5	(8,7-17,5)	488
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	6,9	(3,7-10,1)	6,9	(4,3-10,8)	479
	75 +	19,4	(14,1-24,6)	19,0	(14,2-24,9)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	20,2	(10,9-29,4)	15,5	(8,7-26,0)	177
	Lager secundair	14,5	(7,9-21,0)	12,6	(7,6-20,1)	214
	Hoger secundair	12,7	(7,0-18,4)	12,3	(7,7-19,0)	210
	Hoger onderwijs	6,6	(3,2-10,0)	6,9	(4,1-11,5)	264
JAAR	**2008**	9,8	(7,5-12,1)	9,0	(7,0-11,6)	1000
	2013	11,4	(7,6-15,2)	10,6	(7,3-15,3)	854
	2018	12,7	(9,7-15,7)	12,1	(9,5-15,3)	900

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B397 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met depressie in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA21_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,4	(0,1-2,6)	1,4	(0,6-3,3)	412
	Vrouwen	9,8	(6,3-13,4)	9,8	(6,8-14,1)	488
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	5,7	(2,8-8,6)	4,1	(2,3-7,2)	479
	75 +	6,9	(3,6-10,3)	4,4	(2,4-7,7)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	13,4	(5,4-21,4)	9,5	(4,8-17,8)	177
	Lager secundair	3,6	(0,8-6,3)	2,1	(0,8-5,3)	214
	Hoger secundair	5,7	(1,6-9,8)	3,8	(1,6-8,7)	210
	Hoger onderwijs	4,6	(1,7-7,6)	3,2	(1,4-6,8)	264
JAAR	**1997**	11,6	(7,8-15,5)	9,9	(7,0-13,9)	638
	2001	8,8	(6,0-11,5)	7,6	(5,5-10,3)	891
	2004	6,5	(4,7-8,3)	5,5	(4,1-7,4)	1284
	2008	6,9	(4,9-8,9)	6,0	(4,5-8,1)	1006
	2013	9,4	(5,0-13,9)	8,4	(5,1-13,4)	854
	2018	6,3	(4,1-8,5)	5,5	(3,9-7,8)	900

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B398 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met schildklierlijden in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA22_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	7,7	(3,6-11,8)	7,6	(4,5-12,7)	412
	Vrouwen	23,4	(18,2-28,6)	23,5	(18,7-29,1)	488
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	16,8	(11,7-21,8)	15,4	(10,7-21,6)	479
	75 +	16,8	(11,7-21,9)	13,9	(9,9-19,3)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	14,1	(7,1-21,1)	11,8	(6,7-19,9)	177
	Lager secundair	14,1	(7,4-20,8)	11,4	(6,8-18,7)	214
	Hoger secundair	21,7	(14,0-29,5)	19,9	(13,0-29,1)	210
	Hoger onderwijs	15,9	(9,2-22,5)	14,8	(9,2-22,8)	264
JAAR	**1997**	5,0	(1,3-8,8)	4,1	(1,9-8,9)	637
	2001	12,5	(8,4-16,6)	10,7	(7,7-14,8)	892
	2004	12,3	(9,6-14,9)	10,6	(8,3-13,3)	1282
	2008	11,3	(8,6-14,1)	9,8	(7,5-12,7)	1007
	2013	13,9	(10,1-17,8)	12,3	(9,4-16,1)	854
	2018	16,8	(13,2-20,3)	15,1	(12,0-18,9)	900

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B399 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met cataract in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA2301_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	11,6	(6,3-17,0)	11,7	(7,2-18,5)	412
	Vrouwen	12,8	(8,5-17,1)	12,2	(8,7-16,9)	488
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	9,4	(5,0-13,9)	9,4	(5,8-14,9)	479
	75 +	15,6	(10,6-20,7)	15,6	(11,3-21,1)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	10,9	(4,6-17,2)	8,6	(4,5-15,8)	177
	Lager secundair	9,9	(3,5-16,3)	8,9	(4,7-16,4)	214
	Hoger secundair	7,1	(3,1-11,0)	6,9	(3,9-12,0)	210
	Hoger onderwijs	18,4	(10,9-25,9)	19,5	(12,8-28,6)	264
JAAR	**1997**	10,0	(5,3-14,7)	9,9	(6,2-15,3)	638
	2001	10,9	(8,1-13,6)	9,9	(7,6-12,6)	891
	2004	14,2	(11,2-17,2)	13,2	(10,5-16,3)	1279
	2008	11,4	(8,9-13,9)	10,0	(7,8-12,7)	996
	2013	10,3	(7,3-13,4)	9,2	(6,7-12,4)	854
	2018	12,3	(9,0-15,6)	11,3	(8,4-15,1)	900

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B400 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met glaucoom in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA2302_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	2,4	(0,5-4,3)	2,3	(1,0-5,3)	412
	Vrouwen	4,0	(1,3-6,7)	3,6	(2,0-6,5)	488
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	2,1	(0,6-3,5)	2,0	(1,0-4,3)	479
	75 +	4,8	(1,5-8,1)	4,6	(2,4-8,5)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	1,8	(0,0-3,8)	1,2	(0,3-4,1)	177
	Lager secundair	3,8	(0,0-8,1)	3,0	(1,0-8,5)	214
	Hoger secundair	3,4	(0,3-6,6)	3,1	(1,2-8,2)	210
	Hoger onderwijs	4,1	(0,4-7,7)	4,1	(1,7-9,5)	264
JAAR	**1997**	3,0	(1,5-4,5)	2,8	(1,7-4,6)	637
	2001	7,9	(5,7-10,1)	7,3	(5,4-9,6)	888
	2004	5,6	(3,6-7,6)	5,1	(3,5-7,4)	1275
	2008	5,2	(3,4-6,9)	4,7	(3,4-6,6)	1006
	2013	3,3	(1,7-4,9)	3,0	(1,9-4,9)	854
	2018	3,4	(1,6-5,1)	3,1	(1,9-5,2)	900

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B401 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met diabetische retinopathie in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA2303_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	2,6	(0,7-4,4)	2,3	(1,1-4,8)	412
	Vrouwen	2,0	(0,4-3,6)	1,6	(0,6-4,3)	488
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	1,1	(0,0-2,3)	1,1	(0,3-3,5)	479
	75 +	3,6	(1,5-5,7)	3,6	(2,0-6,4)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	2,1	(0,0-4,4)	1,3	(0,4-4,1)	177
	Lager secundair	2,2	(0,0-4,4)	1,7	(0,6-4,8)	214
	Hoger secundair	1,5	(0,0-3,2)	1,3	(0,4-4,4)	210
	Hoger onderwijs	3,0	(0,1-5,9)	2,9	(1,0-8,5)	264
JAAR	**2013**	0,3	(0,0-0,6)	0,4	(0,1-1,3)	854
	2018	2,2	(1,0-3,4)	1,9	(1,0-3,7)	900

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B402 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met maculadegeneratie in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA2304_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,3	(0,0-1,0)	0,3	(0,0-2,8)	412
	Vrouwen	0,4	(0,0-1,2)	0,4	(0,1-1,9)	488
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	0,3	(0,0-0,8)	0,3	(0,0-1,9)	479
	75 +	0,5	(0,0-1,5)	0,5	(0,1-2,9)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	0,0	.	.	.	177
	Lager secundair	0,6	(0,0-1,7)	0,5	(0,0-7,6)	214
	Hoger secundair	1,0	(0,0-3,0)	1,0	(0,2-5,0)	210
	Hoger onderwijs	0,0	.	.	.	264
JAAR	**2013**	3,7	(1,6-5,8)	3,6	(1,8-6,9)	854
	2018	0,4	(0,0-0,9)	0,4	(0,1-1,5)	900

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B403 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ziekte van Parkinson in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA24_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,4	(0,0-3,0)	1,3	(0,4-4,1)	412
	Vrouwen	1,8	(0,4-3,1)	1,6	(0,7-4,0)	488
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	1,1	(0,0-2,2)	1,1	(0,4-3,0)	479
	75 +	2,2	(0,4-4,0)	2,2	(0,9-5,3)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	3,1	(0,0-6,7)	2,8	(0,9-8,3)	177
	Lager secundair	3,4	(0,6-6,1)	3,2	(1,3-7,7)	214
	Hoger secundair	0,0	(0,0-0,1)	0,0	(0,0-0,3)	210
	Hoger onderwijs	0,6	(0,0-1,6)	0,6	(0,1-4,0)	264
JAAR	**1997**	1,6	(0,5-2,8)	1,6	(0,8-3,1)	638
	2001	0,9	(0,3-1,6)	0,8	(0,4-1,6)	888
	2004	1,4	(0,7-2,0)	1,2	(0,7-2,0)	1275
	2008	0,9	(0,4-1,5)	0,8	(0,4-1,4)	1012
	2013	1,6	(0,4-2,7)	1,3	(0,6-2,9)	854
	2018	1,6	(0,6-2,7)	1,4	(0,7-2,8)	900

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B404 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met epilepsie in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA25_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,4	(0,0-3,2)	1,3	(0,5-3,4)	412
	Vrouwen	0,7	(0,0-1,6)	0,6	(0,1-2,8)	488
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	0,5	(0,0-1,2)	0,4	(0,1-2,4)	479
	75 +	1,7	(0,0-3,4)	1,7	(0,7-4,1)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	2,4	(0,0-5,9)	1,7	(0,4-6,9)	177
	Lager secundair	1,3	(0,0-3,1)	1,1	(0,2-6,0)	214
	Hoger secundair	0,4	(0,0-1,0)	0,3	(0,0-2,4)	210
	Hoger onderwijs	0,5	(0,0-1,6)	0,5	(0,1-3,0)	264
JAAR	**1997**	0,5	(0,0-1,3)	0,5	(0,1-2,5)	638
	2001	0,4	(0,0-0,9)	0,4	(0,2-1,1)	892
	2004	0,6	(0,1-1,1)	0,6	(0,2-1,4)	1283
	2008	0,4	(0,0-0,8)	0,4	(0,1-1,2)	1017
	2013	0,9	(0,2-1,7)	0,9	(0,4-2,0)	854
	2018	1,0	(0,2-1,9)	1,0	(0,4-2,3)	900

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B405 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met langdurige vermoeidheid in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA26_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	4,6	(1,8-7,4)	4,6	(2,5-8,4)	412
	Vrouwen	9,8	(6,2-13,4)	9,6	(6,5-13,7)	488
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	6,2	(3,4-9,0)	6,0	(3,8-9,3)	479
	75 +	9,2	(5,1-13,3)	8,3	(5,1-13,4)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	10,9	(3,9-17,9)	9,5	(4,9-17,5)	177
	Lager secundair	8,9	(3,1-14,7)	7,9	(4,1-14,5)	214
	Hoger secundair	6,2	(2,3-10,1)	5,9	(3,1-11,0)	210
	Hoger onderwijs	5,9	(2,3-9,5)	5,9	(3,1-11,0)	264
JAAR	**2001**	9,5	(6,8-12,3)	9,0	(6,7-12,0)	891
	2004	9,9	(7,5-12,3)	9,5	(7,3-12,1)	1282
	2008	6,2	(4,3-8,2)	5,9	(4,2-8,1)	1003
	2013	5,1	(3,0-7,2)	4,9	(3,1-7,5)	853
	2018	7,6	(5,2-10,0)	7,3	(5,3-10,0)	900

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B406 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met osteoporose in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA27_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	0,9	(0,0-1,8)	0,9	(0,3-2,5)	412
	Vrouwen	12,2	(8,4-16,1)	12,3	(9,0-16,6)	487
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	8,0	(4,6-11,5)	4,7	(2,7-7,9)	479
	75 +	6,8	(4,0-9,6)	3,3	(1,7-6,3)	420
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	6,6	(1,1-12,1)	3,5	(1,3-9,0)	176
	Lager secundair	4,5	(1,5-7,6)	2,1	(1,0-4,7)	214
	Hoger secundair	9,7	(4,7-14,7)	5,5	(2,9-10,1)	210
	Hoger onderwijs	7,2	(3,4-11,1)	4,2	(1,9-9,0)	264
JAAR	**1997**	13,0	(8,7-17,2)	9,3	(6,0-14,1)	638
	2001	15,3	(11,6-19,0)	11,1	(8,4-14,4)	893
	2004	14,8	(12,1-17,6)	10,8	(8,5-13,5)	1269
	2008	16,0	(12,9-19,1)	11,7	(9,2-14,8)	986
	2013	15,4	(11,8-19,1)	11,4	(8,4-15,3)	851
	2018	7,5	(5,2-9,7)	5,3	(3,8-7,3)	899

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B407 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met gebroken heup in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA28_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	2,9	(0,0-7,4)	2,9	(0,7-11,6)	412
	Vrouwen	3,2	(1,1-5,2)	3,2	(1,6-6,1)	488
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	3,3	(0,0-6,9)	3,3	(1,1-9,4)	479
	75 +	2,7	(0,4-5,1)	2,7	(1,1-6,4)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	5,6	(0,3-10,9)	6,0	(2,4-14,2)	177
	Lager secundair	1,1	(0,0-2,7)	1,1	(0,3-4,3)	214
	Hoger secundair	0,9	(0,0-2,5)	0,8	(0,1-5,7)	210
	Hoger onderwijs	4,9	(0,0-10,9)	4,6	(1,5-13,5)	264
JAAR	**2001**	2,8	(1,5-4,1)	2,5	(1,6-4,1)	893
	2004	2,3	(1,1-3,5)	2,1	(1,2-3,6)	1281
	2008	2,1	(1,0-3,1)	1,8	(1,0-3,2)	1010
	2013	2,4	(0,9-4,0)	2,2	(1,2-4,1)	854
	2018	3,1	(0,9-5,3)	2,8	(1,2-6,5)	900

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B408 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met darmziekte, langer dan 3 maanden in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA29_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	3,2	(1,0-5,4)	3,2	(1,6-6,2)	412
	Vrouwen	6,7	(3,8-9,6)	6,3	(4,0-9,8)	488
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	3,7	(1,7-5,7)	3,6	(2,1-6,0)	479
	75 +	7,0	(3,5-10,4)	6,4	(3,7-10,7)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	9,7	(3,0-16,3)	7,8	(3,9-15,1)	177
	Lager secundair	2,3	(0,0-4,8)	1,9	(0,6-5,6)	214
	Hoger secundair	6,8	(2,9-10,6)	6,4	(3,5-11,6)	210
	Hoger onderwijs	3,7	(0,9-6,5)	3,7	(1,7-7,9)	264
JAAR	**1997**	5,4	(2,8-7,9)	5,3	(3,3-8,5)	638
	2001	7,4	(5,0-9,8)	7,2	(5,2-9,8)	893
	2004	5,3	(3,8-6,7)	5,1	(3,9-6,7)	1280
	2008	6,2	(4,3-8,2)	5,9	(4,3-8,1)	1016
	2013	7,3	(4,5-10,2)	7,1	(4,7-10,4)	854
	2018	5,2	(3,3-7,2)	5,1	(3,5-7,3)	900

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B409 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met nierstenen in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA30_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,9	(0,1-3,7)	1,9	(0,8-4,8)	412
	Vrouwen	0,5	(0,0-1,3)	0,5	(0,1-2,1)	488
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	1,0	(0,0-2,3)	0,8	(0,3-2,4)	479
	75 +	1,2	(0,0-2,5)	1,1	(0,3-3,8)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	0,4	(0,0-1,2)	0,3	(0,1-2,1)	177
	Lager secundair	0,1	(0,0-0,2)	0,1	(0,0-0,2)	214
	Hoger secundair	1,4	(0,0-3,9)	1,2	(0,2-6,4)	210
	Hoger onderwijs	2,3	(0,2-4,4)	2,0	(0,6-6,4)	264
JAAR	**1997**	1,3	(0,2-2,4)	1,3	(0,5-2,9)	638
	2001	1,0	(0,3-1,8)	1,0	(0,5-2,1)	893
	2004	1,0	(0,2-1,8)	1,0	(0,4-2,2)	1284
	2008	0,8	(0,2-1,5)	0,8	(0,4-1,7)	1012
	2013	1,6	(0,3-2,9)	1,5	(0,7-3,2)	854
	2018	1,1	(0,2-2,0)	1,0	(0,5-2,2)	900

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B410 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ernstige nierziekte behalve nierstenen in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA31_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,5	(0,4-2,7)	1,4	(0,7-3,0)	412
	Vrouwen	2,5	(0,7-4,3)	2,5	(1,2-5,0)	488
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	2,5	(0,6-4,5)	2,5	(1,2-5,2)	479
	75 +	1,6	(0,2-2,9)	1,5	(0,6-3,4)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	4,5	(0,5-8,5)	4,9	(2,1-11,0)	177
	Lager secundair	2,7	(0,0-6,1)	2,4	(0,8-7,2)	214
	Hoger secundair	1,0	(0,0-2,3)	0,8	(0,2-3,0)	210
	Hoger onderwijs	1,0	(0,0-2,0)	0,8	(0,2-2,7)	264
JAAR	**1997**	1,4	(0,2-2,6)	1,4	(0,6-3,2)	638
	2001	2,1	(0,5-3,8)	2,2	(1,0-4,6)	893
	2004	0,8	(0,2-1,5)	0,8	(0,4-1,8)	1283
	2008	1,4	(0,5-2,2)	1,4	(0,7-2,6)	1014
	2013	1,9	(0,3-3,6)	2,0	(0,8-4,5)	853
	2018	2,1	(0,9-3,3)	2,1	(1,2-3,7)	900

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B411 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met chronische blaasontsteking in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA32_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	2,8	(0,8-4,7)	2,2	(0,9-5,5)	412
	Vrouwen	3,3	(1,0-5,6)	2,2	(1,1-4,3)	488
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	1,0	(0,0-2,0)	1,0	(0,3-2,8)	479
	75 +	5,5	(2,3-8,7)	5,5	(3,1-9,5)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	2,3	(0,2-4,4)	1,2	(0,4-3,5)	177
	Lager secundair	5,4	(0,3-10,5)	3,8	(1,3-11,0)	214
	Hoger secundair	3,2	(0,1-6,3)	2,6	(1,0-6,7)	210
	Hoger onderwijs	1,4	(0,0-2,9)	1,3	(0,4-3,7)	264
JAAR	**1997**	6,8	(2,6-11,0)	7,0	(3,8-12,6)	638
	2001	4,2	(2,7-5,7)	4,0	(2,8-5,8)	893
	2004	5,6	(3,9-7,3)	5,5	(4,0-7,5)	1279
	2008	3,5	(2,1-5,0)	3,3	(2,2-5,0)	1010
	2013	5,1	(2,8-7,4)	4,8	(3,0-7,8)	854
	2018	3,1	(1,5-4,7)	3,0	(1,8-4,9)	900

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B412 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met ernstige of chronische huidaandoening in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA33_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	3,0	(0,9-5,2)	3,0	(1,4-6,2)	412
	Vrouwen	4,3	(1,9-6,7)	4,3	(2,4-7,5)	488
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	4,1	(1,9-6,3)	4,1	(2,4-6,8)	479
	75 +	3,4	(0,8-6,0)	3,2	(1,5-7,0)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	2,5	(0,0-5,8)	2,4	(0,6-9,0)	177
	Lager secundair	2,0	(0,0-5,2)	1,9	(0,4-8,5)	214
	Hoger secundair	5,5	(1,7-9,4)	5,4	(2,7-10,7)	210
	Hoger onderwijs	4,8	(1,6-8,1)	4,8	(2,5-8,9)	264
JAAR	**1997**	4,4	(1,4-7,4)	4,5	(2,3-8,7)	637
	2001	3,5	(2,1-4,8)	3,4	(2,3-5,0)	890
	2004	4,0	(2,4-5,6)	3,9	(2,6-5,9)	1284
	2008	3,0	(1,8-4,2)	2,9	(1,9-4,4)	1014
	2013	4,1	(1,8-6,4)	4,0	(2,3-6,9)	854
	2018	3,8	(2,1-5,4)	3,7	(2,4-5,8)	900

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B413 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met galstenen of galblaasontsteking in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA34_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,2	(0,0-2,8)	1,2	(0,3-4,3)	412
	Vrouwen	1,5	(0,4-2,6)	1,5	(0,7-3,0)	488
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	1,3	(0,0-2,6)	1,3	(0,5-3,5)	479
	75 +	1,4	(0,1-2,8)	1,4	(0,6-3,5)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	0,0	(0,0-0,1)	0,0	(0,0-0,2)	177
	Lager secundair	1,4	(0,0-3,3)	1,3	(0,4-4,5)	214
	Hoger secundair	1,0	(0,0-2,1)	1,0	(0,3-3,1)	210
	Hoger onderwijs	2,5	(0,0-5,0)	2,6	(1,0-7,0)	264
JAAR	**1997**	2,1	(0,8-3,4)	2,2	(1,2-3,9)	638
	2001	2,4	(1,3-3,4)	2,4	(1,5-3,7)	893
	2004	2,5	(1,4-3,6)	2,5	(1,6-3,8)	1282
	2008	0,7	(0,2-1,2)	0,7	(0,4-1,4)	1012
	2013	1,2	(0,0-2,7)	1,2	(0,3-4,3)	853
	2018	1,4	(0,4-2,3)	1,4	(0,7-2,7)	900

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B414 Percentage van de mannelijke bevolking van 65 jaar en ouder met prostaatklachten in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

MA35_10		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
LEEFTIJDSGROEP						
	65 - 74	13,1	(6,8-19,4)	13,1	(8,0-20,7)	234
	75 +	28,5	(19,4-37,6)	28,5	(20,4-38,3)	176
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	18,4	(5,2-31,6)	14,1	(6,4-28,0)	70
	Lager secundair	19,9	(8,8-31,0)	18,7	(10,5-31,0)	89
	Hoger secundair	20,4	(10,0-30,8)	20,6	(12,2-32,6)	100
	Hoger onderwijs	19,4	(9,5-29,4)	20,4	(11,6-33,3)	134
JAAR	**1997**	18,8	(11,9-25,7)	19,6	(13,4-27,6)	263
	2001	15,9	(11,4-20,3)	15,9	(11,9-20,9)	386
	2004	17,1	(12,8-21,4)	17,2	(13,2-22,0)	485
	2008	17,2	(12,0-22,5)	17,0	(12,4-22,8)	357
	2013	17,8	(12,5-23,1)	17,6	(12,9-23,7)	383
	2018	19,4	(14,0-24,7)	19,3	(14,6-25,1)	410

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

Tabel B415 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens aantal aandoeningen waaraan ze lijden °, Waals Gewest

MA_1		Geen	1	2	3 of meer	N
GESLACHT	**Mannen**	62,7	23,3	10,2	3,9	1731
	Vrouwen	54,0	27,0	12,3	6,7	1862
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	92,7	6,8	0,5	0.0	449
	25 - 34	83,0	14,9	1,6	0,5	439
	35 - 44	68,6	26,5	4,0	1,0	527
	45 - 54	55,4	33,8	7,5	3,2	644
	55 - 64	37,9	32,8	19,2	10,1	635
	65 - 74	27,4	30,7	29,5	12,4	479
	75 +	25,2	33,8	26,0	15,1	420
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	39,7	24,8	20,8	14,7	291
	Lager secundair	53,2	26,8	12,3	7,6	593
	Hoger secundair	56,9	26,6	12,4	4,1	1056
	Hoger onderwijs	64,5	23,8	8,1	3,6	1554
JAAR	**1997**	66,3	22,7	8,1	2,9	2993
	2001	62,5	24,5	9,3	3,7	4069
	2004	63,3	23,5	9,2	4,0	4157
	2013	63,8	22,6	8,9	4,7	3583
	2018	58,2	25,2	11,2	5,3	3593

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

° op een totaal van 6 chronische aandoeningen: chronisch longlijden, hartlijden, diabetes, artritis/artrose, hypertensie, kanker

Tabel B416 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met multimorbiditeit *, Waals Gewest

MA_2		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	14,0	(11,8-16,2)	7,8	(5,5-10,8)	1731
	Vrouwen	19,0	(16,4-21,5)	9,7	(7,1-13,2)	1862
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,5	(0,0-1,4)	0,5	(0,1-3,1)	449
	25 - 34	2,1	(0,5-3,7)	2,1	(1,0-4,4)	439
	35 - 44	5,0	(2,5-7,5)	5,0	(3,0-8,1)	527
	45 - 54	10,8	(7,5-14,1)	10,7	(7,9-14,4)	644
	55 - 64	29,4	(23,9-34,8)	29,2	(24,1-34,9)	635
	65 - 74	41,9	(35,2-48,6)	41,8	(35,2-48,6)	479
	75 +	41,1	(34,4-47,7)	40,3	(33,9-47,1)	420
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	35,5	(27,7-43,2)	11,7	(6,5-20,2)	291
	Lager secundair	20,0	(15,3-24,6)	8,3	(5,5-12,3)	593
	Hoger secundair	16,5	(13,2-19,8)	10,0	(7,2-13,8)	1056
	Hoger onderwijs	11,8	(9,3-14,3)	7,1	(5,1-9,8)	1554
JAAR	**1997**	11,0	(9,2-12,8)	7,7	(6,4-9,3)	2993
	2001	13,0	(11,6-14,5)	7,5	(6,5-8,8)	4069
	2004	13,3	(11,8-14,7)	7,8	(6,7-9,0)	4157
	2013	13,6	(12,0-15,1)	7,4	(6,3-8,7)	3583
	2018	16,6	(14,7-18,4)	9,3	(7,9-10,8)	3593

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)
Meer dan één van de volgende aandoeningen: chronisch longlijden, hartlijden, diabetes, artritis/artrose, hypertensie, kanker

Tabel B417 Gemiddeld aantal chronische aandoeningen bij personen van 15 jaar en ouder (op een totaal van 25 aandoeningen°), Waals Gewest

MA_3		Gemiddelde (Ruw)	95% BI gemid	Gemiddelde (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,2	(1,1-1,3)	1,3	(1,2-1,4)	1729
	Vrouwen	1,8	(1,7-2,0)	1,8	(1,7-1,9)	1858
LEEFTIJDSGROEP	**15 - 24**	0,7	(0,4-0,9)	0,7	(0,5-0,9)	447
	25 - 34	0,8	(0,7-1,0)	0,9	(0,7-1,1)	438
	35 - 44	1,3	(1,1-1,5)	1,3	(1,1-1,5)	526
	45 - 54	1,5	(1,3-1,7)	1,5	(1,3-1,7)	644
	55 - 64	2,0	(1,7-2,2)	2,0	(1,7-2,2)	634
	65 - 74	2,3	(2,1-2,6)	2,3	(2,0-2,5)	479
	75 +	2,5	(2,2-2,8)	2,5	(2,2-2,7)	419
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	2,3	(1,9-2,7)	1,9	(1,5-2,3)	290
	Lager secundair	1,6	(1,3-1,8)	1,4	(1,2-1,7)	591
	Hoger secundair	1,6	(1,4-1,8)	1,7	(1,5-1,9)	1055
	Hoger onderwijs	1,3	(1,1-1,4)	1,4	(1,2-1,5)	1552
JAAR	**2001**	1,4	(1,3-1,4)	1,4	(1,4-1,5)	4039
	2004	1,3	(1,3-1,4)	1,4	(1,3-1,5)	3997
	2013	1,2	(1,2-1,3)	1,3	(1,2-1,4)	3574
	2018	1,5	(1,4-1,6)	1,5	(1,4-1,6)	3587

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

° Astma, chronisch longlijden, hartlijden, hoge bloeddruk, beroerte, artritis/artrose, diabetes, allergie, maagzweer, chronische darmproblemen, leverlijden, galstenen/ontsteking van de galblaas, kanker, ernstige hoofdpijn, depressie, schildklierlijden, glaucoom, cataract, ziekte van Parkinson, epilepsie, ernstig nierlijden/nierstenen, chronische blaasontsteking, chronische vermoeidheid, osteoporose, ernstige huidziekte

Tabel B418 Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder volgens aantal aandoeningen waaraan ze lijden °, Waals Gewest

MA_10		Geen	1	2	3 of meer	N
GESLACHT	**Mannen**	31,0	30,4	27,1	11,5	412
	Vrouwen	23,0	33,4	28,4	15,2	487
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	27,4	30,7	29,5	12,4	479
	75 +	25,2	33,8	26,0	15,1	420
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	25,9	30,8	21,7	21,6	177
	Lager secundair	31,4	31,8	23,5	13,3	213
	Hoger secundair	24,0	34,5	29,7	11,8	210
	Hoger onderwijs	25,0	32,5	31,4	11,0	264
JAAR	**1997**	25,8	35,7	26,5	12,1	638
	2001	25,4	40,1	21,5	12,9	868
	2004	30,1	34,1	22,6	13,2	1247
	2013	32,6	34,4	20,0	13,0	851
	2018	26,3	32,1	27,8	13,7	899

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
° op een totaal van 6 chronische aandoeningen: chronisch longlijden, hartlijden, diabetes, artritis/artrose, hypertensie, kanker

Tabel B419 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met multimorbiditeit *, Waals Gewest

MA_20		% (Ruw)	95% BI ruw	% (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	38,7	(31,9-45,4)	38,6	(32,2-45,4)	412
	Vrouwen	43,6	(37,6-49,6)	43,7	(37,8-49,7)	487
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	41,9	(35,2-48,6)	42,0	(35,5-48,8)	479
	75 +	41,1	(34,4-47,7)	40,7	(34,3-47,4)	420
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	43,3	(33,4-53,2)	43,1	(33,5-53,3)	177
	Lager secundair	36,7	(27,0-46,4)	36,3	(27,4-46,2)	213
	Hoger secundair	41,5	(33,3-49,7)	41,5	(33,6-49,8)	210
	Hoger onderwijs	42,5	(33,1-51,8)	42,6	(33,6-52,1)	264
JAAR	**1997**	38,6	(31,7-45,4)	39,1	(32,6-46,0)	638
	2001	34,5	(30,0-38,9)	34,1	(30,0-38,6)	868
	2004	35,8	(31,8-39,8)	35,6	(31,7-39,7)	1247
	2013	33,0	(28,7-37,3)	32,5	(28,4-36,9)	851
	2018	41,5	(36,8-46,2)	41,4	(36,7-46,2)	899

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)
Meer dan één van de volgende aandoeningen: chronisch longlijden, hartlijden, diabetes, artritis/artrose, hypertensie, kanker

Tabel 420 Gemiddeld aantal chronische aandoeningen bij personen van 65 jaar en ouder (op een totaal van 25 aandoeningen°), Waals Gewest

MA_30		Gemiddelde (Ruw)	95% BI gemid	Gemiddelde (Corr*)	95% BI stand	N
GESLACHT	**Mannen**	1,9	(1,7-2,2)	1,9	(1,7-2,2)	412
	Vrouwen	2,8	(2,5-3,0)	2,8	(2,5-3,0)	486
LEEFTIJDSGROEP	**65 - 74**	2,3	(2,1-2,6)	2,3	(2,1-2,6)	479
	75 +	2,5	(2,2-2,8)	2,5	(2,2-2,7)	419
OPLEIDINGSNIVEAU	**Lager/geen diploma**	2,7	(2,2-3,2)	2,6	(2,2-3,1)	176
	Lager secundair	2,2	(1,8-2,6)	2,1	(1,8-2,5)	213
	Hoger secundair	2,4	(2,1-2,8)	2,4	(2,1-2,8)	210
	Hoger onderwijs	2,3	(2,0-2,7)	2,4	(2,1-2,7)	264
JAAR	**2001**	2,4	(2,3-2,6)	2,4	(2,2-2,6)	853
	2004	2,3	(2,2-2,5)	2,3	(2,1-2,5)	1166
	2013	2,3	(2,1-2,6)	2,3	(2,0-2,6)	847
	2018	2,4	(2,2-2,6)	2,4	(2,2-2,6)	898

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie)

° Astma, chronisch longlijden, hartlijden, hoge bloeddruk, beroerte, artritis/artrose, diabetes, allergie, maagzweer, chronische darmproblemen, leverlijden, galstenen/ontsteking van de galblaas, kanker, ernstige hoofdpijn, depressie, schildklierlijden, glaucoom, cataract, ziekte van Parkinson, epilepsie, ernstig nierlijden/nierstenen, chronische blaasontsteking, chronische vermoeidheid, osteoporose, ernstige huidziekte

CONTACT
Johan Van der Heyden • T+32 2 642 57 26 • johan.vanderheyden@sciensano.be

MEER INFO

–

Bezoek onze website
>www.sciensano.be of
contacteer ons op
>info@sciensano.be

Sciensano • Juliette Wytsmanstraat 14 • Brussel • België • T + 32 2 642 51 11 • T pers + 32 2 642 54 20 • info@sciensano.be • www.sciensano.be

Verantwoordelijke uitgever: Myriam Sneyers, Algemeen directeur • Juliette Wytsmanstraat 14 • Brussel • België • D/2019/14.440/36