

SANTÉ SEXUELLE

Enquête de santé 2018

—

RANA CHARAFEDDINE

Sciensano

Epidémiologie et santé publique - Mode de vie et maladies chroniques

HIS 2018

Octobre 2019 • Bruxelles • Belgique

SANTÉ SEXUELLE

Auteur principal : Rana Charafeddine

•

Réviseur : Elise Braekman

•

Éditeurs : Lydia Gisle, Sabine Drieskens

Personne de contact : Rana Charafeddine • T +32 2 642 57 39 • rana.charafeddine@sciensano.be

Merci de citer cette publication comme suit :

R. Charafeddine, E. Braekman, L. Gisle, S. Drieskens. Enquête de santé 2018 : Santé sexuelle. Bruxelles, Belgique : Sciensano. Numéro de rapport : D/2019/14.440/70. Disponible en ligne : www.enquetesante.be

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier les personnes suivantes :

Dominique Van Beckhoven de Sciensano pour la relecture attentive de ce rapport

Ledia Jani et Tadek Krzywania de Sciensano pour la mise en page et le support administratif

Sandrine de Waleffe et l'équipe de Statbel pour l'organisation du travail de terrain

L'équipe des enquêteurs pour la collecte des données

Et toutes les personnes qui ont volontairement participé à l'enquête

COMMANDITAIRES

Cette enquête est réalisée à l'initiative du :

Gouvernement fédéral, Ministère des Affaires sociales et de la Santé publique

Gouvernement flamand, Ministère du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille

Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale (COCOM), Politique de la Santé

Communauté française, Ministère de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Égalité des chances

Gouvernement wallon, Ministère de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des chances

Communauté germanophone, Ministère de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ	6
ABRÉVIATIONS	7
INTRODUCTION	8
QUESTIONS	9
INDICATEURS	11
RÉSULTATS	13
1. Précocité de la première relation sexuelle	13
1.1. Prévalence en Belgique	13
1.2. Évolution	13
1.3. Variables démographiques	13
1.4. Variables socio-économiques	15
2. Multipartenariat et utilisation du préservatif	15
2.1. Prévalence en Belgique	15
2.2. Évolution	16
2.3. Variables démographiques	16
2.4. Variables socio-économiques	17
3. Recours au test de dépistage des IST	18
3.1. Prévalence en Belgique	18
3.2. Variables démographiques	18
3.3. Variables socio-économiques	19
4. Pratiques contraceptives chez les femmes	19
4.1. Prévalence en Belgique	20
4.2. Évolution	21
4.3. Variables démographiques	22
4.4. Variables socio-économiques	23
5. Tableaux de synthèse	25
SYNTHÈSE ET CONCLUSION	29
RÉFÉRENCES	31
LISTE DES TABLEAUX	32

RÉSUMÉ

La santé sexuelle fait partie intégrante de la santé, du bien-être et de la qualité de vie dans son ensemble. L'enquête de santé 2018 aborde cette thématique en examinant deux sous-thèmes qui ont une importance majeure dans l'élaboration des programmes de promotion de la santé sexuelle : les comportements sexuels à risque d'infections sexuellement transmissibles (IST), et la contraception.

On peut résumer les résultats en lien avec les comportements sexuels chez les 15-64 ans comme suit :

- La précocité des relations sexuelles (première relation avant l'âge de 15 ans) n'est pas très répandue dans la population en Belgique (5,7%), mais le multipartenariat récent est plus prévalent (10,0%). Seuls 43,5% des multipartenaires ont utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel.
- La prévalence de la précocité sexuelle, du multipartenariat récent et de l'utilisation d'un préservatif lors du dernier rapport sexuel n'ont pas évolué entre 2013 et 2018.
- Il n'y a pas de différence selon le sexe pour la précocité sexuelle, mais en ce qui concerne le multipartenariat, les hommes sont plus nombreux à avoir eu plusieurs partenaires sexuels dans l'année.
- Les jeunes sont plus nombreux à avoir eu plusieurs partenaires sexuels dans l'année.
- Les personnes peu instruites déclarent plus souvent avoir eu des relations sexuelles précoces et avoir eu plusieurs partenaires dans l'année que les plus instruites, mais déclarent moins souvent avoir eu recours au dépistage des IST.
- Les comportements sexuels varient selon la région : la précocité sexuelle est plus élevée en Région wallonne, tandis que le multipartenariat récent et le dépistage des IST sont plus élevés à Bruxelles.

Les pratiques contraceptives ont été examinées parmi les femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans :

- La pratique contraceptive est largement répandue en Belgique avec plus de 8 femmes sur 10 qui déclarent utiliser un moyen de contraception, et le taux a augmenté depuis 2013.
- Les femmes peu instruites utilisent moins souvent un moyen de contraception.
- La pilule reste en 2018 le moyen de contraception le plus populaire en Belgique, mais son utilisation a peu à peu baissé depuis 2004 pour être remplacée par d'autres moyens de contraception, surtout le stérilet.
- Il y a aussi des différences dans les moyens de contraception utilisés selon l'âge : La pilule est populaire parmi les jeunes, mais son utilisation diminue avec l'âge, au profit d'autres méthodes, surtout le stérilet, la stérilisation et les méthodes de barrière.
- Les bruxelloises ont un taux de contraception moins élevé que les wallonnes et les flamandes, et un profil quelque peu différent par rapport aux moyens utilisés (utilisation plus fréquente de la pilule du lendemain, des méthodes de barrière et du patch ou de l'anneau vaginal).

Les résultats de l'enquête de 2018, comme ceux de l'enquête de 2013, ont permis d'identifier deux sous-groupes qui devraient faire l'objet d'un effort soutenu de sensibilisation : les jeunes et les personnes ayant un faible niveau d'instruction.

ABRÉVIATIONS



VIH	Virus de l'immunodéficience humaine
SIDA	Syndrome d'immunodéficience acquise
IST	Infection sexuellement transmissible
ONUSIDA	Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida

INTRODUCTION



La santé sexuelle fait partie intégrante de la santé, du bien-être et de la qualité de vie dans son ensemble. Elle est définie par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en relation avec la sexualité, et pas simplement l'absence de maladies, de dysfonctionnements ou d'infirmités (OMS, 2019). C'est un sujet de grande importance dans l'élaboration des programmes de promotion de la santé en raison de deux enjeux majeurs : la prévention des infections sexuellement transmissibles (IST) et la prévention des grossesses non désirées.

Les IST sont des causes importantes de morbidité et de mortalité évitables dans la population (Wellings et al., 2012). Si certaines infections sont asymptomatiques, d'autres sont mortelles ou peuvent entraîner des complications graves et chroniques comme des grossesses ectopiques, des avortements, de l'infertilité, des atteintes inflammatoires pelviennes, des cirrhoses du foie ou des cancers. Elles peuvent aussi occasionner une détresse psychologique parfois intense. La prise en charge des IST et leurs complications coûtent très cher, d'autant plus qu'on parle parfois de plusieurs années de suivi médical (Blouin et al., 2012). De plus, l'impact des IST est amplifié par le fait qu'elles augmentent le risque de contracter ou de transmettre le virus d'immunodéficience humaine (VIH).

Depuis le début des années 2000, on observe en Belgique, comme dans d'autres pays européens, une recrudescence de certaines IST. Durant la période 2002-2016, on a noté en Belgique une augmentation importante des trois IST les plus communes (chlamydia, syphilis et gonorrhée) (Vanden Berghe et al., 2016). Par exemple, le nombre de cas de chlamydia est passé de 9,5/100 000 habitants en 2002 et à 60,1/100 000 habitants en 2016. Pour certaines IST, on ne peut pas établir clairement si l'augmentation est attribuable à une hausse réelle du nombre de personnes atteintes ou si elle résulte de changements apportés aux méthodes de diagnostic et de déclaration. Quoi qu'il en soit, les IST demeurent une préoccupation importante pour la santé publique. Cette tendance est d'autant plus préoccupante dans le contexte actuel de banalisation du sida et d'autres IST. Une enquête, réalisée en Belgique en 2016 auprès d'un échantillon représentatif d'environ 1000 personnes¹, a révélé que 9 participants sur 10 ne s'inquiètent pas d'être contaminés par une IST ou par le VIH, et qu'1 participant sur 4 ne connaît pas la manière dont les principales IST se transmettent.

Outre les IST, les risques liés à l'activité sexuelle concernent également la survenue de grossesses non planifiées (Wellings et al., 2012). Ces grossesses peuvent avoir des conséquences négatives sur la mère et sur l'enfant, surtout dans le cas des grossesses précoces (OMS, 2018). En effet, les enfants de mères adolescentes sont plus susceptibles d'avoir un faible poids de naissance, d'être prématurés ou de décéder durant la première année de vie. Les grossesses précoces peuvent également avoir des conséquences économiques et sociales. Les mères adolescentes courent plus de risque d'abandonner leurs études, d'avoir de faibles perspectives économiques et professionnelles ainsi qu'un faible revenu.

Ce rapport sur la santé sexuelle est constitué de deux parties. La première s'intéresse aux comportements sexuels de la population, et notamment aux comportements sexuels à risque, et la deuxième s'intéresse aux pratiques contraceptives. L'inclusion de cette thématique dans l'enquête de santé est importante car elle offre la possibilité d'étudier cette problématique auprès d'un échantillon représentatif de la population générale.

¹ <https://preventionsida.org/2016/10/durex-lance-le-mois-de-la-prevention-contre-les-ist/>

QUESTIONS



Les questions concernant la santé sexuelle figurent dans le questionnaire et s'adressent exclusivement aux personnes âgées de 15 ans et plus. Les questions sont les suivantes :

Questions de l'enquête de santé 2018

RH01 Avez-vous déjà eu des relations sexuelles ? Veuillez inclure les relations vaginales, anales et orales.
Oui / Non (Si non, saut au module suivant)

RH.02. Quel âge aviez-vous la première fois que vous avez eu des relations sexuelles ?

RH.03. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des relations sexuelles ?

Oui / Non (Si non, saut au module suivant)

RH.04. Avec combien de partenaires différents avez-vous eu des relations sexuelles au cours des 12 derniers mois ?

1 partenaire / 2 partenaires / 3 partenaires / 4 partenaires ou plus / Je ne sais pas

RH.05. Avez-vous utilisé un condom ou un préservatif lors du dernier rapport sexuel ?

Oui / Non / Je ne sais pas

RH.06. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé - vous-même ou votre/vos partenaire(s) - une méthode de contraception (afin d'éviter une grossesse) ?

Oui / Non / Non concerné(e)

RH.07. Quelle(s) méthode(s) de contraception - vous ou votre/vos partenaire(s) - avez-vous utilisée(s) au cours des 12 derniers mois ? (Plusieurs réponses possibles)

- La pilule
- Un patch ou timbre contraceptif
- Un implant
- Des contraceptifs injectables (comme le Dépo-Provéra)
- Un anneau vaginal contraceptif (tel que le NuvaRing)
- Un stérilet
- La pilule du lendemain
- Un diaphragme
- Un spermicide ou une éponge contraceptive
- Un préservatif masculin (capote)
- Un condom féminin
- L'abstinence périodique
- Le coït interrompu
- La stérilisation de la femme
- La stérilisation de l'homme
- Autre méthode. Laquelle :

On analyse dans ce rapport 2 questions en lien avec le dépistage des IST qui proviennent du questionnaire « Connaissances et comportements face au VIH/sida » :

HI.02. Avez-vous déjà fait l'objet d'un test de dépistage du virus du SIDA ?

(Oui, il y a moins d'1 semaine / Oui, il y a plus d'1 semaine, mais moins de 3 mois / Oui, il y a plus de 3 mois, mais moins d'1 an / Oui, il y a plus d'1 an / Non, jamais / Je ne sais pas)

HI.04. Avez-vous déjà fait l'objet d'un test de dépistage d'une infection sexuellement transmissible autre que le SIDA ?

(Oui, il y a moins d'1 semaine / Oui, il y a plus d'1 semaine, mais moins de 3 mois / Oui, il y a plus de 3 mois, mais moins d'1 an / Oui, il y a plus d'1 an / Non, jamais / Je ne sais pas)

Changement par rapport à 2013

Il y a eu deux changements par rapport à 2013 : ajout de la catégorie « Non-concerné(e) » dans la réponse de la question RH.07 et ajout de la question sur le dépistage d'une IST autre que le sida.

INDICATEURS



Les indicateurs étudiés dans ce chapitre se rapportent à deux sous-thématiques : d'une part, les comportements sexuels, et d'autre part, le recours à la contraception.

Comportements sexuels

RH03_1 Pourcentage de la population âgée de 15 à 64 ans qui a eu des relations sexuelles au cours des 12 derniers mois. Cet indicateur n'est pas analysé dans le texte, mais les résultats se trouvent dans les tableaux de base.

RH02_2 Pourcentage de la population qui a eu sa première relation avant l'âge de 15 ans parmi les 15-64 ans ayant déjà eu au moins une relation sexuelle au cours de la vie.

L'initiation précoce aux relations sexuelles est considérée comme un comportement sexuel à risque car il a été associé dans la littérature à des comportements comme avoir des relations non protégées ou avoir de multiples partenaires sexuel(le)s. Ceux-ci augmentent le risque de contracter des IST et le risque de grossesses non planifiées (de Irala et al., 2011). Vu l'importance de ce concept pour limiter l'épidémie des IST, cet indicateur figure dans la liste des indicateurs à rapporter pour les rapports annuels du programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA). Il est néanmoins important de mentionner que le concept d'âge précoce à la première relation sexuelle n'est pas clairement établi. Dans le cadre de ce rapport, à l'instar d'ONUSIDA, nous considérons qu'une première relation est précoce lorsqu'elle se produit avant l'âge de 15 ans.

RH04_1 Pourcentage de la population sexuellement active âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires sexuel(le)s ou plus au cours des 12 derniers mois.

Avoir plusieurs partenaires sexuel(le)s au cours des 12 derniers mois est aussi considéré comme un indicateur de comportements sexuels à risque, surtout dans le cas des IST. Cet indicateur, appelé multipartenariat, figure aussi dans la liste des indicateurs à rapporter pour les rapports annuels d'ONUSIDA. Il est toutefois important de rappeler que le nombre de partenaires n'est pas un facteur de risque en lui-même, mais un indicateur de risque. En effet, la prise de risque peut être moins importante chez un multipartenaire qui protège chaque rapport sexuel que chez un monopartenaire qui a des rapports non protégés. C'est pourquoi la liste des indicateurs d'ONUSIDA inclut un indicateur qui examine le comportement par rapport à l'utilisation d'un préservatif lors du dernier rapport sexuel chez les personnes ayant eu plusieurs partenaires au cours des 12 derniers mois.

RH_1 Pourcentage de la population sexuellement active âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires sexuel(le)s ou plus au cours des 12 derniers mois et a utilisé un condom lors de la dernière relation.

Cet indicateur est rapporté également dans ce chapitre, mais seulement au niveau national vu que le nombre de personnes qui ont eu plusieurs partenaires au cours des 12 derniers mois est peu élevé dans notre échantillon et donc les résultats par rapport à cet indicateur doivent être pris avec précaution et ne sont pas interprétables par région. Cet indicateur a été sélectionné pour figurer sur la liste d'ONUSIDA, même s'il ne fournit pas de données

concernant le niveau d'utilisation systématique du condom. En effet, la méthode alternative qui consiste à demander si le préservatif a toujours/parfois/jamais été utilisé lors de rapports sexuels avec des partenaires occasionnel(le)s pendant une période déterminée est sujette à un biais de rappel (distorsion de mémoire). En outre, l'utilisation d'un préservatif lors du rapport sexuel le plus récent avec un(e) partenaire occasionnel(le) reflètera généralement une tendance à l'utiliser de manière régulière avec de tels partenaires.

Dépistage des IST

HI_2 Pourcentage de la population qui a eu recours à un test de dépistage d'une infection sexuellement transmissible au cours des 12 derniers mois parmi les 15-64 ans ayant déjà eu au moins une relation sexuelle.

Cet indicateur n'est pas analysé dans le texte, mais les résultats se trouvent dans les tableaux de base.

HI_3 Pourcentage de la population qui a eu recours à un test de dépistage d'une infection sexuellement transmissible au cours de la vie parmi les 15-64 ans ayant déjà eu au moins une relation sexuelle.

Ces deux indicateurs combinent les réponses des questions HI.02. sur le dépistage du HIV et HI.04. sur le dépistage d'une IST autre que le VIH.

Pratiques contraceptives

RH06_1 Pourcentage de femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans qui ont utilisé (elles-mêmes ou leur(s) partenaire(s)) un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois.

RH07_2 Distribution des types de contraception utilisés par les femmes de 15 à 49 sexuellement actives qui ont utilisé (elles-mêmes ou leur(s) partenaire(s)) un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois.

Au cas où une femme déclare avoir utilisé plusieurs méthodes de contraception différentes, seule la méthode la plus efficace est prise en compte. Pour l'évaluation de l'efficacité des méthodes contraceptives, nous nous sommes inspirés du site suivant : <http://www.plannedparenthood.org/bc/cchoices.html>. Si deux méthodes ont une efficacité similaire, celle qui a l'action la plus prolongée a été retenue. Si une méthode a été utilisée en combinaison avec la pilule du lendemain, seule cette dernière a été prise en compte en raison de son caractère particulier.

RÉSULTATS



1. Précocité de la première relation sexuelle

La précocité de la première relation sexuelle est un indicateur d'un comportement sexuel à risque pouvant augmenter les risques d'IST et de grossesses non planifiées. Les analyses suivantes portent sur les personnes âgées de 15 à 64 ans ayant eu au moins une relation sexuelle au cours de la vie.


1.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE

En 2018, 5,7% des personnes âgées de 15 à 64 ans qui ont eu au moins une relation sexuelle au cours de leur vie, ont eu leur première relation sexuelle avant l'âge de 15 ans.

Spécificités régionales

Le pourcentage de personnes qui ont eu leur première relation sexuelle avant l'âge de 15 ans est plus élevé en Région wallonne (7,5%) par rapport aux Régions flamande (4,8%) et bruxelloise (5,1%). Après standardisation pour l'âge et le sexe, seule la différence entre la Wallonie et la Flandre est statistiquement significative.

Figure 1 | Pourcentage de la population qui a eu sa première relation sexuelle avant l'âge de 15 ans parmi les 15-64 ans ayant déjà eu au moins une relation sexuelle au cours de la vie, par année et par région, Enquête de santé, Belgique 2018



1.2. ÉVOLUTION


Après standardisation pour l'âge et le sexe, le pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a eu sa première relation sexuelle avant l'âge de 15 ans est resté stable entre 2013 et 2018 (Figure 1).

1.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES

Au niveau national, les hommes sont plus nombreux que les femmes à avoir eu leur première relation sexuelle avant l'âge de 15 ans (6,7% contre 4,7%). Cette différence est surtout due à une différence significative selon le sexe parmi les 35-44 ans (8,5% contre 4,5%) et les 55-64 ans (3,8% contre 1,1%) (Figure 2).

L'âge a une influence significative sur la précocité de la première relation sexuelle. Les personnes de 15-44 ans (taux variant entre 6,6% et 8,7%) sont plus nombreuses à avoir eu une relation sexuelle précoce par rapport aux personnes plus âgées (2,4% des 55-64 ans). Ces différences sont statistiquement significatives après standardisation pour le sexe.

Figure 2 | Pourcentage de la population qui a eu sa première relation sexuelle avant l'âge de 15 ans parmi les 15-64 ans ayant déjà eu au moins une relation sexuelle au cours de la vie, par sexe, par âge et par région, Enquête de Santé, Belgique 2018



Spécificités régionales

Dans les trois régions, il n'y a pas de différence significative entre les hommes et les femmes par rapport à la précocité de la première relation sexuelle.

On note une différence selon l'âge dans les 3 régions, mais les tendances varient. En Flandre, les personnes de 25-44 (taux entre 5,8% et 8,0%) sont significativement plus nombreuses que les 55-64 ans (2,1%) à avoir eu une relation sexuelle précoce. A Bruxelles, les personnes de 15-24 ans (13,9%) sont significativement plus nombreuses que les 25 ans et plus (taux entre 3,5% et 5,0%) à avoir eu une relation sexuelle précoce. En Wallonie, les personnes de 15-44 (taux entre 8,9% et 13,1%) sont significativement plus nombreuses que les 55-64 ans (2,4%) à avoir eu une relation sexuelle précoce.

1.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES

Le niveau d'instruction a une influence sur la précocité sexuelle. Le pourcentage de personnes qui ont eu leur première relation sexuelle avant l'âge de 15 ans est plus élevé chez les personnes sans diplôme ou ayant au plus un diplôme d'études primaires (17,8%) par rapport aux diplômées du secondaire inférieur ou plus (taux variant entre 4,5% et 7,7%). Ces différences sont statistiquement significatives après standardisation pour l'âge et le sexe.

Spécificités régionales

En Flandre, il n'y a pas de différences selon le niveau d'éducation dans la précocité sexuelle, par contre on trouve des inégalités significatives dans les 2 autres régions. A Bruxelles, le pourcentage de personnes qui ont eu leur première relation sexuelle avant l'âge de 15 ans est moins élevé chez les diplômés de l'enseignement supérieur (3,5%) par rapport aux diplômés du secondaire inférieur ou moins (taux entre 12,6% et 12,9%). En Wallonie, les personnes ayant au moins un diplôme du secondaire inférieur sont moins précoces sexuellement (taux entre 5,7% et 8,2%) que les diplômés de l'enseignement primaire et les non-diplômés (26,7%).


2. Multipartenariat et utilisation du préservatif

Le nombre de partenaires est aussi un indicateur du comportement sexuel à risque, surtout dans le cas où les personnes qui ont plusieurs partenaires n'utilisent pas le préservatif d'une manière systématique. Les résultats concernant l'utilisation du préservatif parmi les multipartenaires doivent néanmoins être pris avec précaution, notamment au niveau régional, car le nombre de multipartenaires dans notre échantillon est peu élevé. Les analyses suivantes portent sur les personnes de 15 à 64 ans qui sont « sexuellement actives ». Ce terme désigne les personnes ayant eu au moins une relation sexuelle au cours des 12 derniers mois précédant l'enquête.

2.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE

En 2018, 10,0% de la population sexuellement active âgée de 15 à 64 ans a eu deux partenaires sexuel(le)s ou plus au cours des 12 derniers mois. Seulement 43,5% de ce groupe de population a utilisé un condom lors du dernier rapport sexuel.

Figure 3 | Pourcentage de la population sexuellement active âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires sexuel(le)s ou plus au cours des 12 derniers mois, par année et par région, Enquête de santé, Belgique 2018



Spécificités régionales

Il existe des différences régionales significatives par rapport au multipartenariat récent (Figure 3). Le pourcentage de personnes âgées de 15 à 64 ans qui ont eu deux partenaires sexuel(le)s ou plus au cours des 12 derniers mois est plus élevé en Région bruxelloise (14,3%) qu'en Régions flamande (9,3%) et wallonne (10,0%). Ces différences sont statistiquement significatives après standardisation pour l'âge et le sexe.

L'utilisation du préservatif chez les multipartenaires est aussi plus élevée à Bruxelles : 57,4% des multipartenaires bruxellois déclarent avoir utilisé un condom lors de la dernière relation sexuelle contre des taux de 39,8% des multipartenaires flamands et 44,0% des multipartenaires wallons. Après standardisation pour l'âge et le sexe, seule la différence entre Bruxelles et la Flandre est statistiquement significative.

2.2. ÉVOLUTION

Le pourcentage de personnes âgées de 15 à 64 ans qui ont eu deux partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois est resté stable en Belgique. On observe aussi un taux stable entre 2013 et 2018 pour l'utilisation du préservatif parmi les multipartenaires.

Spécificités régionales

Le taux de multipartenariat a augmenté de 6,6% à 9,3% en Région flamande, et cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe. Dans les deux autres régions, on ne trouve pas de différences significatives au cours du temps. On observe aussi, dans les trois régions, un taux stable entre 2013 et 2018 pour l'utilisation du préservatif parmi les multipartenaires.

2.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES

En Belgique, les hommes sont plus nombreux que les femmes à avoir eu deux partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois (12,1% contre 7,8%). De plus, parmi les multipartenaires, les hommes sont plus nombreux que les femmes à avoir utilisé un préservatif lors de la dernière relation sexuelle (51,2% contre 31,2%). Ces différences sont statistiquement significatives après standardisation pour l'âge.


Le multipartenariat récent est plus fréquemment rapporté par les jeunes : 27,0% chez les 15-24 ans contre des taux variant entre 3,5% et 13,7% chez les 25 ans et plus. Cette distribution par âge est similaire pour les hommes et les femmes (Figure 4). L'utilisation du préservatif chez les multipartenaires ne varie pas systématiquement par âge, excepté que les 45-54 ont un pourcentage moins élevé de personnes qui ont utilisé un préservatif lors de la dernière relation sexuelle (27,9%) que les plus jeunes (49,9% des 25-34 ans) et les plus âgés (55,0% des 55-64 ans). Ces différences sont statistiquement significatives après standardisation pour le sexe. On n'observe pas de différences significatives entre les 15-24 ans (41,0%) et les autres groupes d'âge.

Spécificités régionales

A Bruxelles et en Wallonie, les hommes sont significativement plus nombreux que les femmes à avoir eu deux partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois (17,4% des bruxellois contre 11,0% des bruxelloises ; 12,7% des wallons contre 7,4% des wallonnes), et ceci après standardisation pour l'âge. En Région flamande, on ne trouve pas de différences significatives selon le sexe. En ce qui concerne l'utilisation du préservatif lors de la dernière relation sexuelle, c'est seulement en Flandre que l'on trouve une différence significative selon le sexe (48,3% des hommes contre 26,7% des femmes).

Comme c'est le cas au niveau national, les jeunes, dans les trois régions, rapportent un taux plus élevé de multipartenariat récent que les groupes de personnes plus âgées. Par contre, on ne trouve pas, dans les trois régions, de différences systématiques selon l'âge dans l'utilisation du préservatif lors de la dernière relation sexuelle chez les multipartenaires.

Figure 4 | Pourcentage de la population sexuellement active âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires sexuel(le)s ou plus au cours des 12 derniers mois, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018



2.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES

En Belgique, le pourcentage de personnes qui ont eu deux partenaires ou plus au cours des 12 derniers mois varie selon le niveau d'instruction. Les personnes moins instruites rapportent plus fréquemment avoir eu plusieurs partenaires que les personnes ayant un diplôme de l'enseignement supérieur : 16,4% des diplômés du secondaire inférieur et 11,6% des diplômés du secondaire supérieur contre 8,1% des diplômés de l'enseignement supérieur. Ces différences sont statistiquement significatives après standardisation pour l'âge et le sexe. Il n'y a, par contre, pas de différence selon le niveau d'instruction en ce qui concerne l'utilisation du préservatif lors de la dernière relation sexuelle.

Spécificités régionales

A Bruxelles, le multipartenariat récent ne varie pas selon le niveau d'instruction, mais en Flandre et en Wallonie, comme pour le pays dans son ensemble, le multipartenariat est plus élevé parmi les moins instruits. De plus, on trouve en Flandre et en Wallonie, quelques différences (mais sans tendance claire) selon le niveau d'instruction dans l'utilisation du préservatif parmi les multipartenaires. Néanmoins, ces résultats doivent être pris avec précaution vu la taille de l'échantillon (143 personnes en Flandre, 131 à Bruxelles, 153 en Wallonie).

3. Recours au test de dépistage des IST


3.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE

En Belgique, 38,4% des personnes âgées de 15 à 64 ans ayant déjà eu au moins une relation sexuelle déclarent avoir effectué un test de dépistage d'une IST au cours de la vie.

Spécificités régionales

Le pourcentage de la population qui a effectué un test de dépistage d'une IST au cours de la vie varie significativement entre les régions (Figure 5) : ce pourcentage est le plus élevé en Région bruxelloise (58,7%), ensuite en Région wallonne (41,8%) et finalement en Région flamande (33,1%). Les différences entre les trois régions sont significatives après standardisation pour l'âge et le sexe.

Figure 5 | Pourcentage de la population qui a eu recours à un test de dépistage d'une infection sexuellement transmissible au cours de la vie parmi les 15-64 ans ayant déjà eu au moins une relation sexuelle, par région, Enquête de santé, Belgique 2018



3.2. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES


Le recours au test de dépistage au cours des 12 derniers mois est significativement plus élevé chez les femmes (42,9%) que chez les hommes (33,9%). Cette différence se manifeste surtout parmi les 25-34 ans, probablement liée au dépistage dans le contexte d'une grossesse.

Les personnes âgées de 25-44 ans sont plus nombreuses à déclarer s'être fait dépister que les plus jeunes ou les plus âgées : des taux entre 46,8% et 48,4% chez les 25-44 ans contre 25,6% des 15-24 ans et 25,0% à 39,7% chez les 45-64 ans. Ces différences sont significatives après standardisation pour le sexe.

Spécificités régionales

Le recours au test de dépistage est significativement plus élevé chez les femmes que chez les hommes, sauf à Bruxelles. Les différences selon le sexe se manifestent chez les 25-34 en Région flamande et les 25-44 ans en Région wallonne. En ce qui concerne l'âge, dans les trois régions, les personnes de 25-44 ans déclarent, généralement, plus souvent s'être fait dépister.

Figure 6 | Pourcentage de la population qui a eu recours à un test de dépistage d'une infection sexuellement transmissible au cours de la vie parmi les 15-64 ans ayant déjà eu au moins une relation sexuelle, par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018



3.3. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES

Le pourcentage de personnes ayant eu recours à un test de dépistage varie selon le niveau d'instruction : les personnes ayant un diplôme de l'enseignement supérieur (44,2%) se font plus souvent dépister que les moins diplômées (24,0% des personnes ayant un diplôme du secondaire inférieur et 32,3% de celles ayant un diplôme du secondaire supérieur). Ces différences sont significatives après standardisation pour l'âge et le sexe.

Spécificités régionales

Dans les trois régions le recours à un test de dépistage varie selon le niveau d'instruction : les personnes ayant un diplôme de l'enseignement supérieur ont plus souvent recours au dépistage d'un IST que les moins diplômées. Ces différences sont significatives après standardisation pour l'âge et le sexe.

4. Pratiques contraceptives chez les femmes

Dans le cas où une femme déclare avoir utilisé plusieurs méthodes de contraception différentes (par exemple la pilule et le condom), seule la méthode la plus efficace est prise en compte. Pour l'évaluation de l'efficacité des méthodes contraceptives, nous nous sommes basés sur le site suivant :


<http://www.plannedparenthood.org/bc/cchoices.html>.

Si deux méthodes ont une efficacité similaire, celle qui a l'action la plus prolongée a été retenue. Si une méthode a été utilisée en combinaison avec la pilule du lendemain, seule cette dernière a été prise en compte en raison de son caractère particulier. Les indicateurs suivants portent sur les femmes âgées de 15 à 49 ans qui sont « sexuellement actives ». Ce terme désigne les personnes ayant eu au moins une relation sexuelle au cours des 12 mois précédant l'enquête.

4.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE

En 2018, 83,8% des femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans (ou leur(s) partenaire(s)) ont utilisé un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois. Parmi celles qui ont utilisé un moyen de contraception, la pilule reste la méthode la plus utilisée (48,1%) suivie par le stérilet (25,8%), la stérilisation (8,3%), les méthodes de barrière (préservatif, diaphragme, spermicide, éponge) (8,1%) et le patch ou anneau vaginal (3,6%), l'implant ou contraceptif injectable (3,1%), les autres méthodes comme l'abstinence périodique ou le coït interrompu (1,7%), et la pilule du lendemain (1,2%).

Figure 7 | Pourcentage de femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans qui ont utilisé (elles-mêmes ou leur(s) partenaire(s)) un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois, par année et par région, Enquête de santé, Belgique 2018



Spécificités régionales


L'utilisation d'un moyen de contraception parmi les femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans est plus élevée en Régions flamande et wallonne (respectivement 84,7% et 84,6%) qu'en Région bruxelloise (76,1%) (Figure 7). Ces différences sont statistiquement significatives après standardisation pour l'âge.

On observe aussi quelques différences régionales significatives, après standardisation pour l'âge, dans le type de contraception (Figure 8) :

- L'utilisation du patch ou de l'anneau vaginal est plus fréquente en Régions bruxelloise (4,3%) et wallonne (6,3%) par rapport à la Région flamande (1,9%).
- L'utilisation de la pilule du lendemain est plus fréquente en Région bruxelloise (3,7%) par rapport à la Région flamande (0,4%).
- L'utilisation des méthodes de barrière est plus fréquente en Région bruxelloise (15,0%) par rapport à la Région flamande (6,2%) et à la Région wallonne (8,2%).

- L'utilisation de la stérilisation est plus fréquente en Région flamande (11,2%) par rapport à la Région bruxelloise (2,3%) et la Région wallonne (4,9%).

Figure 8 | Distribution des types de contraception utilisés par les femmes sexuellement actives qui ont utilisé (elles-mêmes ou leur(s) partenaire(s)) un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois, par région, Enquête de santé, Belgique 2018




4.2. ÉVOLUTION

L'utilisation d'un moyen de contraception a significativement augmenté avec le temps. Il n'y a pas de différence entre 2001 (75,5%) et 2004 (74,4%), mais on détecte une augmentation en 2013 (78,4%), et une nouvelle augmentation en 2018 (83,8%) (Figure 7). Ces différences sont statistiquement significatives après standardisation pour l'âge.

Par rapport aux méthodes de contraception utilisées (Figure 9), on détecte des différences significatives après standardisation pour l'âge dans les cas suivants :

- Utilisation de la pilule : les taux sont restés stables entre 2001 (63,2%) et 2004 (60,3%), pour diminuer à 54,2% en 2013 et continuer à diminuer jusqu'à 48,1% en 2018.
- Utilisation du stérilet : les taux sont restés stables entre 2001 (10,1%) et 2004 (13,3%), pour augmenter en 2013 (20,1%) et continuer à augmenter en 2018 (25,8%).
- Utilisation du patch ou de l'anneau vaginal : les taux sont restés stables entre 2001 (0,0%) et 2004 (1,9%), pour augmenter en 2013 (4,9%) et rester stables en 2018 (3,6%).
- Utilisation de l'implant ou contraceptif injectables : les taux ont augmenté entre les années 2001 (1,0%) et 2018 (3,1%).
- Utilisation de la pilule du lendemain, même si les proportions restent très faibles : les taux sont restés stables entre 2001 (0,5%) et 2004 (1,0%) pour augmenter en 2013 (3,1%) mais diminuer de nouveau en 2018 (1,2%).
- Utilisation de la stérilisation : les taux sont restés stables entre 2001 (14,0%) et 2004 (12,1%) pour diminuer en 2013 (6,4%) et rester stables en 2018 (8,3%).

Figure 9 | Distribution des types de contraception utilisés par les femmes sexuellement actives qui ont utilisé (elles-mêmes ou leur(s) partenaire(s)) un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois, par année, Enquête de santé, Belgique 2018



Spécificités régionales

En Flandre, le pourcentage de femmes qui a utilisé un moyen de contraception est resté stable entre 2001 (74,7%) et 2004 (74,1%) pour augmenter en 2013 (78,1%) et continuer à augmenter en 2018 (84,7%). De même, en Wallonie on détecte une augmentation entre 2001-2004 (respectivement 77,1% et 75,3%) et 2018 (84,6%). Par contre, à Bruxelles, il n'y a pas eu de changement significatif au cours du temps.

- Dans les trois régions, on observe une diminution dans l'utilisation de la pilule entre 2001/2004 et 2018.
- En Flandre et à Bruxelles, l'utilisation du patch ou anneau vaginal augmente entre 2004 et 2013 pour en 2018 diminuer en Flandre, et rester stable à Bruxelles. Pas de changement en Wallonie.
- Dans les trois régions, on observe une augmentation dans l'utilisation du stérilet au cours du temps. A Bruxelles, par contre, l'augmentation entre 2013 et 2018 n'est pas significative car l'utilisation de ce moyen de contraception était déjà élevée en 2013.
- En Flandre et en Wallonie, la stérilisation a diminué entre 2001 et 2013 pour ensuite rester stable en 2018.

4.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES


Le pourcentage de femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans qui utilisent un moyen de contraception diminue significativement avec l'âge : 93,5% des 15-24 ans contre 76,4% des 45-49 ans.

Les méthodes de contraception choisies varient aussi avec l'âge (Figure 10).

- La pilule est la méthode de prédilection chez les jeunes femmes avec une prévalence de 73,8% chez les femmes âgées de 15 à 24 ans. Ce pourcentage commence à diminuer significativement déjà parmi les 25-34 ans (55,1%) pour laisser la place à d'autres moyens de contraception.
- Le stérilet commence à prendre son essor parmi les 25-34 ans (21,4%) et devient très répandu parmi les 35 ans et plus (32,5% pour les 35-44 ans, 37,9% pour les 45-49 ans).

- Les méthodes de barrière sont moins fréquentes parmi les jeunes (2,4% chez les 15-24 ans contre des taux variant entre 7,6% et 10,6% chez les 25 ans et plus).
- La stérilisation est plus répandue parmi les 35 ans et plus (13,2% chez les 35-44 ans et 14,4% chez les 45-49 ans).
- La contraception d'urgence (pilule du lendemain) est plus élevée parmi les jeunes femmes de 15 à 34 ans (3,5% chez les 15-24 ans contre des taux de 0,1% et 0,5% chez les 35 ans et plus).

Figure 10 | Distribution des types de contraception utilisés par les femmes sexuellement actives qui ont utilisé (elles-mêmes ou leur(s) partenaire(s)) un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois, par âge, Enquête de santé, Belgique 2018



Spécificités régionales

Dans les trois régions, le pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans sexuellement actives qui utilisent un moyen de contraception diminue significativement avec l'âge. En ce qui concerne les méthodes utilisées, les tendances suivantes sont significatives :

- L'utilisation de la pilule diminue avec l'âge dans les 3 régions, néanmoins à Bruxelles les différences selon l'âge ne sont pas significatives.
- L'utilisation du stérilet augmente avec l'âge dans les trois régions.
- L'utilisation de la pilule du lendemain diminue avec l'âge, mais c'est seulement à Bruxelles que les différences sont significatives.
- Les méthodes de barrière augmentent avec l'âge, mais les différences ne sont significatives qu'en Flandre.
- La stérilisation augmente avec l'âge dans les trois régions.

4.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES

L'utilisation d'un moyen de contraception est plus fréquente parmi les femmes ayant un diplôme de l'enseignement supérieur (87,2%) par rapport aux niveaux d'instruction moins élevés (taux allant de 56,2% à 80,3%). Ces différences sont statistiquement significatives après standardisation pour l'âge. Parmi les

différentes méthodes étudiées, seules deux méthodes présentent des différences significatives selon le niveau d'instruction :

- La pilule est plus fréquemment utilisée parmi les diplômés du secondaire supérieur (55,8%) par rapport aux diplômés de l'enseignement supérieur (42,7%).
- Au contraire, le patch ou l'anneau vaginal est moins fréquemment utilisé parmi les diplômés du secondaire supérieur (1,4%) par rapport aux diplômés de l'enseignement supérieur (4,8%).

C'est important de souligner ici que les résultats en ce qui concerne la distribution selon le niveau d'instruction doivent être interprétés avec précaution vu le nombre limité de femmes dans les niveaux d'instruction peu élevés. Pour cette même raison, nous ne présenterons pas les résultats au niveau régional.

5. Tableaux de synthèse

Tableau 1. Évolution de la santé sexuelle en Belgique 2001-2018

	2001	2004	2008	2013	2018
Pourcentage la population de 15 à 64 ans qui ...					
a eu des relations sexuelles au cours des 12 derniers mois	83,3	80,2	-	82,1	77,1
a eu sa première relation sexuelle avant l'âge de 15 ans	-	-	-	5,1	5,7
a eu deux partenaires sexuel(le)s ou plus au cours des 12 derniers mois	-	-	-	8,6	10,0
a eu recours à un test de dépistage d'une IST au cours des 12 derniers mois	-	-	-	-	7,8
a eu recours à un test de dépistage d'une IST au cours de la vie	-	-	-	-	38,4
Parmi la population âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires sexuel(le)s ou plus au cours des 12 derniers mois, pourcentage qui ...					
a utilisé un condom lors de la dernière relation	-	-	-	40,7	43,5
Pourcentage de femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans qui ...					
ont utilisé (elles-mêmes ou leur(s) partenaire(s)) un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois	75,5	74,4	-	78,4	83,8
Méthodes de contraception utilisées parmi les femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans qui ont utilisé un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois					
Pilule	63,2	60,3	-	54,2	48,1
Patch ou anneau vaginal	0,0	1,9	-	4,9	3,6
Implant ou contraceptif injectables	1,0	1,6	-	1,9	3,1
Stérilet	10,1	13,3	-	20,1	25,8
Pilule du lendemain	0,5	1,0	-	3,1	1,2
Méthodes de barrière : diaphragme, spermicide, éponge, condom	9,8	8,2	-	8,3	8,1
Stérilisation	14,0	12,1	-	6,4	8,3
Autres méthodes : abstinence, coït interrompu	1,4	1,7	-	1,2	1,7

Source : Enquête de Santé, Belgique, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018

Tableau 2. Évolution de la santé sexuelle en Région flamande 2001-2018

	2001	2004	2008	2013	2018
Pourcentage la population de 15 à 64 ans qui ...					
a eu des relations sexuelles au cours des 12 derniers mois	83,8	81,9	-	83,7	76,8
a eu sa première relation sexuelle avant l'âge de 15 ans	-	-	-	4,3	4,8
a eu deux partenaires sexuel(le)s ou plus au cours des 12 derniers mois	-	-	-	6,6	9,3
a eu recours à un test de dépistage d'une IST au cours des 12 derniers mois	-	-	-	-	5,8
a eu recours à un test de dépistage d'une IST au cours de la vie	-	-	-	-	33,1
Parmi la population âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires sexuel(le)s ou plus au cours des 12 derniers mois, pourcentage qui ...					
a utilisé un condom lors de la dernière relation	-	-	-	38,6	39,8
Pourcentage de femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans qui ...					
ont utilisé (elles-mêmes ou leur(s) partenaire(s)) un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois	74,7	74,1	-	78,2	84,7
Méthodes de contraception utilisées parmi les femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans qui ont utilisé un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois					
Pilule	62,3	54,0	-	52,9	46,0
Patch ou anneau vaginal	0,0	1,7	-	4,2	1,9
Implant ou contraceptif injectables	0,9	1,7	-	1,4	3,3
Stérilet	7,2	13,7	-	19,8	27,4
Pilule du lendemain	0,2	0,8	-	2,6	0,4
Méthodes de barrière : diaphragme, spermicide, éponge, condom	9,7	10,0	-	8,7	8,2
Stérilisation	18,4	15,6	-	8,9	11,2
Autres méthodes : abstinence, coït interrompu	1,3	2,5	-	1,5	1,7

Source : Enquête de Santé, Belgique, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018

Tableau 3. Évolution de la santé sexuelle en Région bruxelloise 2001-2018

	2001	2004	2008	2013	2018
Pourcentage la population de 15 à 64 ans qui ...					
a eu des relations sexuelles au cours des 12 derniers mois	79,1	73,5	-	77,4	74,2
a eu sa première relation sexuelle avant l'âge de 15 ans	-	-	-	6,1	5,1
a eu deux partenaires sexuel(le)s ou plus au cours des 12 derniers mois	-	-	-	17,9	14,3
a eu recours à un test de dépistage d'une IST au cours des 12 derniers mois	-	-	-	-	16,7
a eu recours à un test de dépistage d'une IST au cours de la vie	-	-	-	-	58,7
Parmi la population âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires sexuel(le)s ou plus au cours des 12 derniers mois, pourcentage qui ...					
a utilisé un condom lors de la dernière relation	-	-	-	50,1	57,4
Pourcentage de femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans qui ...					
ont utilisé (elles-mêmes ou leur(s) partenaire(s)) un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois	75,0	73,0	-	78,9	76,1
Méthodes de contraception utilisées parmi les femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans qui ont utilisé un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois					
Pilule	68,8	69,1	-	53,2	45,6
Patch ou anneau vaginal	0,0	1,7	-	9,2	4,3
Implant ou contraceptif injectables	1,5	2,1	-	1,9	3,2
Stérilet	13,4	9,3	-	12,7	22,4
Pilule du lendemain	1,2	2,8	-	6,5	3,7
Méthodes de barrière : diaphragme, spermicide, éponge, condom	10,9	9,6	-	12,8	15,0
Stérilisation	3,5	4,6	-	1,7	2,3
Autres méthodes : abstinence, coït interrompu	1,9	0,9	-	2,0	3,4

Source : Enquête de Santé, Belgique, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018

Tableau 4. Évolution de la santé sexuelle en Région wallonne 2001-2018

	2001	2004	2008	2013	2018
Pourcentage la population de 15 à 64 ans qui ...					
a eu des relations sexuelles au cours des 12 derniers mois	83,9	81,9	-	83,7	76,8
a eu sa première relation sexuelle avant l'âge de 15 ans	-	-	-	6,3	7,5
a eu deux partenaires sexuel(le)s ou plus au cours des 12 derniers mois	-	-	-	10,5	10,0
a eu recours à un test de dépistage d'une IST au cours des 12 derniers mois	-	-	-	-	8,6
a eu recours à un test de dépistage d'une IST au cours de la vie	-	-	-	-	41,8
Parmi la population âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires sexuel(le)s ou plus au cours des 12 derniers mois, pourcentage qui ...					
a utilisé un condom lors de la dernière relation	-	-	-	39,4	44,0
Pourcentage de femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans qui ...					
ont utilisé (elles-mêmes ou leur(s) partenaire(s)) un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois	77,1	75,3	-	78,6	84,6
Méthodes de contraception utilisées parmi les femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans qui ont utilisé un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois					
Pilule	63,4	69,5	-	57,0	52,4
Patch ou anneau vaginal	0,0	2,4	-	5,2	6,3
Implant ou contraceptif injectables	1,1	1,3	-	2,7	2,9
Stérilet	14,4	13,4	-	22,8	24,1
Pilule du lendemain	0,9	1,0	-	3,2	1,9
Méthodes de barrière : diaphragme, spermicide, éponge, condom	9,6	4,5	-	6,1	6,2
Stérilisation	8,7	7,7	-	2,8	4,9
Autres méthodes : abstinence, coït interrompu	1,9	0,3	-	0,2	1,3

Source : Enquête de Santé, Belgique, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018

SYNTHÈSE ET CONCLUSION



L'intérêt porté à la santé sexuelle dans l'enquête de santé est en grande partie dû à ses conséquences graves en termes d'IST et de grossesses non planifiées.

Situation en Belgique selon les données de l'enquête de santé 2018

Deux comportements sexuels à risque sont examinés dans le cadre cette enquête : la précocité des relations sexuelles et le multipartenariat récent. Les résultats montrent qu'en 2018 la précocité sexuelle n'est pas très répandue dans la population en Belgique avec un taux de 5,7% de participants qui déclarent avoir eu leur première relation sexuelle avant l'âge de 15 ans. Un taux qui est resté stable depuis 2013. Il est possible, néanmoins, que ce chiffre soit une sous-estimation à cause de la sensibilité du sujet et d'un biais de mémoire. Le multipartenariat récent est plus prévalent, avec un taux de 10,0% de la population, mais le fait alarmant ici c'est que seulement 43,5% de ce groupe de personnes à risque plus élevé pour une IST, ont utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel, un taux qui n'a pas évolué au cours du temps. Par rapport aux différences régionales, les résultats varient selon le comportement en question : la précocité sexuelle est plus élevée en Région wallonne, tandis que le multipartenariat récent et le dépistage sont plus élevés à Bruxelles.

En plus des comportements sexuels à risque, l'enquête de santé a examiné l'usage de la contraception chez les femmes âgées de 15 à 49 ans ainsi que son évolution au cours du temps. Les analyses montrent que la couverture contraceptive en Belgique est assez étendue avec plus de 8 femmes sur 10 dans le groupe étudié qui déclarent utiliser un moyen de contraception, et que le taux a augmenté depuis 2013. Cette augmentation peut être due à une vraie tendance ou au changement apporté au questionnaire de 2018 où nous avons prévu pour la première fois une catégorie pour les femmes non-concernées par la contraception. Les méthodes de contraception ont fortement évolué dans le temps, la pilule reste en 2018 la méthode la plus populaire en Belgique, mais elle a été, depuis 2004, progressivement remplacée en partie par d'autres moyens de contraception, surtout le stérilet. La pilule est populaire parmi les jeunes, mais son utilisation diminue avec l'âge, au profit d'autres méthodes, surtout le stérilet, la stérilisation et les méthodes de barrière. Par rapport aux différences régionales, les bruxelloises ont un taux de contraception moins élevé que les wallonnes et les flamandes, et un profil quelque peu différent par rapport aux moyens utilisés (utilisation plus fréquente de la pilule du lendemain, des méthodes de barrière et du patch ou anneau vaginal).

Populations cibles et recommandations

L'enquête de santé de 2013 a permis d'identifier deux sous-groupes qui peuvent avoir des pratiques sexuelles à haut risque : les jeunes et les personnes ayant un niveau d'éducation peu élevé. En 2018, la situation a peu évolué pour ces deux sous-groupes.

Même si les jeunes (15-24 ans) ne sont plus en 2018 plus précoces sexuellement que les groupes plus âgés (excepté les 55-64 ans), ils sont quand même toujours plus nombreux à avoir eu plusieurs partenaires sexuels dans l'année. Notons aussi que l'utilisation du préservatif chez les personnes ayant eu plusieurs partenaires dans l'année n'est pas plus fréquente en 2018 qu'en 2013, et reste donc peu répandue (41,0%) au sein de ce groupe à risque. Nos résultats ont montré aussi que le recours au dépistage des IST est moins fréquent parmi les jeunes, mais ce résultat est dû au fait que l'indicateur concerne le dépistage au cours de la vie. Lorsque l'on considère le dépistage au cours des 12 derniers mois (voir tableaux à la fin de ce rapport), les jeunes de 15-24 ans ont autant eu recours au dépistage que les 25-34 ans.

Ces résultats parmi les jeunes sont important à considérer surtout que depuis le début des années 2000, on observe en Belgique une augmentation importante des IST, particulièrement marquée parmi les jeunes femmes

de 15-29 ans en ce qui concerne la chlamydia, l'IST la plus répandue. Dans ce contexte, il est important de se focaliser sur les jeunes pour des actions de sensibilisation, et le système scolaire peut avoir un rôle important à jouer.

En 2013, les données de l'enquête de santé ont montré une relation entre le niveau d'instruction et les comportements sexuels à risque. Ceci est toujours le cas en 2018 : les personnes moins instruites déclarent plus souvent avoir eu des relations sexuelles précoces et avoir eu plusieurs partenaires dans l'année que les plus instruites. Nous avons également trouvé des différences sociales importantes dans le recours au dépistage. Une association entre le statut socio-économique et les comportements sexuels à risque a déjà été démontrée dans la littérature (Palmer et al., 2019). De plus, on observe aussi une différence selon le statut socio-économique en ce qui concerne la contraception : les femmes moins instruites sont moins nombreuses à utiliser un moyen de contraception.

Donc, les personnes ayant un statut socio-économique peu élevé sont aussi à cibler pour des actions de prévention IST, mais aussi pour la prévention des grossesses non planifiées. Une étude réalisée par les Mutualités Libres a révélé que le risque de tomber enceinte à un jeune âge est relativement plus élevé pour les femmes en situation socio-économique précaire, et que ces femmes sont moins susceptibles d'utiliser de moyens de contraception¹. L'étude a conclu que les différences en termes de contraception ne sont pas uniquement financières, mais liées à l'éducation sexuelle.

¹ <https://www.mloz.be/fr/content/sante-sexuelle-de-nos-ados>

RÉFÉRENCES



- (1) Blouin, K., Allard, P., Parent, R., Bitera, R., Noël, L., Goggin, P., Macrisopoulos, P., 2012. Rapport intégré : Épidémiologie des infections transmissibles sexuellement par le sang au Québec. Montréal.
- (2) de Irala, J., Osorio, A., Carlos, S., Ruiz-Canela, M., López-del Burgo, C., 2011. Mean age of first sex: do they know what we mean? *Arch. Sex. Behav.* 40, 853–5. <https://doi.org/10.1007/s10508-011-9779-4>
- (3) OMS, 2019. Santé sexuelle et génésique : Définition [WWW Document]. URL <http://www.euro.who.int/fr/health-topics/Life-stages/sexual-and-reproductive-health/news/news/2011/06/sexual-health-throughout-life/definition> (accessed 9.3.19).
- (4) OMS, 2018. La grossesse chez les adolescentes [WWW Document]. URL <https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy> (accessed 9.3.19).
- (5) Palmer, M., Clarke, L., Ploubidis, G., Wellings, K., 2019. Prevalence and correlates of “sexual competence” at first heterosexual intercourse among young people in Britain. *BMJ Sex. Reprod. Heal.* 45, 127. <https://doi.org/10.1136/bmjsex-2018-200160>
- (6) Vanden Berghe, W., Crucitti, T., De Baetselier, I., 2016. Surveillance des infections sexuellement transmissibles. Brussels.
- (7) Wellings, K., Mitchell, K., Collumbien, M., 2012. *Sexual health : a public health perspective*. McGraw Hill/Open University Press, London.

LISTE DES TABLEAUX

Tableau B 1.	Pourcentage de la population âgée de 15 à 64 ans qui a eu des relations sexuelles au cours des 12 derniers mois, Belgique.....	34
Tableau B 2.	Pourcentage de la population qui a eu sa première relation avant l'âge de 15 ans parmi les 15-64 ans qui ont déjà eu des relations sexuelles au cours de la vie, Belgique	35
Tableau B 3.	Pourcentage de la population sexuellement active âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois, Belgique	36
Tableau B 4.	Pourcentage de la population sexuellement active âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois et utilisé un condom lors de la dernière relation, Belgique	37
Tableau B 5.	Pourcentage de la population qui a eu recours à un test de dépistage d'une infection sexuellement transmissible au cours des 12 derniers mois parmi les 15-64 ans ayant déjà eu au moins une relation sexuelle, Belgique	38
Tableau B 6.	Pourcentage de la population qui a eu recours à un test de dépistage d'une infection sexuellement transmissible au cours de la vie parmi les 15-64 ans ayant déjà eu au moins une relation sexuelle, Belgique.....	39
Tableau B 7.	Pourcentage de femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans qui ont utilisé (elles-mêmes ou leur(s) partenaire(s)) un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois, Belgique	40
Tableau B 8.	Distribution des types de contraception utilisés par les femmes de 15 à 49 ans sexuellement actives qui ont utilisé un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois, Belgique	42
Tableau B 9.	Pourcentage de la population âgée de 15 à 64 ans qui a eu des relations sexuelles au cours des 12 derniers mois, Région flamande	44
Tableau B 10.	Pourcentage de la population qui a eu sa première relation avant l'âge de 15 ans parmi les 15-64 ans qui ont déjà eu des relations sexuelles au cours de la vie, Région flamande.....	45
Tableau B 11.	Pourcentage de la population sexuellement active âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois, Région flamande	46
Tableau B 12.	Pourcentage de la population sexuellement active âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois et utilisé un condom lors de la dernière relation, Région flamande	47
Tableau B 13.	Pourcentage de la population qui a eu recours à un test de dépistage d'une infection sexuellement transmissible au cours des 12 derniers mois parmi les 15-64 ans ayant déjà eu au moins une relation sexuelle, Région flamande.....	48
Tableau B 14.	Pourcentage de la population qui a eu recours à un test de dépistage d'une infection sexuellement transmissible au cours de la vie parmi les 15-64 ans ayant déjà eu au moins une relation sexuelle, Région flamande	49
Tableau B 15.	Pourcentage de femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans qui ont utilisé (elles-mêmes ou leur(s) partenaire(s)) un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois, Région flamande.....	50
Tableau B 16.	Distribution des types de contraception utilisés par les femmes de 15 à 49 ans sexuellement actives qui ont utilisé un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois, Région flamande.....	51
Tableau B 17.	Pourcentage de la population âgée de 15 à 64 ans qui a eu des relations sexuelles au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise	52
Tableau B 18.	Pourcentage de la population qui a eu sa première relation avant l'âge de 15 ans parmi les 15-64 ans qui ont déjà eu des relations sexuelles au cours de la vie, Région bruxelloise	53
Tableau B 19.	Pourcentage de la population sexuellement active âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise.....	54
Tableau B 20.	Pourcentage de la population sexuellement active âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois et utilisé un condom lors de la dernière relation, Région bruxelloise	55

Tableau B 21.	Pourcentage de la population qui a eu recours à un test de dépistage d'une infection sexuellement transmissible au cours des 12 derniers mois parmi les 15-64 ans ayant déjà eu au moins une relation sexuelle, Région bruxelloise	56
Tableau B 22.	Pourcentage de la population qui a eu recours à un test de dépistage d'une infection sexuellement transmissible au cours de la vie parmi les 15-64 ans ayant déjà eu au moins une relation sexuelle, Région bruxelloise	57
Tableau B 23.	Pourcentage de femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans qui ont utilisé (elles-mêmes ou leur(s) partenaire(s)) un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise	58
Tableau B 24.	Distribution des types de contraception utilisés par les femmes de 15 à 49 ans sexuellement actives qui ont utilisé un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise	59
Tableau B 25.	Pourcentage de la population âgée de 15 à 64 ans qui a eu des relations sexuelles au cours des 12 derniers mois, Région wallonne	60
Tableau B 26.	Pourcentage de la population qui a eu sa première relation avant l'âge de 15 ans parmi les 15-64 ans qui ont déjà eu des relations sexuelles au cours de la vie, Région wallonne	61
Tableau B 27.	Pourcentage de la population sexuellement active âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois, Région wallonne.....	62
Tableau B 28.	Pourcentage de la population sexuellement active âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois et utilisé un condom lors de la dernière relation, Région wallonne	63
Tableau B 29.	Pourcentage de la population qui a eu recours à un test de dépistage d'une infection sexuellement transmissible au cours des 12 derniers mois parmi les 15-64 ans ayant déjà eu au moins une relation sexuelle, Région wallonne	64
Tableau B 30.	Pourcentage de la population qui a eu recours à un test de dépistage d'une infection sexuellement transmissible au cours de la vie parmi les 15-64 ans ayant déjà eu au moins une relation sexuelle, Région wallonne	65
Tableau B 31.	Pourcentage de femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans qui ont utilisé (elles-mêmes ou leur(s) partenaire(s)) un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois, Région wallonne	66
Tableau B 32.	Distribution des types de contraception utilisés par les femmes de 15 à 49 ans sexuellement actives qui ont utilisé un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois, Région wallonne	68

Tableau B 1. Pourcentage de la population âgée de 15 à 64 ans qui a eu des relations sexuelles au cours des 12 derniers mois, Belgique

RH03_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	79,2	(77,1-81,3)	80,9	(78,6-82,9)	2705
	Femme	75,0	(72,8-77,2)	76,2	(73,9-78,4)	2953
GROUPE D'AGE	15 - 24	50,2	(45,1-55,4)	50,2	(45,0-55,3)	704
	25 - 34	88,2	(85,2-91,2)	88,4	(85,1-91,0)	1013
	35 - 44	87,9	(85,3-90,6)	88,0	(85,1-90,4)	1230
	45 - 54	80,4	(77,4-83,4)	80,5	(77,3-83,3)	1368
	55 - 64	71,5	(68,0-75,0)	71,7	(68,1-75,0)	1343
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	49,3	(38,5-60,1)	52,9	(40,9-64,5)	171
	Secondaire inférieur	68,5	(62,4-74,5)	69,7	(63,0-75,7)	491
	Secondaire supérieur	75,6	(72,5-78,6)	77,5	(74,2-80,5)	1752
	Enseignement supérieur	80,8	(78,7-82,8)	81,9	(79,9-83,8)	3144
REGION	Région flamande	76,8	(74,5-79,1)	78,2	(75,7-80,6)	2245
	Région bruxelloise	74,2	(71,3-77,0)	73,7	(70,5-76,6)	1352
	Région wallonne	78,5	(75,6-81,4)	80,7	(77,9-83,3)	2061
ANNEE	2001	83,3	(82,2-84,5)	84,9	(83,7-86,0)	7091
	2004	80,2	(78,8-81,7)	81,7	(80,2-83,1)	6269
	2013	82,1	(80,6-83,7)	83,6	(82,0-85,1)	4734
	2018	77,1	(75,4-78,7)	78,8	(77,1-80,4)	5658

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 2. Pourcentage de la population qui a eu sa première relation avant l'âge de 15 ans parmi les 15-64 ans qui ont déjà eu des relations sexuelles au cours de la vie, Belgique

RH02_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	6,7	(5,2-8,3)	6,5	(5,1-8,2)	2396
	Femme	4,7	(3,5-6,0)	4,6	(3,6-5,9)	2678
GROUPE D'AGE	15 - 24	8,7	(5,3-12,0)	8,5	(5,7-12,5)	411
	25 - 34	8,2	(5,2-11,2)	8,2	(5,6-11,7)	950
	35 - 44	6,6	(4,7-8,4)	6,5	(4,9-8,6)	1165
	45 - 54	4,8	(2,7-6,9)	4,8	(3,1-7,3)	1286
	55 - 64	2,4	(1,3-3,6)	2,4	(1,5-3,8)	1262
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	17,8	(8,2-27,5)	19,0	(10,7-31,7)	146
	Secondaire inférieur	7,7	(2,6-12,9)	7,9	(4,1-14,6)	432
	Secondaire supérieur	6,6	(4,8-8,4)	6,2	(4,7-8,2)	1555
	Enseignement supérieur	4,5	(3,3-5,7)	4,2	(3,2-5,5)	2851
REGION	Région flamande	4,8	(3,6-6,0)	4,6	(3,6-5,9)	2008
	Région bruxelloise	5,1	(3,6-6,6)	4,6	(3,3-6,2)	1210
	Région wallonne	7,5	(5,3-9,7)	7,3	(5,4-9,7)	1856
ANNEE	2013	5,1	(4,1-6,0)	4,9	(4,0-5,9)	4335
	2018	5,7	(4,7-6,8)	5,5	(4,6-6,6)	5074

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 3. Pourcentage de la population sexuellement active âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois, Belgique

RH04_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	12,1	(10,2-14,0)	11,4	(9,6-13,5)	2088
	Femme	7,8	(6,3-9,4)	7,1	(5,8-8,7)	2191
GROUPE D'AGE	15 - 24	27,0	(21,0-33,0)	26,5	(20,9-33,0)	368
	25 - 34	13,7	(10,5-16,8)	13,5	(10,7-17,0)	885
	35 - 44	8,9	(6,4-11,5)	8,7	(6,5-11,5)	1069
	45 - 54	6,0	(4,0-7,9)	5,8	(4,2-8,0)	1055
	55 - 64	3,5	(2,1-4,9)	3,3	(2,2-5,0)	902
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	14,0	(5,1-22,9)	10,7	(4,4-23,7)	91
	Secondaire inférieur	16,4	(10,3-22,6)	15,9	(10,6-23,0)	307
	Secondaire supérieur	11,6	(8,9-14,2)	10,0	(7,9-12,7)	1301
	Enseignement supérieur	8,1	(6,7-9,5)	7,3	(6,1-8,9)	2510
REGION	Région flamande	9,3	(7,5-11,1)	8,5	(7,0-10,4)	1717
	Région bruxelloise	14,3	(11,7-16,9)	12,5	(10,1-15,4)	972
	Région wallonne	10,0	(7,9-12,1)	8,9	(7,1-11,1)	1590
ANNEE	2013	8,6	(7,4-9,8)	7,7	(6,6-9,0)	3766
	2018	10,0	(8,7-11,3)	9,1	(7,9-10,4)	4279

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 4. Pourcentage de la population sexuellement active âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois et utilisé un condom lors de la dernière relation, Belgique

RH_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	51,2	(42,5-59,9)	50,5	(41,8-59,2)	251
	Femme	31,2	(21,9-40,5)	28,9	(20,6-39,0)	176
GROUPE D'AGE	15 - 24	41,0	(28,1-53,9)	38,6	(25,9-53,0)	102
	25 - 34	49,9	(37,8-62,1)	49,3	(37,7-60,9)	133
	35 - 44	43,7	(29,5-57,9)	39,1	(26,1-53,9)	95
	45 - 54	27,9	(14,3-41,4)	24,0	(13,6-38,7)	59
	55 - 64	55,0	(36,1-74,0)	49,2	(31,3-67,2)	38
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	41,7	(7,1-76,3)	35,8	(14,7-64,4)	15
	Secondaire inférieur	52,4	(36,7-68,0)	44,6	(25,2-65,8)	38
	Secondaire supérieur	38,1	(26,5-49,6)	33,4	(23,0-45,7)	139
	Enseignement supérieur	44,8	(35,8-53,8)	41,4	(32,6-50,7)	221
REGION	Région flamande	39,8	(29,8-49,8)	35,8	(26,8-46,0)	143
	Région bruxelloise	57,4	(48,0-66,7)	51,6	(40,4-62,5)	131
	Région wallonne	44,0	(32,9-55,1)	40,0	(29,1-51,9)	153
ANNEE	2013	40,7	(33,7-47,7)	36,6	(29,7-44,1)	344
	2018	43,5	(36,9-50,1)	38,9	(32,5-45,7)	427

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 5. Pourcentage de la population qui a eu recours à un test de dépistage d'une infection sexuellement transmissible au cours des 12 derniers mois parmi les 15-64 ans ayant déjà eu au moins une relation sexuelle, Belgique

HI_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	7,4	(6,1-8,7)	7,3	(6,1-8,8)	2460
	Femme	8,1	(6,9-9,4)	8,0	(6,9-9,4)	2725
GROUPE D'AGE	15 - 24	11,2	(7,2-15,2)	11,2	(7,8-15,8)	421
	25 - 34	11,2	(8,8-13,5)	11,1	(9,0-13,7)	960
	35 - 44	8,4	(6,3-10,4)	8,4	(6,5-10,6)	1188
	45 - 54	6,7	(5,0-8,5)	6,7	(5,1-8,7)	1333
	55 - 64	3,9	(2,7-5,1)	3,9	(2,8-5,3)	1283
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	17,5	(9,0-25,9)	18,8	(11,5-29,3)	147
	Secondaire inférieur	4,9	(2,4-7,3)	5,2	(3,1-8,5)	445
	Secondaire supérieur	6,4	(4,9-8,0)	6,3	(4,9-8,0)	1589
	Enseignement supérieur	8,4	(7,2-9,7)	8,2	(6,9-9,6)	2916
REGION	Région flamande	5,8	(4,6-7,0)	5,8	(4,7-7,2)	2043
	Région bruxelloise	16,7	(14,3-19,1)	15,9	(13,6-18,5)	1232
	Région wallonne	8,6	(6,8-10,4)	8,5	(6,9-10,5)	1910
ANNEE	2018	7,8	(6,8-8,7)	.	.	5185

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 6. Pourcentage de la population qui a eu recours à un test de dépistage d'une infection sexuellement transmissible au cours de la vie parmi les 15-64 ans ayant déjà eu au moins une relation sexuelle, Belgique

HI_3		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	33,9	(31,3-36,4)	32,2	(29,7-34,9)	2460
	Femme	42,9	(40,2-45,5)	41,3	(38,5-44,1)	2725
GROUPE D'AGE	15 - 24	25,6	(20,3-30,9)	25,6	(20,7-31,2)	421
	25 - 34	48,4	(44,0-52,7)	48,2	(43,9-52,5)	960
	35 - 44	46,8	(42,6-51,0)	46,8	(42,6-51,1)	1188
	45 - 54	39,7	(35,9-43,6)	39,5	(35,7-43,5)	1333
	55 - 64	25,0	(21,5-28,4)	24,7	(21,4-28,4)	1283
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	33,6	(22,7-44,4)	36,6	(25,4-49,4)	147
	Secondaire inférieur	24,0	(17,9-30,1)	24,0	(18,5-30,4)	445
	Secondaire supérieur	32,3	(28,9-35,7)	31,2	(27,9-34,8)	1589
	Enseignement supérieur	44,2	(41,4-46,9)	41,7	(38,8-44,5)	2916
REGION	Région flamande	33,1	(30,4-35,8)	31,3	(28,6-34,1)	2043
	Région bruxelloise	58,7	(55,3-62,1)	56,0	(52,3-59,6)	1232
	Région wallonne	41,8	(38,3-45,3)	40,4	(36,8-44,1)	1910
ANNEE	2018	38,4	(36,4-40,4)	.	.	5185

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 7. Pourcentage de femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans qui ont utilisé (elles-mêmes ou leur(s) partenaire(s)) un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois, Belgique

RH06_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
GROUPE D'AGE						
	15 - 24	93,5	(89,8-97,1)	93,5	(88,8-96,3)	200
	25 - 34	85,0	(80,4-89,6)	85,0	(79,8-89,0)	444
	35 - 44	82,2	(77,9-86,5)	82,2	(77,5-86,1)	517
	45 - 49	76,4	(70,0-82,9)	76,4	(69,5-82,2)	256
NIVEAU D'INSTRUCTION						
	Primaire/sans diplôme	56,2	(33,8-78,5)	60,6	(34,9-81,5)	22
	Secondaire inférieur	73,7	(61,1-86,3)	76,4	(63,1-85,9)	87
	Secondaire supérieur	80,3	(75,4-85,2)	82,4	(77,1-86,6)	410
	Enseignement supérieur	87,2	(84,3-90,1)	89,7	(86,6-92,1)	875
REGION						
	Région flamande	84,7	(81,3-88,2)	87,1	(83,4-90,1)	547
	Région bruxelloise	76,1	(71,1-81,1)	78,9	(73,6-83,4)	339
	Région wallonne	84,6	(80,4-88,7)	86,6	(82,2-90,0)	531
ANNEE						
	2001	75,5	(73,2-77,7)	78,4	(76,1-80,6)	2247
	2004	74,4	(71,7-77,0)	77,2	(74,4-79,8)	1876
	2013	78,4	(75,6-81,2)	81,6	(78,8-84,1)	1401
	2018	83,8	(81,4-86,3)	86,4	(83,9-88,5)	1417

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 8. Distribution des types de contraception utilisés par les femmes de 15 à 49 sexuellement actives qui ont utilisé un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois, Belgique

RH07_2		Pillule	Patch ou anneau vaginal	Implant ou contraceptif injectables	Stérilet	Pillule du lendemain	Barrière : diaphragme, spermicide, éponge, préservatif	Stérilisation	Autres méthodes : abstinence périodique, coït interrompu	N
GROUPE D'AGE	15 - 24	73,8	5,5	4,3	9,4	3,5	2,4	0,0	1,0	183
	25 - 34	55,1	3,1	3,0	21,4	1,3	10,6	4,4	1,1	373
	35 - 44	38,4	2,6	2,4	32,5	0,5	8,7	13,2	1,6	405
	45 - 49	27,1	4,9	3,8	37,9	0,1	7,6	14,4	4,1	188
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	74,1	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	17,4	0,0	12
	Secondaire inférieur	60,6	0,0	3,7	14,0	1,9	11,4	6,5	2,0	58
	Secondaire supérieur	55,8	1,4	4,7	21,7	1,1	5,9	7,9	1,5	320
	Enseignement supérieur	42,7	4,8	2,4	29,4	1,2	9,1	8,5	1,8	744
REGION	Région flamande	46,0	1,9	3,3	27,4	0,4	8,2	11,2	1,7	454
	Région bruxelloise	45,6	4,3	3,2	22,4	3,7	15,0	2,3	3,4	255
	Région wallonne	52,4	6,3	2,9	24,1	1,9	6,2	4,9	1,3	440

RH07_2		Pillule	Patch ou anneau vaginal	Implant ou contraceptif injectables	Stérilet	Pillule du lendemain	Barrière : diaphragme, spermicide, éponge, préservatif	Stérilisation	Autres méthodes : abstinence périodique, coït interrompu	N
ANNEE	2001	63,2	0,0	1,0	10,1	0,5	9,8	14,0	1,4	1674
	2004	60,3	1,9	1,6	13,3	1,0	8,2	12,1	1,7	1366
	2013	54,2	4,9	1,9	20,1	3,1	8,3	6,4	1,2	1079
	2018	48,1	3,6	3,1	25,8	1,2	8,1	8,3	1,7	1149

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

Tableau B 9. Pourcentage de la population âgée de 15 à 64 ans qui a eu des relations sexuelles au cours des 12 derniers mois, Région flamande

RH03_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	79,1	(76,3-82,0)	80,4	(77,3-83,2)	1078
	Femme	74,4	(71,4-77,5)	75,2	(71,7-78,3)	1167
GROUPE D'AGE	15 - 24	49,4	(42,1-56,6)	49,3	(42,1-56,5)	280
	25 - 34	87,2	(82,6-91,7)	87,3	(82,1-91,2)	381
	35 - 44	87,0	(83,0-91,0)	87,0	(82,5-90,5)	464
	45 - 54	79,1	(74,8-83,5)	79,2	(74,5-83,3)	554
	55 - 64	73,5	(68,8-78,1)	73,6	(68,8-77,9)	566
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	38,9	(21,0-56,9)	41,7	(26,0-59,2)	41
	Secondaire inférieur	63,0	(53,0-73,0)	63,1	(51,3-73,4)	163
	Secondaire supérieur	74,8	(70,8-78,8)	75,8	(71,2-80,0)	764
	Enseignement supérieur	80,9	(78,0-83,8)	82,0	(79,0-84,6)	1261
ANNEE	2001	83,8	(82,1-85,5)	85,3	(83,6-86,8)	2589
	2004	81,9	(79,8-83,9)	83,2	(81,1-85,2)	2358
	2013	83,7	(81,6-85,9)	84,9	(82,6-87,0)	1812
	2018	76,8	(74,5-79,1)	78,0	(75,6-80,3)	2245

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 10. Pourcentage de la population qui a eu sa première relation avant l'âge de 15 ans parmi les 15-64 ans qui ont déjà eu des relations sexuelles au cours de la vie, Région flamande

RH02_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	5,7	(3,8-7,6)	5,3	(3,7-7,6)	956
	Femme	3,9	(2,6-5,2)	3,6	(2,6-5,1)	1052
GROUPE D'AGE	15 - 24	4,7	(0,8-8,6)	4,5	(2,0-10,0)	158
	25 - 34	8,0	(4,4-11,5)	7,9	(5,0-12,3)	359
	35 - 44	5,8	(3,6-8,1)	5,7	(3,8-8,4)	443
	45 - 54	3,9	(1,4-6,4)	3,9	(2,0-7,2)	522
	55 - 64	2,1	(0,7-3,5)	2,1	(1,1-3,9)	526
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	7,0	(0,0-17,7)	8,1	(1,9-28,9)	28
	Secondaire inférieur	6,8	(1,6-12,0)	7,2	(3,3-15,0)	144
	Secondaire supérieur	5,7	(3,6-7,7)	5,2	(3,5-7,8)	680
	Enseignement supérieur	4,1	(2,6-5,7)	3,6	(2,4-5,2)	1142
ANNEE	2013	4,3	(3,0-5,6)	4,1	(3,0-5,4)	1679
	2018	4,8	(3,6-6,0)	4,5	(3,5-5,9)	2008

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 11. Pourcentage de la population sexuellement active âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois, Région flamande

RH04_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	10,9	(8,3-13,6)	10,0	(7,6-13,0)	840
	Femme	7,6	(5,3-9,9)	6,6	(4,9-9,0)	877
GROUPE D'AGE	15 - 24	27,4	(18,6-36,1)	26,9	(19,0-36,6)	145
	25 - 34	13,5	(8,7-18,3)	13,4	(9,4-18,9)	332
	35 - 44	8,0	(4,6-11,5)	7,8	(5,0-11,9)	409
	45 - 54	5,9	(3,3-8,6)	5,8	(3,7-9,0)	434
	55 - 64	2,3	(0,7-3,9)	2,2	(1,1-4,4)	397
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	6,7	(0,0-21,6)	4,7	(0,4-39,5)	15
	Secondaire inférieur	16,3	(5,7-26,9)	17,3	(8,6-32,0)	94
	Secondaire supérieur	12,4	(8,6-16,1)	10,8	(7,8-14,7)	564
	Enseignement supérieur	7,1	(5,2-9,1)	6,0	(4,4-8,0)	1033
ANNEE	2013	6,6	(5,1-8,1)	5,7	(4,5-7,3)	1499
	2018	9,3	(7,5-11,1)	8,3	(6,8-10,2)	1717

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 12. Pourcentage de la population sexuellement active âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois et utilisé un condom lors de la dernière relation, Région flamande

RH_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	48,3	(35,1-61,4)	49,7	(36,4-63,1)	81
	Femme	26,7	(13,1-40,3)	26,5	(14,0-44,4)	62
GROUPE D'AGE	15 - 24	29,4	(11,0-47,7)	27,9	(12,8-50,5)	35
	25 - 34	47,8	(28,8-66,9)	47,0	(30,2-64,5)	43
	35 - 44	49,6	(26,7-72,4)	43,1	(23,4-65,2)	31
	45 - 54	17,7	(1,6-33,8)	14,2	(5,4-32,5)	24
	55 - 64	71,0	(36,5-100,0)	65,8	(31,4-89,0)	10
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	0,0	.	0,0	(0,0-0,0)	1
	Secondaire inférieur	48,3	(23,6-73,1)	44,1	(12,4-81,5)	11
	Secondaire supérieur	38,6	(22,4-54,8)	38,4	(22,4-57,3)	55
	Enseignement supérieur	39,9	(26,2-53,5)	39,5	(24,1-57,3)	74
ANNEE	2013	38,6	(27,3-49,9)	36,3	(25,2-49,2)	97
	2018	39,8	(29,8-49,8)	37,0	(27,6-47,5)	143

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 13. Pourcentage de la population qui a eu recours à un test de dépistage d'une infection sexuellement transmissible au cours des 12 derniers mois parmi les 15-64 ans ayant déjà eu au moins une relation sexuelle, Région flamande

HI_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	5,8	(4,1-7,4)	5,6	(4,2-7,5)	978
	Femme	5,9	(4,3-7,5)	5,8	(4,4-7,7)	1065
GROUPE D'AGE	15 - 24	11,2	(5,5-16,8)	11,2	(6,7-18,2)	163
	25 - 34	7,8	(4,9-10,8)	7,8	(5,4-11,3)	363
	35 - 44	6,4	(3,7-9,2)	6,5	(4,2-9,9)	446
	45 - 54	5,4	(3,3-7,4)	5,3	(3,6-7,8)	541
	55 - 64	2,1	(0,9-3,3)	2,1	(1,2-3,6)	530
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	13,1	(0,0-30,5)	13,7	(4,2-36,8)	31
	Secondaire inférieur	4,3	(0,0-8,5)	5,1	(2,0-12,7)	144
	Secondaire supérieur	5,0	(3,1-7,0)	4,8	(3,3-7,1)	690
	Enseignement supérieur	6,3	(4,7-7,9)	5,9	(4,5-7,8)	1165
ANNEE	2018	5,8	(4,6-7,0)	.	.	2043

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 14. Pourcentage de la population qui a eu recours à un test de dépistage d'une infection sexuellement transmissible au cours de la vie parmi les 15-64 ans ayant déjà eu au moins une relation sexuelle, Région flamande

HI_3		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	30,1	(26,7-33,6)	28,4	(25,0-32,1)	978
	Femme	36,2	(32,5-39,8)	34,3	(30,5-38,4)	1065
GROUPE D'AGE	15 - 24	22,3	(15,1-29,5)	22,4	(16,1-30,4)	163
	25 - 34	45,2	(39,1-51,4)	45,1	(39,1-51,2)	363
	35 - 44	40,9	(35,0-46,9)	41,0	(35,2-47,1)	446
	45 - 54	35,0	(29,8-40,2)	34,9	(29,9-40,2)	541
	55 - 64	17,4	(12,8-21,9)	17,3	(13,2-22,3)	530
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	29,6	(9,6-49,6)	32,8	(14,8-57,8)	31
	Secondaire inférieur	19,8	(11,2-28,5)	21,9	(13,8-32,8)	144
	Secondaire supérieur	28,2	(23,7-32,8)	26,8	(22,5-31,6)	690
	Enseignement supérieur	37,6	(33,9-41,2)	34,9	(31,1-38,9)	1165
ANNEE	2018	33,1	(30,4-35,8)	.	.	2043

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 15. Pourcentage de femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans qui ont utilisé (elles-mêmes ou leur(s) partenaire(s)) un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois, Région flamande

RH06_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
GROUPE D'AGE						
	15 - 24	94,0	(89,1-98,9)	94,0	(87,1-97,4)	74
	25 - 34	82,6	(75,1-90,0)	82,6	(74,0-88,8)	166
	35 - 44	84,7	(79,2-90,3)	84,7	(78,4-89,5)	195
	45 - 49	81,6	(74,0-89,2)	81,6	(72,9-88,0)	112
NIVEAU D'INSTRUCTION						
	Primaire/sans diplôme	19,8	(0,0-100,0)	25,3	(3,4-76,3)	4
	Secondaire inférieur	85,9	(70,0-100,0)	87,0	(66,4-95,8)	22
	Secondaire supérieur	81,3	(74,7-87,8)	83,5	(76,3-88,8)	170
	Enseignement supérieur	87,0	(82,7-91,3)	89,3	(84,8-92,6)	349
ANNEE						
	2001	74,7	(71,4-78,0)	77,8	(74,3-81,0)	805
	2004	74,1	(70,2-77,9)	76,9	(72,7-80,7)	702
	2013	78,2	(74,3-82,2)	81,6	(77,5-85,0)	530
	2018	84,7	(81,3-88,2)	87,4	(83,9-90,3)	547

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 16. Distribution des types de contraception utilisés par les femmes de 15 à 49 ans sexuellement actives qui ont utilisé un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois, Région flamande

RH07_2	Pillule	Patch ou anneau vaginal	Implant ou contraceptif injectables	Stérilet	Pillule du lendemain	Barrière : diaphragme, spermicide, éponge, préservatif	Stérilisation	Autres méthodes : abstinence périodique, coït interrompu	N
GROUPE D'AGE									
15 - 24	73,1	3,0	6,6	14,2	2,0	1,2	0,0	0,0	67
25 - 34	54,5	2,0	3,1	22,3	0,0	10,6	5,9	1,7	139
35 - 44	37,1	0,9	2,1	29,8	0,2	9,8	18,5	1,7	160
45 - 49	24,1	2,7	3,3	43,7	0,0	6,7	16,2	3,3	88
NIVEAU D'INSTRUCTION									
Primaire/sans diplôme	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
Secondaire inférieur	31,7	0,0	4,9	20,2	0,0	25,1	13,5	4,6	18
Secondaire supérieur	56,1	0,3	5,8	19,3	1,0	7,1	9,8	0,6	132
Enseignement supérieur	41,7	2,7	2,1	31,9	0,1	7,6	11,7	2,1	302
ANNEE									
2001	62,3	0,0	0,9	7,2	0,2	9,7	18,4	1,3	596
2004	54,0	1,7	1,7	13,7	0,8	10,0	15,6	2,5	509
2013	52,9	4,2	1,4	19,8	2,6	8,7	8,9	1,5	407
2018	46,0	1,9	3,3	27,4	0,4	8,2	11,2	1,7	454

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

Tableau B 17. Pourcentage de la population âgée de 15 à 64 ans qui a eu des relations sexuelles au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise

RH03_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	77,8	(74,0-81,6)	77,6	(73,4-81,3)	640
	Femme	70,6	(66,8-74,4)	69,6	(65,4-73,6)	712
GROUPE D'AGE	15 - 24	46,4	(36,2-56,7)	46,3	(36,4-56,5)	126
	25 - 34	87,2	(82,8-91,7)	87,4	(82,3-91,2)	301
	35 - 44	83,9	(79,4-88,4)	84,1	(79,2-88,1)	354
	45 - 54	73,5	(67,9-79,0)	73,7	(67,8-78,9)	294
	55 - 64	63,5	(56,9-70,1)	64,0	(57,4-70,1)	277
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	62,3	(43,8-80,7)	64,6	(43,7-81,1)	60
	Secondaire inférieur	47,8	(34,9-60,7)	48,4	(35,7-61,4)	84
	Secondaire supérieur	73,5	(67,9-79,2)	74,1	(67,5-79,7)	315
	Enseignement supérieur	78,2	(74,8-81,6)	77,5	(73,7-80,8)	857
ANNEE	2001	79,1	(76,8-81,5)	80,1	(77,6-82,4)	1652
	2004	73,5	(70,6-76,4)	73,8	(70,6-76,8)	1405
	2013	77,4	(73,8-80,9)	76,7	(72,6-80,3)	1042
	2018	74,2	(71,3-77,0)	73,9	(70,7-76,8)	1352

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 18. Pourcentage de la population qui a eu sa première relation avant l'âge de 15 ans parmi les 15-64 ans qui ont déjà eu des relations sexuelles au cours de la vie, Région bruxelloise

RH02_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	5,9	(3,6-8,2)	6,1	(4,1-8,9)	570
	Femme	4,4	(2,5-6,3)	4,6	(3,0-7,1)	640
GROUPE D'AGE	15 - 24	13,9	(3,4-24,4)	13,7	(6,3-27,1)	65
	25 - 34	4,8	(2,0-7,6)	4,8	(2,6-8,5)	283
	35 - 44	3,5	(1,5-5,5)	3,5	(2,0-6,1)	326
	45 - 54	4,1	(1,5-6,7)	4,1	(2,1-7,7)	269
	55 - 64	5,0	(2,1-7,8)	5,0	(2,8-8,6)	267
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	12,6	(0,0-27,1)	11,0	(4,0-26,7)	52
	Secondaire inférieur	12,9	(3,6-22,2)	13,6	(6,7-25,8)	68
	Secondaire supérieur	6,3	(2,8-9,7)	5,8	(3,2-10,2)	269
	Enseignement supérieur	3,5	(2,1-4,9)	3,8	(2,5-5,7)	789
ANNEE	2013	6,1	(4,0-8,3)	6,3	(4,5-8,8)	938
	2018	5,1	(3,6-6,6)	5,3	(3,9-7,1)	1210

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 19. Pourcentage de la population sexuellement active âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise

RH04_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	17,4	(13,6-21,2)	15,9	(12,2-20,5)	485
	Femme	11,0	(7,9-14,0)	9,4	(7,0-12,7)	487
GROUPE D'AGE	15 - 24	29,8	(15,8-43,7)	29,5	(17,6-45,1)	54
	25 - 34	20,1	(14,5-25,8)	19,7	(14,7-25,9)	255
	35 - 44	12,1	(8,1-16,2)	11,7	(8,4-16,3)	296
	45 - 54	6,5	(2,5-10,5)	6,3	(3,4-11,4)	204
	55 - 64	7,2	(3,2-11,3)	6,7	(3,8-11,5)	163
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	16,7	(2,9-30,4)	12,2	(4,0-31,5)	35
	Secondaire inférieur	13,3	(0,4-26,1)	10,6	(4,0-25,3)	41
	Secondaire supérieur	15,8	(9,9-21,8)	12,6	(8,3-18,6)	218
	Enseignement supérieur	13,1	(10,1-16,1)	11,9	(9,0-15,7)	654
ANNEE	2013	17,9	(13,9-21,9)	16,7	(13,2-21,1)	793
	2018	14,3	(11,7-16,9)	13,6	(11,2-16,4)	972

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 20. Pourcentage de la population sexuellement active âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois et utilisé un condom lors de la dernière relation, Région bruxelloise

RH_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	62,7	(50,8-74,6)	56,6	(42,1-70,0)	78
	Femme	48,4	(33,7-63,2)	41,2	(26,0-58,4)	53
GROUPE D'AGE	15 - 24	46,3	(20,4-72,3)	46,7	(23,9-71,0)	20
	25 - 34	65,5	(50,7-80,2)	64,5	(48,6-77,7)	51
	35 - 44	59,9	(42,0-77,8)	56,7	(38,6-73,2)	34
	45 - 54	52,5	(15,4-89,7)	48,3	(18,5-79,4)	12
	55 - 64	31,6	(1,3-61,9)	28,9	(10,8-57,7)	14
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	93,3	(73,8-100,0)	92,4	(55,1-99,2)	6
	Secondaire inférieur	39,2	(0,0-100,0)	31,0	(5,9-76,4)	5
	Secondaire supérieur	58,8	(39,2-78,3)	47,2	(26,8-68,7)	32
	Enseignement supérieur	55,0	(42,6-67,3)	47,6	(33,0-62,7)	80
ANNEE	2013	50,1	(37,6-62,6)	47,2	(35,2-59,5)	109
	2018	57,4	(48,0-66,7)	51,6	(40,6-62,5)	131

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 21. Pourcentage de la population qui a eu recours à un test de dépistage d'une infection sexuellement transmissible au cours des 12 derniers mois parmi les 15-64 ans ayant déjà eu au moins une relation sexuelle, Région bruxelloise

HI_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	15,9	(12,5-19,3)	14,0	(10,7-18,1)	579
	Femme	17,5	(14,2-20,8)	15,7	(12,7-19,3)	653
GROUPE D'AGE	15 - 24	14,5	(3,8-25,3)	14,6	(6,8-28,5)	66
	25 - 34	25,3	(19,7-30,9)	25,3	(20,1-31,3)	284
	35 - 44	17,2	(12,8-21,6)	17,2	(13,2-22,0)	335
	45 - 54	10,5	(6,4-14,6)	10,5	(7,0-15,3)	277
	55 - 64	10,8	(6,8-14,8)	10,7	(7,3-15,4)	270
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	27,1	(10,3-43,8)	27,2	(14,1-45,9)	54
	Secondaire inférieur	13,8	(5,3-22,2)	13,3	(6,8-24,5)	70
	Secondaire supérieur	12,0	(7,7-16,4)	10,5	(7,1-15,3)	275
	Enseignement supérieur	17,3	(14,4-20,2)	15,5	(12,7-18,8)	803
ANNEE	2018	16,7	(14,3-19,1)	.	.	1232

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 22. Pourcentage de la population qui a eu recours à un test de dépistage d'une infection sexuellement transmissible au cours de la vie parmi les 15-64 ans ayant déjà eu au moins une relation sexuelle, Région bruxelloise

HI_3		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	56,8	(52,2-61,4)	54,4	(49,5-59,2)	579
	Femme	60,5	(56,4-64,7)	58,2	(53,5-62,8)	653
GROUPE D'AGE	15 - 24	42,0	(27,6-56,4)	42,1	(29,1-56,3)	66
	25 - 34	63,5	(57,0-70,1)	63,5	(56,8-69,8)	284
	35 - 44	64,8	(59,0-70,6)	64,8	(58,8-70,4)	335
	45 - 54	56,9	(50,3-63,4)	56,8	(50,2-63,2)	277
	55 - 64	52,4	(45,3-59,5)	52,2	(45,1-59,2)	270
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	36,7	(19,6-53,8)	37,2	(22,0-55,5)	54
	Secondaire inférieur	41,4	(26,7-56,1)	39,9	(26,6-54,9)	70
	Secondaire supérieur	48,4	(41,1-55,6)	47,3	(39,7-55,0)	275
	Enseignement supérieur	65,8	(61,8-69,8)	63,7	(59,0-68,2)	803
ANNEE	2018	58,7	(55,3-62,1)	.	.	1232

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 23. Pourcentage de femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans qui ont utilisé (elles-mêmes ou leur(s) partenaire(s)) un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise

RH06_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
GROUPE D'AGE						
	15 - 24	100	(100,0-100,0)	100	(100,0-100,0)	29
	25 - 34	77,2	(69,0-85,3)	77,2	(68,1-84,3)	124
	35 - 44	68,9	(60,5-77,3)	68,9	(60,0-76,6)	143
	45 - 49	71,2	(56,6-85,8)	71,2	(55,3-83,1)	43
NIVEAU D'INSTRUCTION						
	Primaire/sans diplôme	61,1	(20,4-100,0)	98,0	(90,8-99,6)	9
	Secondaire inférieur	44,5	(14,1-74,9)	95,7	(87,8-98,6)	16
	Secondaire supérieur	76,6	(65,4-87,9)	99,0	(98,2-99,4)	70
	Enseignement supérieur	80,8	(75,4-86,2)	99,4	(99,1-99,6)	233
ANNEE						
	2001	75,0	(71,0-79,0)	75,9	(71,5-79,9)	522
	2004	73,0	(67,8-78,2)	73,2	(66,9-78,8)	421
	2013	78,9	(73,8-83,9)	79,3	(73,6-84,0)	325
	2018	76,1	(71,1-81,1)	77,1	(71,9-81,7)	339

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 24. Distribution des types de contraception utilisés par les femmes de 15 à 49 ans sexuellement actives qui ont utilisé un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise

RH07_2		Pillule	Patch ou anneau vaginal	Implant ou contraceptif injectables	Stérilet	Pillule du lendemain	Barrière : diaphragme, spermicide, éponge, préservatif	Stérilisation	Autres méthodes : abstinence périodique, coït interrompu	N
GROUPE D'AGE										
	15 - 24	51,1	6,1	0,0	7,8	16,2	6,3	0,0	12,5	29
	25 - 34	52,7	5,3	3,3	19,8	1,6	16,2	0,0	1,3	96
	35 - 44	34,7	2,9	2,6	33,4	1,4	16,9	5,5	2,4	100
	45 - 49	42,1	2,6	8,8	19,9	2,3	16,5	5,3	2,6	30
NIVEAU D'INSTRUCTION										
	Primaire/sans diplôme	66,7	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
	Secondaire inférieur	36,0	0,0	11,4	13,4	39,2	0,0	0,0	0,0	7
	Secondaire supérieur	48,1	2,1	1,1	30,3	1,1	7,0	0,9	9,3	52
	Enseignement supérieur	45,3	4,9	2,8	21,4	3,4	18,4	2,1	1,9	186
ANNEE										
	2001	68,8	0,0	1,5	13,4	1,2	10,9	3,5	0,9	389
	2004	69,1	1,7	2,1	9,3	2,8	9,6	4,6	0,9	305
	2013	53,2	9,2	1,9	12,7	6,5	12,8	1,7	2,0	247
	2018	45,6	4,3	3,2	22,4	3,7	15,0	2,3	3,4	255

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

Tableau B 25. Pourcentage de la population âgée de 15 à 64 ans qui a eu des relations sexuelles au cours des 12 derniers mois, Région wallonne

RH03_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	79,7	(75,7-83,8)	82,8	(78,7-86,2)	987
	Femme	77,3	(73,6-81,0)	80,0	(76,3-83,3)	1074
GROUPE D'AGE	15 - 24	52,6	(43,5-61,7)	52,5	(43,5-61,4)	298
	25 - 34	90,6	(86,2-95,1)	90,7	(85,3-94,3)	331
	35 - 44	91,0	(87,2-94,7)	91,0	(86,5-94,1)	412
	45 - 54	84,5	(80,2-88,7)	84,6	(79,9-88,3)	520
	55 - 64	69,6	(63,2-75,9)	69,7	(63,1-75,6)	500
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	53,7	(35,3-72,1)	60,3	(37,5-79,4)	70
	Secondaire inférieur	77,8	(69,9-85,7)	79,7	(71,5-86,0)	244
	Secondaire supérieur	77,4	(71,8-83,0)	81,4	(75,8-85,9)	673
	Enseignement supérieur	81,4	(77,7-85,0)	83,7	(80,2-86,6)	1026
ANNEE	2001	83,8	(82,0-85,5)	85,7	(83,8-87,4)	2850
	2004	79,1	(76,7-81,5)	81,2	(78,6-83,5)	2506
	2013	80,2	(77,6-82,8)	82,9	(80,3-85,3)	1880
	2018	78,5	(75,6-81,4)	81,7	(78,9-84,2)	2061

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 26. Pourcentage de la population qui a eu sa première relation avant l'âge de 15 ans parmi les 15-64 ans qui ont déjà eu des relations sexuelles au cours de la vie, Région wallonne

RH02_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	8,9	(5,7-12,1)	8,4	(5,6-12,5)	870
	Femme	6,2	(3,3-9,1)	6,0	(3,8-9,2)	986
GROUPE D'AGE	15 - 24	13,1	(6,3-20,0)	13,0	(7,6-21,3)	188
	25 - 34	10,1	(3,1-17,1)	10,0	(4,9-19,5)	308
	35 - 44	8,9	(4,9-12,9)	8,8	(5,5-13,6)	396
	45 - 54	6,6	(2,3-11,0)	6,6	(3,3-12,5)	495
	55 - 64	2,4	(0,1-4,7)	2,4	(0,9-6,1)	469
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	26,7	(9,4-44,0)	30,1	(14,2-52,9)	66
	Secondaire inférieur	7,9	(0,0-17,8)	7,3	(2,1-22,5)	220
	Secondaire supérieur	8,2	(4,3-12,0)	7,5	(4,7-11,8)	606
	Enseignement supérieur	5,7	(3,2-8,3)	5,3	(3,3-8,3)	920
ANNEE	2013	6,3	(4,7-7,9)	5,8	(4,5-7,4)	1718
	2018	7,5	(5,3-9,7)	7,1	(5,1-9,6)	1856

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 27. Pourcentage de la population sexuellement active âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois, Région wallonne

RH04_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	12,7	(9,2-16,3)	12,3	(9,2-16,2)	763
	Femme	7,4	(5,1-9,7)	7,0	(5,0-9,7)	827
GROUPE D'AGE	15 - 24	25,9	(16,5-35,3)	25,3	(17,4-35,3)	169
	25 - 34	11,3	(6,7-16,0)	11,2	(7,3-16,9)	298
	35 - 44	9,4	(4,7-14,1)	9,2	(5,5-15,0)	364
	45 - 54	5,9	(2,7-9,2)	5,7	(3,2-9,8)	417
	55 - 64	5,1	(2,0-8,1)	4,9	(2,6-8,8)	342
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	17,8	(1,8-33,8)	13,9	(3,9-39,0)	41
	Secondaire inférieur	16,9	(8,8-25,0)	16,2	(10,0-25,0)	172
	Secondaire supérieur	9,5	(5,5-13,4)	7,9	(5,0-12,2)	519
	Enseignement supérieur	8,3	(5,9-10,7)	8,3	(6,1-11,3)	823
ANNEE	2013	10,5	(8,3-12,8)	9,5	(7,5-12,0)	1474
	2018	10,0	(7,9-12,1)	9,1	(7,3-11,3)	1590

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 28. Pourcentage de la population sexuellement active âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois et utilisé un condom lors de la dernière relation, Région wallonne

RH_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	51,3	(36,2-66,5)	49,6	(35,2-64,0)	92
	Femme	31,9	(15,8-48,0)	31,2	(17,9-48,6)	61
GROUPE D'AGE	15 - 24	57,1	(35,3-79,0)	53,1	(31,3-73,7)	47
	25 - 34	43,6	(20,5-66,8)	43,7	(23,0-66,8)	39
	35 - 44	28,7	(7,8-49,5)	26,7	(10,8-52,4)	30
	45 - 54	40,0	(13,9-66,1)	37,6	(17,2-63,6)	23
	55 - 64	47,8	(14,0-81,5)	42,4	(18,7-70,2)	14
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	29,9	(0,0-100,0)	25,1	(5,5-66,0)	8
	Secondaire inférieur	56,9	(31,8-81,9)	43,9	(20,2-70,7)	22
	Secondaire supérieur	30,3	(11,6-48,9)	21,9	(9,2-43,6)	52
	Enseignement supérieur	48,0	(31,7-64,3)	49,0	(33,7-64,4)	67
ANNEE	2013	39,4	(28,5-50,4)	34,2	(24,2-45,7)	138
	2018	44,0	(32,9-55,1)	37,7	(26,9-49,8)	153

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 29. Pourcentage de la population qui a eu recours à un test de dépistage d'une infection sexuellement transmissible au cours des 12 derniers mois parmi les 15-64 ans ayant déjà eu au moins une relation sexuelle, Région wallonne

HI_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	7,9	(5,3-10,6)	8,0	(5,6-11,2)	903
	Femme	9,2	(6,9-11,5)	9,3	(7,2-11,8)	1007
GROUPE D'AGE	15 - 24	10,4	(4,1-16,8)	10,4	(5,6-18,6)	192
	25 - 34	11,5	(6,4-16,5)	11,4	(7,3-17,4)	313
	35 - 44	8,8	(5,2-12,3)	8,7	(5,7-13,0)	407
	45 - 54	8,3	(4,6-11,9)	8,2	(5,2-12,8)	515
	55 - 64	5,6	(2,7-8,5)	5,6	(3,3-9,3)	483
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	17,0	(5,3-28,6)	18,8	(8,9-35,5)	62
	Secondaire inférieur	4,2	(1,3-7,1)	4,1	(2,0-8,4)	231
	Secondaire supérieur	7,7	(4,7-10,6)	7,7	(5,2-11,3)	624
	Enseignement supérieur	9,6	(7,0-12,3)	9,5	(7,1-12,6)	948
ANNEE	2018	8,6	(6,8-10,4)	.	.	1910

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 30. Pourcentage de la population qui a eu recours à un test de dépistage d'une infection sexuellement transmissible au cours de la vie parmi les 15-64 ans ayant déjà eu au moins une relation sexuelle, Région wallonne

HI_3		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	34,0	(29,6-38,4)	32,5	(28,0-37,2)	903
	Femme	49,1	(44,6-53,7)	47,8	(43,1-52,6)	1007
GROUPE D'AGE	15 - 24	26,6	(17,6-35,6)	26,2	(18,3-35,8)	192
	25 - 34	47,9	(39,9-56,0)	47,4	(39,8-55,2)	313
	35 - 44	51,0	(43,5-58,4)	50,8	(43,6-58,1)	407
	45 - 54	44,1	(37,3-51,0)	43,7	(37,0-50,7)	515
	55 - 64	32,4	(26,2-38,6)	31,7	(25,6-38,5)	483
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	35,2	(18,0-52,5)	38,6	(22,4-57,8)	62
	Secondaire inférieur	25,6	(16,0-35,2)	24,0	(16,4-33,8)	231
	Secondaire supérieur	36,1	(30,0-42,1)	35,2	(29,1-41,7)	624
	Enseignement supérieur	49,8	(44,7-54,9)	47,0	(41,7-52,4)	948
ANNEE	2018	41,8	(38,3-45,3)	.	.	1910

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 31. Pourcentage de femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans qui ont utilisé (elles-mêmes ou leur(s) partenaire(s)) un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois, Région wallonne

RH06_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
GROUPE D'AGE						
	15 - 24	91,3	(84,6-98,1)	91,3	(82,0-96,1)	97
	25 - 34	92,4	(87,0-97,8)	92,4	(84,9-96,3)	154
	35 - 44	82,0	(73,8-90,1)	82,0	(72,4-88,7)	179
	45 - 49	67,6	(54,3-80,9)	67,6	(53,7-79,0)	101
NIVEAU D'INSTRUCTION						
	Primaire/sans diplôme	79,4	(44,7-100,0)	84,8	(49,4-97,0)	9
	Secondaire inférieur	69,2	(48,1-90,3)	69,1	(48,3-84,2)	49
	Secondaire supérieur	79,5	(70,9-88,0)	81,4	(72,3-88,0)	170
	Enseignement supérieur	89,9	(85,4-94,4)	92,8	(87,5-96,0)	293
ANNEE						
	2001	77,1	(73,8-80,4)	80,7	(77,4-83,7)	920
	2004	75,3	(71,5-79,0)	79,2	(75,4-82,6)	753
	2013	78,6	(74,1-83,0)	82,6	(77,9-86,5)	546
	2018	84,6	(80,4-88,7)	87,5	(83,3-90,7)	531

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 32. Distribution des types de contraception utilisés par les femmes de 15 à 49 ans sexuellement actives qui ont utilisé un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois, Région wallonne

RH07_2		Pillule	Patch ou anneau vaginal	Implant ou contraceptif injectables	Stérilet	Pillule du lendemain	Barrière : diaphragme, spermicide, éponge, préservatif	Stérilisation	Autres méthodes : abstinence périodique, coït interrompu	N
GROUPE D'AGE										
	15 - 24	79,7	9,0	2,1	3,0	2,9	3,3	0,0	0,0	87
	25 - 34	56,8	4,3	2,7	20,6	3,4	8,6	3,6	0,0	138
	35 - 44	41,7	5,4	3,1	37,0	0,6	4,8	6,1	1,3	145
	45 - 49	30,6	10,6	3,9	28,8	0,0	7,6	12,3	6,3	70
NIVEAU D'INSTRUCTION										
	Primaire/sans diplôme	72,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5	0,0	6
	Secondaire inférieur	88,4	0,0	1,8	8,6	0,0	0,3	0,8	0,0	33
	Secondaire supérieur	57,0	3,1	3,5	24,0	1,4	3,5	6,1	1,4	136
	Enseignement supérieur	43,7	8,7	2,9	27,5	2,5	8,7	4,6	1,4	256
ANNEE										
	2001	63,4	0,0	1,1	14,4	0,9	9,6	8,7	1,9	689
	2004	69,5	2,4	1,3	13,4	1,0	4,5	7,7	0,3	552
	2013	57,0	5,2	2,7	22,8	3,2	6,1	2,8	0,2	425
	2018	52,4	6,3	2,9	24,1	1,9	6,2	4,9	1,3	440

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

CONTACT

Rana Charafeddine • T+32 2 642 57 39 • rana.charafeddine@sciensano.be

POUR PLUS D'INFORMATIONS

—

Rendez-vous sur notre site
web >www.sciensano.be ou
contactez-nous à l'adresse
>info@sciensano.be

Sciensano • Rue Juliette Wytsman 14 • Bruxelles • Belgique • T + 32 2 642 51 11 • T presse + 32 2 642 54 20 •
info@sciensano.be • www.sciensano.be

Éditeur responsable : Myriam Sneyers, Directeur général • Rue Juliette Wytsman 14 • Bruxelles • Belgique • D/2019/14.440/70