

INFOBLAD


Meningokokkeninfecties

Tijdens het eerste trimester van 2019:

- ◇ diagnosticeerde het referentiecentrum 42 gevallen van meningitis of sepsis door meningokokken: 13 in januari, 16 in februari en 13 in maart;
- ◇ werd in 47,6% van de gevallen serogroep B gevonden, in 28,6% serogroep W en in 16,7% serogroep Y.
- ◇ werden er 9 letale gevallen gemeld aan het referentiecentrum;
- ◇ werd 35,7% van de gevallen in Vlaanderen waargenomen, 52,4% in Wallonië en 11,9% in Brussel;
- ◇ werden er 12 stammen geïsoleerd bij mannen en 30 stammen bij vrouwen (ratio M/V = 0,4);
- ◇ vertegenwoordigden kinderen jonger dan 5 jaar 31,0% van de gevallen en jongeren tussen 15 en 19 jaar vertegenwoordigden 4,8%.

Besluit: het aantal gevallen waargenomen gedurende het eerste trimester van 2019 is hoger dan dat van het eerste trimester van 2018 (n=34), vooral in Wallonië met een hoge mortaliteit.

Verdelingen van de gevallen per serogroep %



Leeftijdsspreiding

Leeftijd	N	%	B	C	Y	W	doden
0-11m.	7	16,7	4	0	1	2	0
1-4j.	6	14,3	4	0	0	2	2
5-9j.	3	7,1	2	0	1	0	1
10-14j.	1	2,4	1	0	0	0	0
15-19j.	2	4,8	2	0	0	0	1
20-24j.	2	4,8	2	0	0	0	0
25-44j.	6	14,3	2	2	1	1	1
45-64j.	5	11,9	2	0	1	2	2
≥65j.	10	23,8	1	1	3	5	2
Totaal	42	100	20	3	7	11	9

Geografische spreiding van de gevallen

Antwerpen	11,9%	Waals-Brabant	2,4%
Vlaams-Brabant	9,5%	Henegouwen	16,7%
West-Vlaanderen	4,8%	Luik	31,7%
Oost-Vlaanderen	7,1%	Luxemburg	2,4%
Limburg	2,4%	Namen	0%
Vlaanderen	35,7%	Wallonië	52,4%

Meningokokkeninfecties in België: verdeling per trimester (2006-2019)

