

INFOBLAD

Meningokokkeninfecties

Tijdens het eerste trimester van 2020:


- ◇ diagnosticeerde het referentiecentrum 28 gevallen van meningitis of sepsis door meningokokken: 9 in januari, 12 in februari en 7 in maart;
- ◇ werd in 42,9% van de gevallen serogroep B gevonden, in 28,6% serogroep W. Serogroep Y en C elk in 14,3% van de gevallen.
- ◇ werden er 2 letale gevallen gemeld aan het referentiecentrum;
- ◇ werd 46,4% van de gevallen in Vlaanderen waargenomen, 35,7% in Wallonië en 17,9% in Brussel;
- ◇ werden er 14 stammen geïsoleerd bij mannen en 14 stammen bij vrouwen (ratio M/V = 1);
- ◇ vertegenwoordigden kinderen jonger dan 5 jaar 28,6% van de gevallen en jongeren tussen 15 en 19 jaar vertegenwoordigden 7,1%.

Besluit: het aantal gevallen waargenomen gedurende het eerste trimester van 2020 is lager dan dat van het eerste trimester van 2019 (n=42).

Geografische spreiding van de gevallen

Antwerpen	7,1%	Waals-Brabant	0,0%
Vlaams-Brabant	3,6%	Henegouwen	14,3%
West-Vlaanderen	21,4%	Luik	10,7%
Oost-Vlaanderen	10,7%	Luxemburg	3,6%
Limburg	3,6%	Namen	7,1%
Vlaanderen	46,4%	Wallonië	35,7%

Verdelingen van de gevallen per serogroep %



Leeftijdsspreiding

Leeftijd	N	%	B	C	Y	W	doden
0-11m.	3	10,7	0	0	1	2	0
1-4j.	5	17,9	3	1	0	0	1
5-9j.	5	17,9	3	1	1	0	0
10-14j	0	0	0	0	0	0	0
15-19j.	2	7,1	0	0	1	1	0
20-24j.	1	3,6	1	0	0	0	0
25-44j.	2	7,1	1	1	0	0	0
45-64j.	4	14,3	2	1	0	1	0
≥65j.	6	21,4	2	0	1	3	1
Totaal	28	100	12	4	4	8	2

Meningokokkeninfecties in België: verdeling per trimester (2007-2020)

