

# INFOBLAD


## Meningokokkeninfecties

In 2018:

- ◇ diagnosticeerde het referentiecentrum 116 gevallen van meningitis of sepsis door meningokokken (jaarlijkse incidentie = 1.02/100.000);
- ◇ werd in 50,9% van de gevallen serogroep B teruggevonden, in 25,0% serogroep Y in 16,4% serogroep W en in 4,3% serogroep C;
- ◇ werden er 4 letale gevallen (2 B en 2 W) gemeld aan het referentiecentrum (CFR = 3,4%);
- ◇ werd 58,6% van de gevallen in Vlaanderen waargenomen, 31,0% in Wallonië en 10,3% in Brussel;
- ◇ werden er 52 stammen geïsoleerd bij mannen en 63 stammen bij vrouwen (ratio M/V = 0,83);
- ◇ vertegenwoordigden kinderen jonger dan 5 jaar 36,2% van de gevallen en jongeren tussen 15 en 19 jaar vertegenwoordigden 16,4%.

Besluit: het aantal gevallen waargenomen in 2018 was hoger dan in 2017 (n =94). Er wordt een verdubbeling van het aantal serogroep W gevallen vastgesteld.

Verdelingen van de gevallen per serogroep %



Leeftijdsspreiding

Leeftijd	N	%	B	C	Y	W	doden
0-11m.	22	19.0	13	1	4	4	0
1-4j.	20	17.2	15	1	4	0	0
5-9j.	9	7.8	6	0	2	1	0
10-14j	2	1.7	1	0	0	0	0
15-19j.	19	16.4	7	0	5	5	0
20-24j.	6	5.2	3	2	2	0	1
25-44j.	6	5.2	3	0	2	1	0
45-64j.	15	12.9	9	0	3	2	1
>65j.	18	15.5	2	1	9	6	2
<b>Totaal</b>	<b>116</b>	<b>100</b>	<b>59</b>	<b>5</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>4</b>

**Geografische spreiding van de gevallen**

Antwerpen	15,5%	Waals-Brabant	2,6%
Vlaams-Brabant	9,5%	Henegouwen	9,5%
West-Vlaanderen	9,5%	Luik	12,1%
Oost-Vlaanderen	14,7%	Luxemburg	1,7%
Limburg	7,8%	Namen	4,3%
Vlaanderen	58,6%	Wallonië	31,0%

**Meningokokkeninfecties in België: verdeling per trimester (2006-2018)**

