

INFOBLAD


Meningokokkeninfecties

In 2019:

- ◇ diagnosticeerde het referentiecentrum 107 gevallen van meningitis of sepsis door meningokokken (jaarlijkse incidentie = 0.94/100.000);
- ◇ werd in 49,5% van de gevallen serogroep B teruggevonden, in 26.2% serogroep W in 15.9% serogroep Y en in 7,5% serogroep C;
- ◇ werden er 14 lethale gevallen (4 B, 4 W, 3 C en 3 Y) gemeld aan het referentiecentrum (CFR = 13,1%);
- ◇ werd 45,8% van de gevallen in Vlaanderen waargenomen, 43,0% in Wallonië en 11,2% in Brussel;
- ◇ werden er 41 stammen geïsoleerd bij mannen en 65 stammen bij vrouwen (ratio M/V = 0,63);
- ◇ vertegenwoordigden kinderen jonger dan 5 jaar 31,0% van de gevallen en jongeren tussen 15 en 19 jaar vertegenwoordigden 9,3%.

Besluit: het aantal gevallen waargenomen in 2019 was vergelijkbaar met 2018 (n =116). Een uitzonderlijk hoog aantal gevallen was lethaal. Het aantal serogroep W gevallen liep verder op.

Verdelingen van de gevallen per serogroep %



Leeftijdsspreiding

Leeftijd	N	%	B	C	Y	W	doden
0-11m.	18	16.8	9		2	7	1
1-4j.	15	14.0	11		1	3	3
5-9j.	6	5.6	4		1	1	1
10-14j	3	2.8	3				
15-19j.	10	9.3	6	1	1	2	
20-24j.	5	4.7	5				1
25-44j.	9	8.4	4	2	2	1	1
45-64j.	16	15.0	5	1	5	4	3
>65j.	25	23.4	6	4	5	10	4
Totaal	107	100	53	8	17	28	14

Geografische spreiding van de gevallen

Antwerpen	15,0%	Waals-Brabant	4,7%
Vlaams-Brabant	9,3%	Henegouwen	15,0%
West-Vlaanderen	8,4%	Luik	16,8%
Oost-Vlaanderen	10,3%	Luxemburg	0,9%
Limburg	2,8%	Namen	5,6%
Vlaanderen	45,8%	Wallonië	43,0%

Meningokokkeninfecties in België: verdeling per trimester (2006-2019)

