

INFOBLAD

Meningokokkeninfecties

In 2020:


- ◇ diagnosticeerde het referentiecentrum 55 gevallen van meningitis of sepsis door meningokokken (jaarlijkse incidentie = 0.48/100.000);
- ◇ werd in 49.1% van de gevallen serogroep B teruggevonden, in 29.1% serogroep W in 10.9% serogroep Y en in 10.9% serogroep C;
- ◇ werden er 2 lethale gevallen (1 W en 1 C) gemeld aan het referentiecentrum (CFR = 3.6%);
- ◇ werd 50.9% van de gevallen in Vlaanderen waargenomen, 30.9% in Wallonië en 18.2% in Brussel;
- ◇ werden er 30 stammen geïsoleerd bij mannen en 25 stammen bij vrouwen (ratio M/V = 1.2);
- ◇ vertegenwoordigden kinderen jonger dan 5 jaar 38.2% van de gevallen en jongeren tussen 15 en 19 jaar vertegenwoordigden 9.1%.

Besluit: het aantal gevallen waargenomen in 2020 was beduidend lager dan 2019 (n =107). De Covid-19 pandemie met de bijhorende maatregelen hebben duidelijk een effect gehad op de verspreiding van invasieve meningokokken infecties.

Geografische spreiding van de gevallen

Antwerpen	16,4%	Waals-Brabant	1,8%
Vlaams-Brabant	5,5%	Henegouwen	16,4%
West-Vlaanderen	18,2%	Luik	7,3%
Oost-Vlaanderen	7,3%	Luxemburg	1,8%
Limburg	3,6%	Namen	3,6%
Vlaanderen	50,9%	Wallonië	30,9%

Verdelingen van de gevallen per serogroep %



Leeftijdsspreiding

Leeftijd	N	%	B	C	Y	W	doden
0-11m.	10	18.2	3		1	6	
1-4j.	11	20.0	9	1		1	1(C)
5-9j.	7	12.7	4	1	1	1	
10-14j	0	0.0					
15-19j.	5	9.1	1	1	2	1	
20-24j.	1	1.8	1				
25-44j.	5	9.1	2	2		1	
45-64j.	8	14.5	4	1		3	
>65j.	8	14.5	3		2	3	1(W)
Totaal	55	100	27	6	6	16	

Meningokokkeninfecties in België: verdeling per trimester (2007-2020)

