

INFOBLAD

Meningokokkeninfecties

In 2022:


- ◇ diagnosticeerde het referentiecentrum 43 gevallen van meningitis of sepsis door meningokokken (jaarlijkse incidentie = 0.37/100.000);
- ◇ werd in 65.1% van de gevallen serogroep B teruggevonden, in 25.6% serogroep Y in 7.0% serogroep W en in 2.3% serogroep C;
- ◇ werden er 4 lethale gevallen (3 B, 1 Y) gemeld aan het referentiecentrum (CFR = 9.3%);
- ◇ werd 46.5% van de gevallen in Vlaanderen waargenomen, 46.5% in Wallonië en 7.0% in Brussel;
- ◇ werden er 14 stammen geïsoleerd bij mannen en 29 stammen bij vrouwen (ratio M/V = 0.48);
- ◇ vertegenwoordigden kinderen jonger dan 5 jaar 16.3% van de gevallen en jongeren tussen 15 en 19 jaar 14.0% van de gevallen.

Besluit: het aantal gevallen waargenomen in 2022 ligt opnieuw iets hoger dan 2021 (n =24) maar blijft beduidend lager dan voor de Covid-19 pandemie. De verdeling per leeftijdscategorie is ook atypisch met meer gevallen in de oudere populatie.

Geografische spreiding van de gevallen

Antwerpen	16,3%	Waals-Brabant	2,3%
Vlaams-Brabant	7,0%	Henegouwen	20,9%
West-Vlaanderen	9,3%	Luik	7,0%
Oost-Vlaanderen	9,3%	Luxemburg	4,7%
Limburg	4,7%	Namen	11,6%
Vlaanderen	46,5%	Wallonië	46,5%

Verdelingen van de gevallen per serogroep %



Leeftijdsspreiding

Leeftijd	N	%	B	C	Y	W	doden
0-11m.	3	7.0	2		1		1(B)
1-4j.	4	7.0	3			1	1(B)
5-9j.	2	4.7	2				
10-14j	2	4.7	2				
15-19j.	6	14.0	5		1		
20-24j.	4	9.3	3			1	
25-44j.	5	11.6	4		1		
45-64j.	3	7.0	2	1			1(B)
>65j.	14	32.6	5		8	1	1(Y)
Totaal	43	100	28	1	11	3	4

Meningokokkeninfecties in België: verdeling per trimester (2009-2022)

